Х.Т. Моламусов

ПТИЦЫ
Кабардино-Балкарии

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кабардино-Балкарский государственный
высокогорный природный заповедник

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Х. Т. Моламусов

ПТИЦЫ
Кабардино-Балкарии
Неворобьиные

Фрагменты диссертации
на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Научный редактор
доктор биологических наук, профессор В. П. Белик
(Южный федеральный университет)

Ростов-на-Дону – Таганрог
Издательство Южного федерального университета
2017

MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ECOLOGY
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kabardino-Balkarian high mountain
State Nature Reserve

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Federal State Autonomous Educational Institution
of Higher Education
«SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY»

H. T. Molamusov

THE BIRDS
of Kabardino-Balkaria
Non-Passeriformes

Extracts from thesis
for the degree of candidate of biological sciences

Science editor
Doctor of Biological Sciences, Professor V. P. Belik
(Southern Federal University)

Rostov-on-Don – Taganrog
Publishing House of Southern Federal University
2017

УДК 598.22/.27(470.64)
ББК 28.693.35(235.7)
М75

Редакционная коллегия:
Х.-М. М. Газаев, М. И. Аккиев, В. П. Белик

Моламусов, Х. Т.
М75 Птицы Кабардино-Балкарии Неворобьиные : фрагменты дис. … канд. биол. наук / Х. Т. Моламусов ; редкол.: В. П. Белик (науч. ред.) [и др.]. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 120 с.
ISBN 978-5-9275-2466-2

В издании приведены оригинальные эколого-фаунистические материалы по неворобьиным птицам (Non-Passeriformes) Кабардино-Балкарии, собранные в 1951–1960 гг. Х. Т. Моламусовым и изложенные в его диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук, защищенной в 1961 г. в Ленинградском университете под руководством профессора А. С. Мальчевского. Эти данные дополняют материалы по воробьиным птицам, опубликованные автором в г. Нальчике (Моламусов, 1967).

Публикуется в авторской редакции.

УДК 598.22/.27(470.64)
ББК 28.693.35(235.7)

© Белик В. П., оригинал-макет, 2017
© Уколов И. И., Белик В. П., Башиев О. М., фото, 2017

UDC 598.22/.27(470.64)
M79

Editorial board:
X.-M. M. Gazaev, M. I. Akkiev, V. P. Belik

Molamusov, H. T.
M79 The Birds of Kabardino-Balkaria Non-Passeriformes : extracts from thesis for the degree of candidate of biological sciences / H. T. Molamusov ; editorial board: V. P. Belik (science editor) [et al.]. – Rostov-on-Don ; Taganrog : Southern Federal University, 2017. – 120 p.
ISBN 978-5-9275-2466-2

The book presents the original ecological and faunal materials for non-passerine birds (Non-Passeriformes) of Kabardino-Balkaria, collected in 1951–1960 by H. T. Molamusov and published in the thesis for the degree of candidate of biological sciences, defended in 1961 in Leningrad University, supervised by Professor A. S. Malchewski. These data complement the material on passerines, published by the author in the city of Nalchik (Моламусов, 1967).

Published in author's edition.

UDC 598.22/.27(470.64)

© Belik V. P., layout original, 2017
© Ukolov I. I., Belik V. P., Bashiev O. M., photo, 2017

Хажмурат Титуевич
Моламусов
(1933 – 1967)

Вступление

Хажмурат Титуевич Моламусов – один из первых ученых биологов Кабардино-Балкарии. Он был увлечённым натуралистом-исследователем, который в 50-е годы прошлого века начал масштабные работы по изучению авифауны республики. Издавая диссертационные материалы Х.Т. Моламусова, Кабардино-Балкарский государственный заповедник отдает дань памяти исследователю, который любил свою республику, его людей, животный мир и старался понять сам и показать окружающим всё многообразие и красоту живой природы Кабардино-Балкарии.

Нынешний 2017 год – юбилейный год 100-летия заповедной системы России. В 2017 году минуло 50 лет со дня трагической гибели Х.Т. Моламусова и 50 лет после выхода его первой книги о воробьиных птицах центральной части Северного Кавказа. Исследования Х.Т. Моламусова в Кабардино-Балкарии, в том числе на территории заповедника, не потеряли своей актуальности и в настоящее время. Хотя Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник в период его работы ещё не был создан, но собранные им данные являются для нас особенно ценными, поскольку сейчас, изучая птиц заповедной территории, мы имеем возможность сравнивать фауну тех лет с нынешней, видеть, что же изменилось в горах Кабардино-Балкарии за прошедшие годы, пытаться выяснить причины этих изменений.

К сожалению, научным работам Х.Т. Моламусова, нашего известного кавказского орнитолога, уделяют сейчас недостаточно внимания – как в Кабардино-Балкарском государственном университете, где учился и работал этот исследователь, так и в Институте экологии горных территорий. Поэтому публикация его малодоступной для большинства биологов сводки – это и воспоминание об ушедшем учёном, и напоминание о проведенных им обширных полевых исследованиях, и большой пласт ценнейших фактических данных о птицах Кабардино-Балкарии.

Публикуя данную книгу, редакторы приносят дань уважения исследователю, который не успел достичь всех своих целей, но за короткое время смог внести большой вклад в изучение природы Кабардино-Балкарии. Данный выпуск предшествует изданию трудов Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника, в которых будут подводиться итоги работ, ведущихся на его территории со дня создания в 1976 году по орнитологии и другим вопросам изучения и охраны природы Кавказа.

Х-М.М. Газаев, М.И. Аккиев
Кабардино-Балкарский государственный заповедник

Предисловие

Кабардино-Балкария, занимающая центральную, самую высокогорную часть Северного Кавказа, издавна привлекала внимание зоологов. Значительное место в их исследованиях изначально занимали птицы, орнитофауна Кавказа. Эти работы с разной активностью продолжаются в Кабардино-Балкарии до настоящего времени.

Первые же сведения о птицах Кабардино-Балкарии были получены XVIII в. экспедицией Российской Академии наук, которую возглавлял академик Иоганн-Антон Гюльденштедт, в течение 1770-1773 гг. путешествовавший по Кавказу, изучая его природу и население. Но преждевременная смерть не позволила ему обработать все собранные материалы. Дневники этого путешественника были опубликованы П.-С. Палласом на немецком языке уже лишь посмертно (Güldenstädt, 1787), но научное описание 6 новых видов птиц, открытых Гюльденштедтом на Кавказе, появились в печати вскоре после его возвращение в Санкт-Петербург (Güldenstädt, 1775). Среди этих видов – краснобрюхая горихвостка (*Phoenicurus erythrogaster*) и большая чечевица (*Rhodopechys sanguinea*), обитающие в самых труднодоступных высокогорьях и до сих пор остающиеся наименее изученными птицами Кавказа.

В 1793 г., во время своего второго путешествия по югу России, Кавказу и Крыму, через Кабардино-Балкарию в сторону Таганрога проехал академик Петер-Симон Паллас (Pallas, 1799). Но как и у Гюльденштедта, так и у Палласа в описаниях их путешествий почти нет сведений о птицах Кабардино-Балкарии. Не сохранились сейчас и орнитологические сборы этих экспедиций, поступившие в Зоологический музей Академии наук в Санкт-Петербурге.

Летом 1829 г. на территории Кабардино-Балкарии начал специальные зоологические исследования энтомолог Эдуард Петрович Менетрие (Menetries, 1832), который в течение месяца, с 25 июня по 21 июля ст.ст., работал в верховьях Малки в Приэльбрусье, первым открыв там и описав эндемичного горного суслика (*Spermophilus musicus*). Вернувшись в Санкт-Петербург после длительной поездки в Закавказье, Менетрие вскоре опубликовал полный каталог своих кавказских сборов, однако распространение птиц в нем было указано очень лаконично, не позволяя составить представление о фауне отдельных обследованных им регионов.

В 1836 г. в Предкавказье путешествовал также харьковский зоолог Иван Андреевич Криницкий, проехавший от Тамани и Кубани до Терека. Но в большой сводке о животных Кавказа и Крыма, опубликованной после его скоропостижной кончины ботаником И.О. Каленичен-

ко (Kaleniczenko, 1839), распространение птиц описано по собранным экспедицией материалам тоже чрезвычайно лаконично.

В 1871 г. в течение долгого времени, с середины июня до начала октября ст.ст., на Северном Кавказе работала экспедиция известного казанского зоолога М.Н. Богданова (1879). Однако на территории Кабардино-Балкарии он практически не проводил наблюдений, да и по фауне других регионов его оригинальные сведения оказались весьма скудными. Но в своей монографической сводке о птицах Кавказа он дал первый, весьма полный обзор орнитофауны всего этого региона по данным других исследователей.

В 1870-е годы на Северном Кавказе начал активные, многолетние экспедиционные работы ставропольский зоолог и географ Николай Яковлевич Динник, совершивший ряд поездок также по Кабардино-Балкарии. В 1879 г. он прошел с Кубани в верховья Малки к северному подножию Эльбруса; в 1881 г. в течение месяца обследовал ущелья Черека-Хуламского, Чегема и Баксана, а в 1886 и 1887 гг. дважды поднимался в самые верховья Черека-Балкарского (Динник, 1880, 1884, 1890а, 1890б). К сожалению, в подробных описаниях этих путешествий автор отводил птицам немного места. Мало сведений о птицах Кабардино-Балкарии содержится и в его обобщающей сводке по орнитофауне Северного Кавказа (Динник, 1886). Но некоторые дополнительные данные о птицах горной Балкарии можно найти в его статье об их пролете через Кавказский хребет (Динник, 1887).

Вскоре после выхода книги М.Н. Богданова (1879) стационарные исследования в Кабардино-Балкарии начал Константин Николаевич Россиков. В течение 1880-1883 гг. он изучал птиц степной равнины в окрестностях стан. Прохладной в низовьях р. Малки, составив в итоге довольно подробный обзор зимней орнитофауны этого района (Россиков, 1884). Позже он продолжил работы также в горах, в результате чего смог выявить основные сезонные особенности распределения птиц Центрального Кавказа по ландшафтным зонам и высотным поясам (Россиков, 1888), хотя географические привязки мест его исследований к Кабардино-Балкарии в этой работе отсутствуют.

Весной 1884 и 1885 гг. специальные коллекционные сборы птиц в районе г. Кисловодска проводил известный московский таксидермист Федор Карлович Лоренц, частично обследовавший также смежные районы Кабардино-Балкарии на Джинальском хребте, по р. Кичмалке и на плато Бечасын. Его итоговая работа о птицах Северного Кавказа, недавно опубликованная в переводе на русский язык, насыщена весьма ценными оригинальными данными о распространении и экологии всех видов, обнаруженных в окрестностях Кисловодска (Lorenz, 1887, 2009, 2010, 2011).

Первые же специальные работы о птицах Кабардино-Балкарии появились лишь в начале XX века. В 1923-1925 гг. и позже в предгорьях и на равнине, в основном в районе Нальчика, наблюдения проводил А.М. Радищев (1926), опубликовавший затем свои материалы о воробьиных и ракшеобразных птицах Кабарды и Балкарии. По его коллекционным сборам позже была опубликована также работа о хищных птицах и совах Кабардино-Балкарии (Ефимцева, Яценко, 1935). Интересные материалы о птицах горной долины Баксана в 1923 г. собрала экспедиция московских зоологов в составе В.Г. Гептнера и К.А. Воробьева (Гептнер, 1926).

Но наиболее интенсивные орнитологические исследования в Кабардино-Балкарии развернулись в послевоенные годы. Осенью 1949 г. в горах прошла еще одна научная экспедиция из Москвы, однако ее орнитологические материалы ограничились лишь двумя небольшими заметками об охотничьей фауне и о пролете птиц через Кавказский хребет (Насимович, 1950, 1955). Затем в Кабардино-Балкарии начали работать местные исследователи: В.Г. Иванов, С.П. Чунихин, В.В. Дмитриев, оставившие серию серьезных аналитических публикаций о птицах Кабардино-Балкарии, в том числе статьи о ландшафтном распределении орнитофауны и ее антропогенной трансформации, о гнездовании птиц в горах, о зимующих птицах, о хищниках, кавказском уларе и тетереве и других горных видах птиц (Иванов, Чунихин, 1959а, 1959б, 1961а, 1961б; Чунихин, 1960, 1962, 1964; Дмитриев, 1961; Иванов, Дмитриев, 1961; и др.). К сожалению, эта орнитологическая школа в Нальчике вскоре распалась, и дальнейшее изучение птиц в Кабардино-Балкарии продолжили уже молодые местные специалисты.

В горах интенсивные, многолетние исследования экологии кавказского улара начал Джабраил Харунович Базиев (1965, 1978 и др.), защитивший кандидатскую диссертацию и опубликовавший монографию об этом виде. Попутно он собрал ценные материалы также о некоторых других высокогорных птицах, труднодоступных для специальных исследований, в том числе о краснобрюхой горихвостке и большой чечевице, открытых в горах Кавказа еще И.-А. Гюльденштедтом (Базиев, Чунихин, 1963; Базиев, 1970, 1971 и др.). Но впоследствии Базиев отошел от орнитологии и прекратил свои работы в горах Кабардино-Балкарии.

Одновременно самостоятельное изучение птиц в Кабардино-Балкарии, в том числе на территории будущего Кабардино-Балкарского заповедника, начал Хажмурат Титуевич Моламусов, 10-летние исследования которого завершились успешной защитой кандидатской диссертации по орнитофауне Кабардино-Балкарии, состоявшейся в 1961 г. в Ленинградском университете под руководством профессора Алексея Сергеевича Мальчевского. К сожалению, гибель Х.Т. Моламусова в

1967 г. прервала его перспективные орнитологические исследования. Он успел опубликовать лишь ряд работ, дополнявших материалы его диссертации, а также самостоятельную монографическую сводку о воробьиных птицах центральной части Северного Кавказа (Моламусов, 1967). Основные же результаты его многолетних работ остались малоизвестными для широкого круга орнитологов России и зарубежья.

Родился Х.Т. Моламусов в 1933 г. в с. Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарии в семье колхозника. По окончании сельской школы, в 1950 г. он поступил на химико-биологический факультет Кабардинского государственного педагогического института, где вскоре начал активное изучение птиц родного края. После получения диплома педагога, Хажмурат был направлен в школу № 1 в родное село Аргудан, где три года проработал преподавателем биологии. Здесь им был организован биологический кружок, со школьниками велись различные исследования, результаты которых позже были использованы в научной работе. Одновременно Хажмурат настойчиво готовился к поступлению в аспирантуру.

Интенсивные сборы материалов для диссертации Х.Т. Моламусов вёл на длительных стационарах в различных вертикальных поясах практически по всей территории Кабардино-Балкарии, а также в соседних районах Северной Осетии и Ставропольского края. А после защиты кандидатской диссертации он вместе с А.К. Темботовым в течение 7 месяцев (в 1962-1965 гг.) осуществлял полевые исследования на специально оборудованной экспедиционной машине уже по всему Кавказу, за исключением Аджарии. В марте 1967 г. в Ленинграде Х.Т. Моламусов провел предварительную защиту своей докторской диссертации, но, к сожалению, ее официальная защита не состоялась из-за трагической гибели Хажмурата Титуевича.

По воспоминаниям его брата, Хашауа Титуевича Маламусова, Хажмурат был страстным, целеустремленным исследователем, увлеченным своим делом. Он всегда был в научном поиске, обладал неиссякаемым темпераментом, был готов спорить с любыми оппонентами. Хажмурат Титуевич много и бескорыстно помогал Кабардино-Балкарскому обществу охраны природы, чем заслужил любовь и уважение его сотрудников.

После смерти Х.Т. Моламусова активность исследований, проводившихся орнитологами Кабардино-Балкарии, значительно снизилась. Значительное место здесь вновь заняли экспедиционные работы сторонних организаций. В 1969-1979 гг. изучением экологии и учетами хищных птиц в горах Кавказа занимались известные саратовские зоологи С.Н. Варшавский и М.Н. Шилов (1989). В 1979-1981 гг. во всех основных биотопах горной Балкарии были проведены учеты численности птиц московскими орнитологами (Афонин, 1985). Однако в заключи-

тельной публикации, посвященной сравнительному анализу населения птиц горных ландшафтов, в которой обобщались материалы 15-летних учетных работ на Северном Кавказе (Журавлев, 1995), данные по Балкарии не дифференцированы, и только по косвенным указаниям можно судить о птицах этого региона.

В 1990-е годы в Кабардино-Балкарском заповеднике начал исследования орнитолог Е.А. Вуккерт (1991, 1995), опубликовавший несколько работ о хищных птицах заповедника и о птичьем населении долины р. Черек. В этот же период появился ряд работ студента Кабардино-Балкарского университета М.С. Эдиева о птицах Малой Кабарды, расположенной в среднем течении Терека на его степном правобережье (Эдиев, 1992; Эдиев, Хохлов, 1993а, 1993б, 1994; Эдиев и др., 1995; и др.). Несколько разрозненных публикаций было посвящено наблюдениям над отдельными видами редких птиц Кабардино-Балкарии (Белик, Данченко, 1977; Журавлев, Афонин, 1982; Тимофеев, 1990; Безверхов, 1991; Никитина, 1995; Тимофеев и др., 1998). Фрагментарные сведения о редких видах птиц, собранные териологами Нальчика, содержатся также в Красной книге Кабардино-Балкарии (2000).

В конце XX – начале XXI в. небольшие материалы по орнитофауне Кабардино-Балкарии были собраны А.Д. Липковичем (2000) и В.П. Беликом (2008, 2009) при экспедиционных работах по инвентаризации и мониторингу Ключевых орнитологических территорий России (КОТР). По результатам этих исследований позже был опубликован ряд обзоров о хищных птицах Кабардино-Балкарии и всего Северного Кавказа (Белик, 2004, 2008а,б, 2009, 2012, 2013, 2014а,б; Белик и др., 2008), а также о кеклике, альпийской галке и клушице (Белик, 2008, 2015).

В начале XXI в. изучением экологии хищных птиц Кабардино-Балкарии занялся сотрудник Института экологии горных территорий РАН в Нальчике Р.Х. Пшегусов (2004, 2005, 2006, 2007, 2010а, 2014), защитивший в итоге кандидатскую диссертацию на эту тему (Пшегусов, 2010б). Но его работы ограничились в основном анализом нескольких модельных видов хищных птиц и в последующем фактически не получили дальнейшего развития.

Как видно из изложенного выше, орнитофауна Кабардино-Балкарии к настоящему времени изучена недостаточно и весьма фрагментарно, поскольку опубликованные работы охватывают или только ее отдельные районы, или только некоторые группы и виды птиц этого региона. Лишь фауна и экология воробьиных птиц, прежде всего благодаря сводке Х.Т. Моламусова (1967), выяснена здесь сравнительно полно. Более или менее детально отражены в печати также сведения о фауне и экологии хищных птиц Кабардино-Балкарии. Но значительная часть этих данных сейчас уже устарела. А фауна степных, водоплавающих и околоводных, а также некоторых других групп птиц Кабарды

остается неизвестна нам практически вовсе. Восполнить эти пробелы в какой-то мере может публикация материалов Х.Т. Моламусова по неворобьиным птицам, изложенных в его кандидатской диссертации.

Благодаря помощи Ирины Борисовны Савинич, старшего преподавателя кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета, нам удалось получить копию диссертации Х.Т. Моламусова (1961) и подготовить к публикации фаунистический раздел, посвященный всем неворобьиным птицам Кабардино-Балкарии. Остальная часть данного раздела по воробьиным птицам опущена, поскольку эти материалы позже были переработаны, дополнены и опубликованы самим Х.Т. Моламусовым (1967). Не включены в данную публикацию и разделы, касающиеся анализа фауны Кабардино-Балкарии, поскольку они в большинстве тоже были освещены в отдельных работах автора (Моламусов, 1959, 1962, 1963, 1966, 1967). Приводится лишь введение, написанное автором, а также оглавление и объем глав диссертации в страницах, указываемых в диссертации. В тексте оставлены ссылки на фотографии, чтобы показать их наличие в оригинале диссертации; приведена также схематическая карта Кабардино-Балкарии, взятая из более поздних источников. В заключение нами составлен список литературы, использованной в данном разделе диссертации Х.М. Моламусова, а также приведена библиография его известных работ.

Здесь следует также заметить, что в первых работах Х.Т. Моламусова (1955, 1959), написанных еще в студенческие годы, очевидно без помощи профессиональных орнитологов-кураторов, оказалось немало фаунистических ошибок, что позже признавал и сам автор (Моламусов, 1967). Некоторые существенные огрехи остались еще и в кандидатской диссертации, написанной в 1961 г. Лишь позже, в сводке по воробьиным птицам центральной части Северного Кавказа, накопленный с годами опыт позволил Х.Т. Моламусову устранить их. Важную роль сыграло, несомненно, также участие в подготовке цитируемой монографии опытного редактора – известного в СССР орнитолога-фауниста Л.А. Портенко.

Сейчас в публикуемом обзоре неворобьиных птиц Кабардино-Балкарии, содержащемся в кандидатской диссертации Х.Т. Моламусова, мы специально помечаем и комментируем в примечаниях обнаруженные ошибки, оставляя текст автора в первоначальной редакции. Полагаем, что это позволит читателям избежать цитирования приводимых диссертантом ошибочных данных и их тиражирования в последующих работах.

Профессор В.П. Белик

Ленинградский ордена Ленина государственный
университет им. А.А.Жданова

Х. Т. МОЛАМУСОВ

ПТИЦЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Научный руководитель
доктор биологических наук
А.С.Мальчевский

Ленинград
1961

Введение автора

Своеобразное географическое положение Кабардино-Балкарии на северных склонах и в предгорьях Большого Кавказа, с высочайшей в Европе горной вершиной – Эльбрусом, с одной стороны, и засушливыми равнинными районами Терской низменности – с другой, делают эту сравнительно небольшую страну чрезвычайно интересной с точки зрения фаунистических исследований. Ярко выраженное явление зональности и крайне неравномерное распределение растительности и животного мира лучше, чем в других районах Северного Кавказа, обусловливает возможность изучения в Кабардино-Балкарии закономерностей горизонтального и вертикального распределения животных в условиях мозаичного горного ландшафта.

Не меньший интерес представляет Кабардино-Балкария и для выяснения своеобразия экологии горной фауны, испытывающей на себе влияние резкой смены условий, в первую очередь климатических, накладывающих определённый отпечаток на характер и сроки основных периодических явлений в жизни животных – их размножения, миграции и линьки.

Следует, наконец, указать и на то, что территория Кабардино-Балкарии, расположенная в центральной части Северного Кавказа и в значительной части представляющая собой труднодоступные высокогорные районы, больше, чем какая-либо другая республика Кавказа, сохранила в составе своей фауны ряд ценных и в других местах уже редких промыслово-охотничьих видов птиц и зверей (тур, серна, косуля, кеклик, улар, кавказский тетерев), требующих специального экологического изучения в целях охраны и дальнейшего увеличения их численности.

Однако, несмотря на тот большой интерес, который Кабардино-Балкария представляет для зоолога в фаунистическом и в частности в орнитологическом отношении, её территория изучена несравненно хуже других районов Северного Кавказа. В орнитологической литературе ощущается большой недостаток сведений о птицах Кабардино-Балкарии не только в отношении их распространения, экологии и численности, но даже в отношении их видового состава.

Приступая к изучению орнитофауны Кабардино-Балкарии, автор преследовал цель восполнить существующий пробел в изучении авифауны республики и путем сбора оригинального материала по распространению, численности, экологии и хозяйственному значению всех видов птиц, дать сводку современных сведений по этим вопросам.

Для осуществления поставленной цели необходимо было, прежде всего, охватить исследованиями возможно более широкую территорию

и, хотя бы кратковременно, побывать во всех наиболее примечательных районах республики. Это было осуществлено путем организации экскурсий, а также маршрутных экспедиций. Наши основные маршруты проходили по долинам крупных рек, от их истока до впадения в Терек. Таким образом, были обследованы долина Черека, Баксана, Чегема, Лескена и самого Терека. Экскурсии и маршрутные экспедиции проводились в различные сезоны года.

Необходимость получения более детальных данных по экологии отдельных видов требовало в то же время проведения стационарных исследований, которые осуществлялись, в основном, в весенне-летний период и заключались, главным образом, в изучении биологии и размножения птиц, а также питания и развития гнездовых птенцов. Основными пунктами стационарных наблюдений были: в высокогорной зоне район Эльбруса и Безенги, в предгорной зоне – села Аргудан и окрестности Нальчика, в равнинной зоне – окрестности г. Прохладного, село Урожайное, Александровское и Черная Речка (карта 1).

Наблюдения за миграциями птиц весной и осенью проводились в районах Безенги, Эльбруса, Голубого озера, Нальчика, Аргудана и Приближного. Кроме личных наблюдений, автор использовал по возможности все доступные ему литературные данные по птицам Кавказа, а также в отдельных случаях устные сообщения наиболее опытных и знающих охотников из местного населения.

В целом полевые исследования охватили 10-летний период с 1951 по 1960 г. За это время мною была собрана коллекция птиц в количестве 1500 экземпляров 252 вида (21 подвид). Большинство желудков добытых птиц мною сохранены для изучения их содержимого. Всего, таким образом, было проанализировано более 1000 желудков. Часть материалов по питанию гнездовых птенцов воробьных птиц была собрана прижизненным методом наблюдения с помощью лигатуры, накладываемой на шею птенца (Мальчевский, Кадочников, 1953). Одновременно со сбором материалов по питанию проводились наблюдения за гнездовой жизнью птиц. Каждое найденное гнездо описывалось, а история его наблюдалась, по возможности, до конца гнездования.

Во время сбора материалов в полевых условиях помощь автору оказали Г.Н. Подъяпольский, Х.Т. Моламусов и В.Г. Иванов. Отдельные интересные сведения по биологии птиц Кабардино-Балкарии сообщили мне доц. К.Н. Шурыгина и доц. А.К. Темботов.

Определение растительных остатков из желудков птиц проведено директором Ботанического сада Кабардино-Балкарии Ю.И. Кос. При определении насекомых большую помощь оказал мне сотрудник кафедры энтомологии Ленинградского университета В.Н. Белозеров.

Кроме коллекции птиц, добытых мною лично, я просмотрел коллекцию птиц Кабардино-Балкарского университета и Северо-Осетинского сельскохозяйственного и педагогического институтов, предоставленные в мое распоряжение проф. Л.А. Тарноградским, доц. В.Г. Ивановым и доц. В.И. Наниевым.

Большое значение, особенно при изучении линьки и определении видового и подвидового состава птиц Кабардино-Балкарии, имела для меня орнитологическая коллекция Зоологического института АН СССР, возможность работать в котором была любезно предоставлена мне проф. А.И. Ивановым. В определении ряда видов и подвидов местных воробьиных птиц большую помощь оказал мне проф. Л.А. Портенко. Определения хищных птиц моей коллекции любезно проверил ст. научный сотрудник К.А Юдин. Ряд ценных советов и указаний я получил, кроме того, от сотрудников Зоологического института АН СССР проф. А.И. Иванова, Е.В. Козловой и И.А. Нейфельд. Всем указанным лицам автор выражает свою искреннюю признательность. Автор считает своим долгом выразить чувство глубокой признательности профессору Ленинградского университета А.С. Мальчевскому, под руководством которого был собран и обработан основной материал и выполнена настоящая работа.

Рис. 1. Физико-географическая карта Кабардино-Балкарии

Характерные ландшафты Кабардино-Балкарии



Эльбрус вдали на юге за обширным высокогорным плато Бичесын.

Коштан-Тау и Дых-Тау – высочайшие после Эльбруса пятитысячники Кавказа

Каракая (3646 м) – высочайшая вершина Скалистого хребта.

Куэста горы Мехтыген (3154 м) на Скалистом хребте

Верхняя Балкария в горностепной котловине Северо-Юрской депрессии.

Верхний Чегем (Булунгу) в горной степи в Северо-Юрской депрессии

Куэста Скалистого хребта у входа в каньон реки Черек-Балкарский.

Боковой хребет выше села Верхняя Балкария на р. Черек-Балкарский

Древние породы у подножия Скалистого хребта в ущелье р. Черек-Балкарский.

Горная степь с можжевельниками под куэстой горы Мехтыген

Каньон реки Чегем на Скалистом хребте.

Средневековая сторожевая башня среди развалин с. Кюннюм на р. Черек

Ущелье р. Черек-Балкарский на Боковом хребте.

Боковой хребет в верховьях р. Чегем. Ущелье р. Гара-Аузусу

Сосновый лес на ледниковых моренах в верховьях р. Баксан.

Сосновый лес на моренах в верховьях р. Чегем. Урочище Башиль

Сосновый лес на скалах Главного Кавказского хребта. Урочище Уштулу.

Непроходимое лесистое ущелье Малки в Приэльбрусье под куэстой г. Кинжал

Река Кура у с. Малакановское на границе со Ставропольским краем.

Конгломератовые обрывы у реки Малки в предгорьях ниже с. Малка

Река Малка на равнине у села Куба.

Река Малка на равнине у с. Псыхурей

Черек выходит на равнину у с. Стар.Черек.

Пойменное озеро в низовьях р. Баксан

Альплагерь «Безенги», вид с левой боковой морены ледника Мижирги.

Левая боковая морена ледника Хазны в верховьях р. Хазнидон

Лиственные леса на северном склоне Скалистого хребта у с. Бабугент.

Лесостепь на Лесистом хребте у с. Герпегеж

Культурные ландшафты в предгорьях.

Кукурузное поле на равнине

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

Введение 1

Глава I. Исторический обзор орнитологических исследований в Кабардино-Балкарии 5

Глава П. Краткий географический очерк Кабардино-Балкарии 22

Глава Ш. Систематический обзор птиц Кабардино-Балкарии 34

Глава 1У. Закономерности распространения птиц на территории Кабардино-Балкарии 472

1. Распространение птиц по высотным поясам и биотопам 472

2. Роль речных долин в распространении птиц на территории Кабардино-Балкарии . .507

Глава У. Положение Кабардино-Балкарии в зоогеографической системе 529

Глава У1. Хозяйственное значение птиц Кабардино-Балкарии 548

1. Влияние деятельности человека на орнитофауну Кабардино-Балкарии 548

2. Охотничье-промысловые птицы Карабдино-Балкарии 557

3. Возможные пути увеличения численности промысловых птиц Кабардино-Балкарии . .563

Заключение 569

Литература 574-586

Глава III
Систематический обзор птиц Кабардино-Балкарии

1. Кавказский тетерев *Lyrurus mlokosiewiczi* Taczanowskii

Численность кавказского тетерева на территории Кабардино-Балкарии небольшая. Из всех охотничье-промысловых видов, гнездящихся в Кабардино-Балкарии, это, пожалуй, самая малочисленная птица. Как известно, она обитает на субальпийских и альпийских лугах горной зоны. В период размножения встречается преимущественно в альпийских лугах с рододендровыми зарослями.

В прошлом этот тетерев был на Кавказе довольно многочисленной птицей, о чем можно судить на основании сообщений Л.Ф. Млокосевича (1879), Ф.К. Лоренца (1884), Н.А. Динника (1886). За последние же десятилетия численность его заметно сократилась и, по всей видимости, продолжает еще сокращаться. Сокращение численности тетеревов в Кабардино-Балкарии так же, как и в других районах Кавказа (Аверин, Насимович, 1938), происходит, несомненно, в связи с сильным развитием скотоводства и овцеводства в горной зоне.

Дело в том, что основные места выпаса скота совпадают со стациями размножения кавказского тетерева. Табуны лошадей, стада коров и отары овец вытаптывают гнездовые участки тетерева, а многочисленные сторожевые собаки уничтожают кладки и нелетных тетеревят, и в будущем вряд ли можно рассчитывать на увеличение численности тетерева в Кабардино-Балкарии. Из всех факторов, отрицательно влияющих на его численность в республике, основным, как было сказано, является скотоводство, которое будет расширяться и впредь. Для сохранения тетерева в Кабардино-Балкарии необходима организация охраны мест его гнездования.

В настоящее время, по моим наблюдениям, кавказский тетерев сохранился ещё в заметном количестве в следующих местах Кабардино-Балкарии: Безенги, Бечо, Донгуз-Орун, в верховьях рек Адыл-Су, Кыртык, Малка. Во всех вышеперечисленных местах в мае, июне, июле и августе 1954-1960 гг. я встречал этих птиц, количество их, однако, в целом невелико. Например, за 2 года экскурсирования в районе Безенги и Донгуз-Орун, где мне летом приходилось бывать чаще всего, я встретил всего 4 выводка и 14 самцов-одиночек. Отмечу, что экскурсировал я в этих случаях с собакой (ирландский сеттер).

По биологии размножения кавказского тетерева в Кабардино-Балкарии я располагаю следующими данными.

1. Гнездо с 5 слабо насиженными яйцами было найдено мною 4 июля 1956 г. в районе ледника Безенги, на высоте 3500 м н.у.м. Лоток

гнезда был неглубоким и был выстлан небольшим количеством сухой травы с 6-7 перышками самой тетёрки. Гнездо располагалось на маленькой площадке (1 м^2) среди зарослей рододендрона (фото 9). Размеры яиц данной кладки: первое – 31×36 мм; второе – 52,5×35,7 мм; третье – 53×35,9 мм; четвёртое – 53×35,8 мм; пятое – 2,9×35,8 мм.

2. Гнездо с 6 сильно насиженными яйцами было найдено мною 20 июня 1957 г. в районе перевала Бечо, на южном склоне, на высоте 3000 м н.у.м. Характер расположения гнезда тот же, что и в предыдущем случае. Размеры яиц данной кладки: первое – 52×36 мм; второе – 52,7×35,8 мм; третье – 53×36 мм; четвёртое – 52,6×35,5 мм; пятое – 52,9×35,4 мм; шестое – 52,8×35,3 мм.

В литературе имеются указания на наличие 9 и даже 10 яиц в кладке кавказского тетерева (Млокосевич, 1879; Бёме, 1925). Из встреченных мною 7 выводков этого вида за период с 1951 по 1960 г. наиболее ранний отмечен 4 июля 1954 г. Этот выводок состоял из 4 птенцов размером с перепела. Самый поздний выводок был обнаружен мной в районе перевала Бечо 15 августа 1957 г. Несмотря на столь поздний срок, птенцы достигали лишь половины размера взрослой птицы.

В зимний период мне не приходилось встречать одновременно больше 5-6 тетеревов вместе. Очевидно, те времена, когда они встречались зимой крупными стаями в 15-20 (Бёме, 1925) и даже 50 штук (Птицы Советского Союза, т.4) давно прошли.

В январе 1960 г. я наблюдал тетеревов в районе ледников Безенги, Бечо, Шхельда, а также в верховьях р. Адыл-Су примерно в тех же местах, где они держались и летом. В литературе, однако, есть указания на то, что кавказские тетерева спускаются зимой до высоты 700-800 м н.у.м. (Аверин, 1938). В Кабардино-Балкарии мне не приходилось наблюдать тетеревов ниже 1200-1300 м, хотя я и выезжал регулярно в зимнее время в горную зону (с 1951 по 1960 г.). По всей вероятности, откочёвкам тетеревов в более низкие места ущелий препятствуют многочисленные посёлки человека. О значительных вертикальных миграциях тетерева в Кабардино-Балкарии сейчас вряд ли можно говорить.

Учитывая отсутствие в литературе сколько-нибудь подробных сведений о линьке кавказского тетерева, я считаю целесообразным сообщить некоторые результаты произведённого мною изучения коллекции из 44 экз. данного вида. Основой этого материала явилась коллекция Зоологического института АН СССР. Кроме того, я имел 6 экз., добытых мною самим в пределах Кабардино-Балкарии.

У экземпляров, добытых в мае и в 1-й половине июня, мне не удалось установить никаких следов линьки. Линяющие экземпляры старых птиц (преимущественно самцов) начинают попадаться лишь с 20-х

чисел июня. Все птицы, добытые в 2-й половине июля - августе, находились в стадии интенсивной линьки, захватывающей не только мелкое оперение, но и маховые и рулевые перья. В сентябре ещё встречаются линяющие тетерева, но октябрьские экземпляры уже не имеют признаков линьки. Кроме того, просмотренный мною материал позволяет сделать заключения, несколько дополняющие данные, имеющиеся в справочной литературе («Птицы Советского Союза», т.4).

Прежде всего, можно совершенно определённо говорить о том, что молодые самцы-первогодки, хотя, в общем, и сходны с самками в первом годовом наряде, тем не менее, могут быть легко распознаны по общей более тёмной окраске оперения (особенно с брюшной стороны), а также по характерному, присущему лишь молодым самцам, мелкому струйчатому рисунку плечевых и спинных перьев. Кроме того, у молодых самцов горло заметно светлее, чем у самок. Этот признак (светлое горло) остается у самца до приобретения полного взрослого наряда, который самцы кавказского тетерева, так же как и обыкновенного, одевают, по нашему мнению, лишь после третьей осенней линьки.

Интересно отметить, что молодые кавказские тетерева, находясь в первом годовом наряде, весной активно токуют вместе со старыми петухами. В какой степени, однако, они принимают участие в размножении – мне не известно.

О питании кавказского тетерева подробно сказано в работе Ю.В. Аверина (1938). Собранные мною данные (содержимое 7 желудков и зобов) подтверждают указание Ю.В. Аверина о том, что летние корма состоят преимущественно из зелёных листьев и семян бобовых растений (астрогал, клевер), ягод, листьев брусники и черники и небольшого количества беспозвоночных животных (саранчовые и наземные моллюски). Поздней осенью и зимой пища становится однообразной и состоит, главным образом, из почек и побегов берёзы и ивы.

2. Обыкновенный перепел *Coturnix coturnix coturnix* L.

В Кабардино-Балкарии перепел довольно обычная птица. Численность его в равнинной и предгорной зонах значительно выше, чем в горной, хотя в небольшом количестве перепел гнездится в горах вплоть до ледников. Мне неоднократно приходилось наблюдать гнездования перепелов в районах ледников Эльбрус, Безенги, Бечо, Шхельда. Так, небезинтересно указать на то, что гнездо перепела с остатками скорлупы я нашёл 15 июля 1959 г. у самого ледника Эльбруса. Гнездо находилось в 300 м от кромки ледника, у верхней границы альпийского пояса, на высоте около 3500 м н.у.м. и располагалось среди густого низкорослого разнотравья на косогоре. По всей видимости, вылупление птенцов

произошло совсем недавно, так как самка перепела держалась поблизости и была вспугнута мною у самого гнезда.

Численность перепела в Кабардино-Балкарии резко возрастает во время осеннего пролёта. Первые пролётные особи (в основном старые самцы) добывались мною ежегодно в 3-й декаде августа (25-28-го). Массовый пролёт идёт до 20-х чисел сентября. Отдельные пролётные стайки, состоящие преимущественно из самцов (из 20 экз., добытых с 1 по 15 ноября 1958 г., 15 оказались самцами), встречаются и в ноябре.

В небольшом количестве в Кабардино-Балкарии перепела встречаются и зимой. В этот период они держатся чаще всего одиночками на полях, по опушкам леса и по речным долинам в зарослях сорняков. Зимой я ежегодно наблюдал их в равнинной и предгорной зонах. В тёплые зимы перепела встречаются в республике в большем количестве, нежели в холодные. В наиболее тёплую зиму 1960 г. общее число встреченных мною перепелов в январе и феврале достигло наибольшего числа – 40 экз. В тех же районах в 1956-1957 гг. я встречал не более 10 экз. за всю зиму. О частичной зимовке отдельных перепелов в других районах Кавказа упоминают Л.Б. Бёме (1926), И.Д. Чхиквишвили (1930), Е.П. Спангенберг и С.С. Туров (1950).

Весенний пролёт перепела в Кабардино-Балкарии проходит в 1-й декаде апреля. В это же время, очевидно, появляются и первые местные особи. Во всяком случае, брачный крик перепелов в республике можно регулярно слышать с половины 1-й декады апреля. "Бой" самцов продолжается всё лето.

Излюбленными местами гнездования перепела являются сенокосные угодья, а также поля, засеянные озимыми злаками. Полные кладки яиц можно находить в Кабардино-Балкарии со 2-й декады мая. Более поздние кладки встречаются в июне и даже в 1-й декаде июля. В горах, на высоте 1300-1500 м н.у.м., пуховичков я встречал 6 июля 1954 г. и 10 июля 1959 г. Всего за 10 лет наблюдений мною было найдено 50 гнёзд перепела с полными кладками. Количество яиц в этих кладках варьировало от 6 до 20 штук. Из 50 гнёзд в трёх было по 20 яиц, в 30-ти – по 10, в 10-ти – по 8 и в 7-ми – по 6 яиц.

На численность перепелов в Кабардино-Балкарии отрицательно влияет механизированная уборка сенокосных угодий, особенно на участках искусственного травосеяния, скашиваемых в течение лета 2, а то и 3 раза. Первое сенокошение начинается в 1-й декаде июня, как раз в период насиживания кладок или вылупления птенцов у большинства перепелов. Оставшиеся целыми после сенокошения кладки или птенцы часто гибнут, когда пускают в ход грабли. Перепела, потерявшие первые кладки, приступают вскоре, очевидно, ко второму гнездованию, но

повторное сенокошение снова не даёт покоя птицам. Одним словом, явление, описанное А.С. Мальчевским (1961) для лесостепной полосы Европейской части СССР, весьма характерно и для Северного Кавказа.

По сравнению с сенокошением другие факторы, отрицательно влияющие на численность перепела, в частности хищные птицы и звери, играют, несомненно, второстепенную роль в регуляции численности перепелов. А охота на перепела в Кабардино-Балкарии не играет столь существенной роли, как, например, на Черноморском побережье Кавказа.

3. Кавказский кеклик *Alectoris graeca caucasica* Suschkin

В Кабардино-Балкарии кеклик – самая многочисленная птица из всех промысловых видов, живущих осёдло. Наибольшее количество кекликов в республике наблюдается, пожалуй, в Хуламском ущелье. В августе 1960 г. на маршруте от с. Безенги до ледника я насчитал свыше 600 экз. этих птиц. Кеклики встречаются в горах по всей республике. Держатся они преимущественно в таких местах, где имеются каменистые откосы, поросшие кустами барбариса и можжевельника. В период гнездования я не наблюдал их ниже 900 м н.у.м. По Хуламскому ущелью кеклики доходят до самого ледника Безенги, где гнездятся летом и встречаются в осеннее время. Молодых птиц, размером немногим больше перепела, я добывал в районе ледника Безенги.

Численность гнездящихся кекликов в Баксанском ущелье значительно ниже, чем в Хуламском. Это объясняется тем, что Баксанское ущелье – более населённый район. Кроме того, кеклики не проникают по этому ущелью так высоко в горы, как в Хуламском ущелье. Здесь я не наблюдал их выше 1500 м (район с. Верхний Баксан). Проникновению кекликов в верхний пояс гор тут мешает лесная растительность, начинающаяся уже от с. Верхний Баксан. Леса имеются и ниже этого селения, но там они часто прерываются, а на южном склоне долины р. Баксан значительная часть площади вообще лишена лесов.

Зимой, по всей вероятности, лишь часть кекликов совершает вертикальные кочёвки. Это те птицы, которые гнездятся в верхнем поясе гор. Зимой они спускаются в речные долины. Однако, те кеклики, которые гнездятся непосредственно в долинах, а таковых большинство, по моим наблюдениям, проводят зиму поблизости от гнездовых мест.

Стаи кекликов начинают образовываться с 1-й декады августа. К началу сентября численность птиц в стаях уже достигает максимума. В это время в Кабардино-Балкарии встретить (например, в Хуламском и Малкинском ущельях) стаю кекликов из 50-60 птиц не такая большая редкость. Птицы держатся в стаях до наступления периода размножения – примерно до начала марта, когда у кекликов начинается разбивка на

пары. Для гнездования кеклики избирают каменистые осыпи, поросшие чахлой растительностью и редкими кустарниками. Гнездо устраивается обычно либо под защитой нависающего камня, либо под прикрытием кустарников, либо в трещине скалы. Одним словом, оно всегда помещается в укрытом месте.

Гнёзда, как правило, располагаются в небольших естественных углублениях. Кеклики выстилают их листьями кустарников и стеблями субальпийского разнотравья. Состав гнездостроительного материала зависит от места, где гнездо построено. Мне не приходилось наблюдать, чтобы самцы принимали участие в постройке гнезда, хотя они всё время держатся около самок. Полные кладки яиц в республике можно находить с 1-й декады мая. Так 4 мая 1959 г. я нашёл гнездо с 8 слабо насиженными яйцами около с. Верхний Баксан, в долине р. Кыртык. Гнездо было построено под кустом барбариса. Диаметр гнезда 180 мм, глубина – 82 мм. Размеры яиц (8): 39,6-36,4×28,6-26,0 мм. Вес яиц (8): 16,8–13,8 г. Поздние или повторные кладки, отложенные после гибели первой кладки, можно встречать вплоть до 3-й декады июня. Наиболее позднее гнездо кеклика было найдено мною 22 июня 1958 г. в Хуламском ущелье, около с. Безенги. В гнезде были 13 слабо насиженных яиц. Размеры яиц (13): 39-37×28,4-25,8 мм. Вес яиц (13): 16,7–13,9 г. Гнездо было построено под кустом барбариса и хорошо укрывалось росшей вокруг него густой травой. Диаметр гнезда 170 мм, глубина – 80 мм.

Инкубационный период у кеклика, по данным М.Е. Кутубидзе (1955), 24-25 дней. Насиживает яйца только одна самка.

Всего за период 1956-1960 гг. мною было найдено в Кабардино-Балкарии 15 гнёзд кеклика с яйцами. Из этого количества только одно гнездо, упомянутое выше, содержало 13 яиц. В остальных количество яиц не превышало 8. Некоторые из этих кладок, найденные мною в 3-й декаде мая (21, 24, 27-го) были сильно насижены. Всё это подтверждает, что эти кладки были уже законченными и, по всей видимости, не повторными, а первыми. Мне кажется, что существующие представления о количестве яиц в кладке кеклика иногда несколько преувеличенны. Известно, например, гнездо, содержащее 20 и даже более яиц (Карташов, 1952). Такие случаи мне представляются возможными лишь тогда, если в одно гнездо откладывали яйца две самки.

Птенцов, только что покинувших гнездо, можно встретить в республике, начиная со 2-й декады июня. Пуховички из поздних кладок появляются иногда в 3-й декаде июля. Таким образом, появление пуховичков у кеклика растянуто, примерно, на 1,5 месяца. Этим и объясняется то, что во время сезона охоты в августе в Кабардино-Балкарии можно добывать одновременно молодых птиц, почти не отличающихся

от взрослых, и птенцов, не превышающих по размеру перепела. В Хуламском ущелье таких птенцов я неоднократно добывал в период с 10 по 20 августа 1960 г.

Линька кавказского кеклика изучалась на 24 экз., добытых весной и осенью: 9 экз. – из коллекции зоологического института АН СССР, 5 экз. – из коллекции Кабардино-Балкарского университета и 10 экз. были добыты автором.

По данным Р.Л. Бёме (1958), интенсивная линька у кекликов начинается с середины сентября. Судя же по экземплярам, находящимся в моём распоряжении, линька, захватывающая не только мелкое оперение (которое линяет раньше), но и маховые и рулевые перья, может начаться уже со 2-й декады августа. Так, из добытых мною с 10 по 21 августа 1960 г. двух старых (самец и самка) и 5 молодых птиц, все находились в стадии интенсивной линьки, т.е. у всех можно было обнаружить растущие маховые и рулевые перья. Переходя к характеристике процесса линьки у кеклика, считаю небезинтересным привести краткое описание некоторых, наиболее типичных экземпляров.

1. Молодой самец, добытый 13 августа 1960 г. Первое маховое раскрыто на 37 мм, второе – на 50 мм. Третье, четвёртое, пятое, шестое и седьмое – старые, восьмое – раскрыто на 33 мм, девятое – на 70 мм, десятое – на 77 мм. Почти такая же картина наблюдалась и у двух молодых птиц (самка и самец), добытых 14 и 21 августа.

2. Старый самец, добытый 21 августа 1960 г. Первое-третье старые, четвёртое выбито дробью, пятое – нераскрывшийся пенёк, шестое раскрыто на 52 мм, седьмое – на 31 мм, восьмое – на 70 мм, девятое и десятое – старые.

3. Старая самка, добытая 19 августа 1960 г. Первое маховое раскрыто на 56 мм, второе – на 77 мм, третье-шестое – старые, седьмое – раскрыто на 21 мм. Три крайних рулевых с обеих сторон старые, остальные – молодые.

4. Молодая самка, добытая 12 сентября 1882 г. Два крайние рулевые – старые (с обеих сторон), остальные – молодые и имеют нормальную величину.

5. Старый самец, добытый 3 октября 1899 г. Два крайние рулевые пера раскрыты всего на 31 мм, остальные рулевые закончили линьку. Много пеньков на брюхе, груди, в области плеча и задней части шеи.

6. Старый самец, добытый 20 октября 1956 г. Линька закончена, но следы ещё хорошо заметны.

У экземпляров, добытых в мае (два старых самца и одна старая самка) и июне (старый самец), не было заметно признаков линьки. К сожалению, я не имел возможности проследить начало линьки, так

как у меня не было экземпляров, добытых в 2-й половине июля, но, судя по состоянию экземпляров, добытых в 2-й половине августа, можно предположить, что кеклики начинают линьку с 3-й декады июля, а может быть и раньше.

На основании просмотренных материалов можно сделать вывод, что интенсивная линька проходит у кеклика с 2-й половины августа и заканчивается полностью в октябре. И если предположить, что линька начинается в конце июля, то процесс смены оперения у кавказского кеклика довольно затянут и длится почти 3 месяца.

О питании кавказского кеклика я располагаю небольшим материалом. Всего мною проанализировано содержимое зобов и желудков 7 птиц, добытых с 10 по 21 августа 1960 г. У всех добытых птиц обнаружены остатки стрекоз, кузнечиков, сухопутных моллюсков, гусениц каких-то бабочек, а также много листьев, цветы и семена различных субальпийских трав, ягоды малины, чёрной смородины и листья барбариса (у одного экземпляра). В целом растительная пища преобладала над животной и составляла 80% общего состава. В желудках всех птиц было много крупного песка и мелких камешков, преимущественно кварца.

На территории Кабардино-Балкарии у кекликов мало врагов. В тех местах, где они гнездятся, хищные птицы вообще немногочисленны. Хищных зверей, которые могли бы разорять гнёзда кекликов, ещё меньше. Скотоводство (пастьба скота) не сказывается отрицательно на их численности, так как гнёзда кекликов располагаются в таких каменистых местах, где мало растительности, за которой идут пасущиеся животные.

Таким образом, в Кабардино-Балкарии есть все возможности постоянно поддерживать численность кекликов на высоком уровне. Для этого необходимо лишь соблюдать элементарные правила охоты на них.

4. Кавказский улар *Tetraogallus caucasicus* Pall.

В Кабардино-Балкарии улар – довольно обычная птица. Если не считать перепела, то он по численности занимает второе место среди куриных (после кеклика). В настоящее время улар более многочислен, чем тетерев, серая куропатка и сильно истреблённый в нашей республике фазан. По всей видимости, относительно высокая численность улара объясняется тем, что на эту птицу за последние годы по всей республике запрещена охота. Обитает он в высокогорной зоне, в районе снежных вершин и встречается лишь в юго-западной части республики. Мне приходилось неоднократно наблюдать и добывать уларов в районах ледников Безенги, Эльбрус, Бечо, а также в верховьях рр. Адыл-Су и Ирик. Наибольшее количество уларов, по моим наблюдениям, сосредоточено в верховьях рр. Черек, Ирик, а также в районе перевала Донгуз-Орун.

Зимняя область обитания уларов мало чем отличается от летней.

В этом отношении наши наблюдения совпадают с данными А.А. Насимовича (1947). Мне только не приходилось наблюдать этих птиц ниже верхней границы лесного пояса. Даже в самые суровые зимы улары обычно держатся в пределах гнездового биотопа. В зимний период они обычно встречаются на южных склонах гор, где быстрее образуются выгревы или быстрее сдувается снег. Таким образом, размах сезонных вертикальных миграций у улара в Кабардино-Балкарии не столь значителен, как в других частях Кавказа, например, в Северной Осетии, где помёт этих птиц отмечали на высоте 2000 м н.у.м. (Бёме, 1958).

Ранней весной, в период спаривания, между самцами часто возникают ожесточённые драки, во время которых они выбивают друг у друга перья на груди, шее, горле и голове. Иногда самцы наносят даже друг другу большие раны. Так, 3 мая 1960 г. мне пришлось быть свидетелем подобного состязания двух старых петухов улара в районе р. Ирик. Своими движениями и позами улары очень напоминали дерущихся домашних петухов. Стоя друг перед другом в боевых позах, они то пригибали голову и шею к земле, то внезапно подпрыгивали и налетали друг на друга, ударяя грудью, ногами и крыльями. По временам они схватывали клювом перья противника и выдирали их.

20 мая 1960 г. в том же районе мне удалось добыть двух самцов, которые имели серьёзные повреждения от драк. У них шея, грудь и голова были усеяны ранами, шириной от 2 до 7 мм. Такого же самца добыл 25 мая 1960 г. в районе Эльбруса студент Кабардино-Балкарского университета Аюнц. У этого экземпляра перья были выбиты даже на брюхе, плечах и спине.

Начало весеннего возбуждения у самцов приходится на конец марта - 1-ю декаду апреля в зависимости от характера весны. Во 2-й декаде мая драки между самцами, видимо, прекращаются. Во всяком случае мне не приходилось наблюдать их позднее 10 мая. У упомянутых выше самцов, добытых 20 мая, следы драки были старые, раны их уже заживали, а местах выбитых появились новые растущие перья.

Во время ухаживания за самкой самец приподнимает хвост и держит его полураскрытым. Голова при этом у него опущена. В такой же позе он бегает с криком в различных направлениях, часто пересекая дорогу самке. После того, как самки сядут на яйца, самцы оставляют их, собираются в стаи по 15-20 птиц и уходят выше в горы, придерживаясь кромки тающего снега. По окончании брачного периода самцы становятся молчаливыми. Брачные крики их прекращаются, и лишь изредка они издают крики в случае тревоги.

По моим наблюдениям, самцы не принимают никакого участия в гнездостроении, насиживании кладки, а также я не наблюдал, чтобы они

принимали участие в вождении птенцов. Если иногда у выводка мы встречали не только самку, но и самца, то это объясняется, видимо, совпадением гнездового района выводка с кормовыми участками самцов. Случаи подобного рода мне неоднократно приходилось наблюдать, а в июле 1954 г. добыть старого самца и самку, державшихся вместе с выводком, в котором птенцы были размерами с серую куропатку.

Гнездо улар устраивает в различных местах – под нависшими камнями или же прямо на земле без всякого прикрытия сверху. Иногда гнёзда строятся среди зарослей типчака или рододендронов на небольших открытых площадках. Гнездо обычно слабо выстилается сухими листьями и стеблями разнотравья и собственными перьями. Бывают гнёзда, в которых кроме немногих перьев самой птицы нет никакой подстилки.

Полные кладки улара я находил уже, начиная с 18 мая. Всего в период с 1951 по 1960 гг. на территории Кабардино-Балкарии мною было найдено 8 гнёзд этого вида. Количество яиц в них варьировало от 5 до 8-ми. Яйца были промерены мною в 3 кладках. Размеры яиц в них были следующими (в мм):

1) – 65,7×45,8; 67,6×45,6; 68,8×48,5; 68,3×47,8; 68,3×47,8; 69×48;
2) – 65,5×45,8; 67,6×45,6; 68,4×47,8; 68×47,8; 69×48; 65,9×45,5; 65,7×45,8;
3) – 65,6×46; 65,8×45,9; 65,8×48,2; 66,1×44,9; 66,8×45,9; 67,2×45,8; 67,7×46,7.

Гнездо с 8 яйцами было найдено один раз – 25 мая 1956 г. в верховье р. Хулам, в районе ледника Безенги. Указание Г.И. Радде (1884) на то, что в кладке уларов бывает до 20 яиц, мне кажется мало вероятным.

Иногда гнездо улара располагается на довольно больших высотах – в зоне вечного снега, где в мае, июне и даже июле часто бывают снегопады. Трудно себе представить, что в таких условиях птица может выводить птенцов. Тем не менее, такие случаи не единичны, и птенцы в таких местах развиваются нормально. Одно такое гнездо, найденное 30 мая 1960 г. в районе Донгуз-Оруна, мне показал студент Кабардино-Балкарского университета В. Дмитриев. Гнездо было построено на небольшом уступе выступающей среди снега скалы. Самка сидела очень крепко на яйцах и подпускала довольно близко, на расстояние 1-2 м (фото 10). Спугнутая самка не слетала, а взбежала вверх и, находясь в 5-10 м от нас, издавала приглушённый тревожный крик. В гнезде было 5 яиц (фото 11).

Из них при нас от скорлупы освободился 1 птенец, а 3 вылупились к вечеру того же дня (фото 12). Одно яйцо оказалось болтуном. Судя по дружному вылуплению, насиживание в гнезде началось после полного окончания кладки, что вообще наблюдается у всех куриных, в

частности у фазана, кеклика, тетерева и др. (фото 13-14).

Для ознакомления с процессом линьки было просмотрено 30 взрослых уларов из коллекции Зоологического института АН СССР, Кабардино-Балкарского университета и моей собственной. Ниже привожу описание экземпляров, представляющих, с моей точки зрения, наибольший интерес.

1. Старая самка, добытая 8 мая 1883 г. К.Н. Россиковым в Дагестане, имеет на брюхе немного нераскрывшихся или только что раскрывшихся пеньков. На других частях тела, в том числе и на крыльях, следов линьки не замечено.

2. Старый самец, добытый мною 24 мая 1960 г. в районе Эльбруса, имеет на груди немного пеньков растущего контурного пера.

3. Старая самка, добытая мною 27 мая 1957 г. в районе перевала Бечо, уже находилась в стадии линьки. Первое-седьмое первостепенные маховые старые, но восьмое и девятое (десятое выбитое дробью) отросли и раскрыты на 43 и 31 мм. Стержни их одеты роговым чехлом на 33 мм. Судя по отсутствию насадного пятна, эта самка была, видимо, холостой.

4. Старый самец, добытый мною 28 мая 1960 г. в районе Эльбруса, имеет растущие перья – седьмое и восьмое первостепенные маховые на обоих крыльях. Других следов линьки не замечено.

5. Старый самец из коллекции М.А. Мензбира (Зоологический институт), добытый 9 июля 1896 г. в Северной Осетии, имеет большое количество пеньков растущего контурного пера на голове, шее и горле. Восьмое маховое в пеньке. Остальные маховые и все рулевые – старые.

6. Старая птица (пол?), добытая 4 августа 1896 г. в Северной Осетии, имеет много пеньков на шее и плечах. Первое-четвёртое первостепенные маховые – старые. Пятое раскрыто на 35 мм, его стержень одет роговым чехлом на 30 мм. Шестое маховое – 90 мм, его стержень одет роговым чехлом на 10 мм. Седьмое маховое раскрыто на 125 мм и не доросло до нормальной величины примерно на 40 мм. Восьмое маховое – растущее перо, раскрыто на 124 мм, девятое – на 140 мм, десятое выбито. Рулевые находятся в усиленной стадии линьки, среди них есть раскрытые только на 20-40-50 мм. Пара центральных рулевых раскрыта всего на 73 мм.

7. Старая самка, добытая 13 сентября 1882 г. К.Н. Россиковым в Дагестане. Линька происходит на горле, шее, по бокам тела, на груди, плечах. Первое маховое раскрыто на 65 мм, остальные маховые новые. Рулевые ещё не закончили линьку. Имеются перья, раскрытые всего на 50-70 мм.

8. Старый самец, добытый 5 октября 1896 г. в Северной Осетии. Линька хорошо заметна на брюхе, груди, шее и голове. Длина четвёртого махового всего 65 мм (у обоих крыльев). Остальные маховые имеют

нормальные величины. Экземпляры, добытые в 3-й декаде октября, закончили линьку.

Таким образом, исходя из просмотренного материала, мы можем сказать, что процесс линьки у улара протекает в весьма растянутые сроки. В той или иной степени линяющие старые птицы могут быть встречены в период с мая по октябрь включительно. По этому вопросу наши данные расходятся с имеющимися в литературе указаниями, отмечающими начало линьки у кавказского улара (Носка, 1896) в начале июля, а окончание линьки старых птиц – в конце сентября (Бёме, 1925). Линька улара во многом сходна с линькой фазана, у которого она тоже очень сильно растянута.

Вес 4 взрослых самцов уларов, добытых мною в Кабардино-Балкарии, равнялся 2200, 2100, 1875, 1870, 1840 г. В желудках и зобах трёх самцов уларов, добытых мною в 3-й декаде мая 1960 г. в районе Эльбруса, я обнаружил, в основном, растительную пищу, состоявшую из зелёных листьев травянистых альпийских растений и корневищ злаков, а также нескольких экземпляров мелких саранчовых. Среди растений преобладали камнеломка, овсяница и лапчатка. Остальные виды (осока Буша, трёхзубчатый колокольчик, гадючий лук, горный астрагал, лисохвост, примула) были представлены в незначительном количестве.

5. Северокавказский фазан *Phasianus colchicus septentrionalis* Lor.

В Кабардино-Балкарии фазан обитает, как правило, только в равнинной и предгорной зонах и обычно не проникает в горы выше 600 м н.у.м. Лишь в отдельных случаях фазаны могут быть встречены в горах выше этого уровня. Это возможно в самом северо-западном районе республики (Зольский район), где предгорная зона, благодаря особенностям рельефа, незаметно, без резких границ переходит в горную. В этом районе вообще отсутствуют лесные массивы, а по речным долинам высоко в горы проникают сплошные заросли кустарников, являющиеся излюбленным местом обитания фазана на Северном Кавказе. Здесь, на высоте 1000 м н.у.м., в районе Актопрака, в мае 1956 г. А.К. Темботовым был встречен одиночный самец фазана. Это наивысшая точка, где когда-либо наблюдали фазана в Кабардино-Балкарии. Учитывая то, что численность фазанов в республике, благодаря специальному завозу их, организации фазаньего хозяйства и полному запрету охоты на них, стала за последние годы заметно повышаться, можно предполагать, что в Зольском районе фазан в дальнейшем будет иметь более широкое распространение и ещё выше проникнет в горы.

Попутно отметим, что в настоящее время наибольшее количество фазанов в Кабардино-Балкарии встречается в районе Гедука, Чёрной речки и Александровского. Однако, по сравнению не только с прошлым

столетием, когда из Кабардино-Балкарии за сезон вывозили до 20000 пар фазанов (Россиков, 1884), но и с 1940-ми годами (Туров, 1941), численность фазана в республике продолжает оставаться всё же очень низкой.

Основным биотопом фазана на Северном Кавказе, как известно, являются заросли кустарников – облепихи, тёрна, шиповника, барбариса, калины и др. Здесь он гнездится, находит надёжное убежище от врагов и богатый корм – ягоды этих кустарников. В лесах фазан тоже встречается (например, в Гедукском лесу или в лесу в районе Чёрной Речки), но лишь в том случае, если имеется богатый кустарниковый подлесок. Тростниковые заросли не являются характерными стациями обитания фазана в Кабардино-Балкарии. Он заселяет их, в основном, вынужденно, в случае раскорчёвки кустарников. Подобное явление мне приходилось наблюдать в районах с. Аргудан, Александровское, Озрек, Нижний Черек и др. Массовая раскорчёвка на больших площадях, производимая сейчас в республике в целях освоения целинных земель, вообще приводит к значительным перекочёвкам фазана из одного района в другой; этим, очевидно, и следует объяснять случаи появления фазанов в таких местах, где раньше они никогда не наблюдались. К примеру, можно привести кустарниковые заросли в районе с. Аргудан, на высоте 600 м н.у.м., где до 1958 г. мне ни разу не приходилось наблюдать фазана, хотя этот район я регулярно посещал с детства. И только в 1959 г. здесь внезапно появились фазаны. Летом этого года мне удалось найти 4 фазанов (2 фазанов и 2 самок), а в октябре 1960 г. я обнаружил здесь уже 18 молодых и 4 старых птицы.

Следует отметить, что весьма губительным образом на численности фазана сказывается не только раскорчёвка кустарников, но и выжигание их на вырубках, приводящее к полному уничтожению всех кладок и птенцов иногда на весьма значительных площадях. Так, например, в районе Гедука после проведения подобного мероприятия в мае 1956 г. на площади всего в 2,5 га было найдено 46 (три кладки) яиц, пострадавших от пожара. Естественно, что охотничье управление и общество охраны природы должны позаботиться о том, чтобы эта "санитарная" очистка леса не проводилась в период размножения фазанов.

Как уже было отмечено, фазан гнездится в кустарниковых зарослях. Его гнёзда обычно бывают хорошо замаскированными, так что найти фазанье гнездо не так легко. Однако в отдельных случаях гнёзда располагаются на довольно открытых местах и бывают хорошо заметны даже с расстояния 5-6 м. Интересно, что такие гнёзда не обязательно разоряют. Например, в найденном мною в Гедукском лесу гнезде фазана с 13 яйцами, располагавшемся очень заметно у самой дороги, по которой постоянно ходили люди, успешно вылупились птенцы. Самка сидела

на яйцах очень плотно и подпускала к себе на расстояние 5 м (фото 15).

В отличие от других куриных птиц, фазан строит довольно плотные гнёзда с подстилкой до 52 мм толщиной. Материал гнезда сильно варьирует в зависимости от места расположения гнезда. Гнёзда, расположенные в лесу, строятся, в основном, из старых листьев и веточек деревьев; в гнёздах, расположенных среди кустарников, преобладает травянистая растительность, а в гнёздах, построенных среди тростников, – стебли и листья тростника. Одним словом, гнездостроительный материал целиком зависит от характера биотопа.

Полные кладки яиц фазана в Кабардино-Балкарии можно находить, уже начиная с 1-й декады мая. В кладке бывает от 10 до 18 яиц (фото 16). Всего с 1951 по 1960 гг. на территории Кабардино-Балкарии мною было найдено 20 гнёзд фазана с полными кладками яиц. В большинстве случаев кладка состояла из 13 яиц (13 из 20 гнёзд), в 6 случаях – из 14 и только в одном случае – из 18 яиц. Яйца обычно располагаются в гнезде по кругу, острыми концами внутрь. Остальные яйца, находящиеся внутри круга, часто лежат острыми концами наружу. Таким образом, при большом количестве яиц в кладке, достигается максимальная экономия пространства. Поскольку данные о размерах яиц северокавказского фазана отсутствуют в справочной литературе, считаю не лишним привести их. Всего было измерено 130 яиц, размеры которых варьировали в пределах от 43,0×34,4 мм до 46,9×36,8 мм. Вес яйца за 5 дней до вылупления (по 13 экз.) варьировал от 26,5 до 30,0 г. Средний вес скорлупы (по 5 экз.) оказался равным 6,5 г.

Мне не приходилось наблюдать, чтобы самцы фазана принимали какое-нибудь участие в насиживании кладки или вождении выводка. Если они и держатся иногда поблизости от гнезда или выводка, то это скорее всего следует объяснять совпадением кормовых угодий с местами гнездования и пребывания выводков.

После того, как самки сядут на яйца, самцы иногда объединяются по несколько штук вместе. В период насиживания самка покидает гнездо на время кормления и, естественно, может быть встречена в обществе с одним или даже несколькими самцами. Однако я полагаю, что эти встречи случайны, объясняющиеся совпадением кормовых стаций. Постоянная связь самца с самкой наблюдается лишь сравнительно короткий период времени – с конца марта по 1-ю декаду мая, до окончания кладки. В этом отношении фазан очень напоминает улара, и его так же, как и улара, с моей точки зрения, нельзя назвать моногамом в полном смысле этого слова. К сказанному следует добавить, что и в брачный период фазаны далеко не всегда встречаются строго парами. Мне приходилось наблюдать, что на участке постоянного токования фазана с

одним самцом длительное время (с 20 марта по 20 апреля 1957 г. в районе Думанука) держались две самки.

В Кабардино-Балкарии птенцы у фазана появляются, в основном, во 2-й декаде июня, хотя у отдельных особей они вылупляются уже в первых числах июня. Наиболее ранняя встреча только что вылупившихся птенцов – 9 мая (1957 г.). Самка сидит на яйцах, как правило, очень крепко, особенно в последние дни насиживания. Бывает, что при испуге она слетает с гнезда настолько резко, что даже разбрасывает, а иногда и разбивает яйца. В некоторых случаях она незаметно сбегает с гнезда.

За одним гнездом, в котором происходило насиживание кладки, мною было установлено постоянное наблюдение с целью выяснения особенностей поведения самки. Наблюдение велось в бинокль с расстояния 10 м. Оказалось, что самка дважды в день оставляет гнездо на 15-20 минут. Утром она сходила с гнезда между 8 и 9 час., а вечером между 3 и 5 час. Кормёжка, как правило, начиналась почти сразу после оставления гнезда. Самка кормилась у муравейников, находившихся в непосредственной близости от гнезда. 4 июня 1960 г. она, по-видимому, так и не сошла с гнезда. Мне не удалось установить этого. Целый день шёл дождь, который прекратился лишь к 12 час. дня 5 июня, и сразу же после этого, в необычное для неё время (в 1 час дня), самка отправилась кормиться к муравейникам.

Самка фазана настолько активно защищает своё потомство, что иногда даже вступает в драку с собакой. Мне пришлось наблюдать такую сцену 12 июня 1957 г. Я ходил с собакой по кустарниковым зарослям в районе Думанука. Собака вскоре напала на выводок, состоявший из 9 пуховых птенцов. Появившаяся внезапно самка с тревожным криком буквально бросалась на собаку, которая вскоре её и задушила. Правда, в аналогичном случае подобное поведение самки напугало другую, менее опытную собаку, которая, не выдержав натиска птицы, бросилась в сторону с поджатым хвостом.

Созывая птенцов, самка фазана издаёт звук, напоминающий кудахтанье домашней курицы – курт-курт-курт...

В июне суточная активность самцов складывается следующим образом. Пробуждаются они к 4 час. утра, о чём можно судить по их крику. Активная перекличка продолжается у них до 5 час. утра. В дальнейшем, в течение целого дня, можно услышать лишь отдельные редкие крики самцов. В это время они или кормятся на земле среди кустарников на полянах, или сидят, отдыхая на деревьях. К вечеру снова начинается оживлённая перекличка, продолжающаяся с 5 до 7 час. К этому времени уже темнеет, и самцы фазана устраиваются на ночёвку. Как правило, ночь они проводят на ветвях деревьев.

О характере питания фазанов в Кабардино-Балкарии я могу судить по данным анализа содержимого желудков и зобов 12 экз., а также на основании непосредственных наблюдений за птицами в природе. В зобах и желудках 4 фазанов, добытых мною в зимний период, были обнаружены зёрна кукурузы, пшеницы, семена конопли и сорных трав, ягоды облепихи, тёрна, остатки ягод шиповника. Весной, в апреле и мае, фазаны, концентрируясь у полей, часто склёвывают молодые всходы озимых злаков и кукурузы. У птиц, добытых в июне, желудки и зобы были наполнены листьями и цветами различных трав (главным образом молочаев), а также небольшим количеством насекомых, среди которых преобладали муравьиные куколки. Кроме того, в желудках фазанов были обнаружены остатки кузнечиков, саранчовых, личинок наземных моллюсков. В июле 1960 г. в Гедукском лесу я ежедневно наблюдал фазанов, кормившихся на муравейниках. В этом лесу мне удалось насчитать 120 муравейников, разрытых фазанами. В конце июля - начале августа в кормовом рационе фазана начинают встречаться уже различные ягоды, прежде всего ежевика.

Для выяснения процесса линьки северокавказского фазана мною было просмотрено 100 экз. этого вида, хранящихся в музее Зоологического института АН СССР, и 20 экз., добытых непосредственно в Кабардино-Балкарии. Имевшийся в моём распоряжении материал показывает, что сроки линьки у фазана очень сильно растянуты. У основной массы птиц смена годового наряда происходит с конца июня по октябрь включительно, т.е. линька растянута почти на 4 месяца. Полностью перелинявшие особи начинают встречаться в Кабардино-Балкарии только с конца октября. В то же время отдельные экземпляры, сменяющие ещё мелкое контурное перо, попадаются вплоть до середины 3-й декады ноября. Так, в Зоологическом институте АН СССР имеется 1 экз. старого самца фазана, добытого К.Н. Россиковым в районе г. Прохладного 25 ноября 1882 г. У него на зобу, плечах, пояснице и шее хорошо заметны пеньки растущих перьев. Линька маховых перьев (у самок) начинается с конца июня. Так, из просмотренных мною экземпляров самок, наиболее ранняя линька маховых отмечена у старой самки, добытой 28 июня 1939 г. У неё восьмое маховое, которое у фазанов вообще выпадает первым, имело опахало (раскрытая часть растущего пера) длиной всего 4-5 мм. У молодых птиц рулевые и маховые перья взрослого наряда иногда интенсивно растут ещё в октябре. Например, у двух молодых самцов, добытых мною 8 октября 1960 г. в районе с. Александровское, основания всех маховых (кроме двух первых?) были в тёмных роговых чехлах, а все рулевые не достигли ещё и половины своей нормальной величины.

6. Серая куропатка *Perdix perdix lucida* Altum

По литературным данным, на Северном Кавказе встречаются два подвида серой куропатки – кавказская (горная) и обыкновенная (равнинная). Из-за отсутствия достаточного материала я не мог убедиться в наличии на территории Кабардино-Балкарии кавказского подвида, поэтому и указываю лишь на несомненный для меня подвид обыкновенной серой куропатки. Два экземпляра старых самок, добытые К.Н. Россиковым в равнинной зоне Кабардино-Балкарии в 1882 г., существенно не отличаются от добытых мною в горах двух старых самцов.

На территории республики серая куропатка – самый редкий вид из всех куриных. В конце прошлого столетия (Россиков, 1884) серая куропатка была, однако, довольно многочисленной птицей в Кабардино-Балкарии. По сведениям, полученным от охотников, она была обычной птицей даже в недавнем прошлом, лет 10-15 тому назад. По всей видимости, сокращение численности этой птицы произошло в последние годы в связи с освоением целинных участков и механизированной уборкой сельскохозяйственных культур, во время которых погибают кладки, птенцы и даже взрослые птицы. Кроме того, немалую роль сыграла неумеренная охота на серую куропатку, проводившаяся в недалёком прошлом в республике, без учёта сроков и норм отстрела. В районе с. Плановское (равнинная зона) в период моих наблюдений (1951-1960 гг.) мне пришлось наблюдать куропаток всего 8 раз: 2 выводка и 6 одиночных взрослых птиц. В горах, где их угодья не так сильно изменились, мне приходилось встречать куропаток значительно чаще, чем в равнинной зоне.

В гнездовой период куропатка распространена во всех зонах вплоть до альпийского пояса и заселяет на равнинах поля и луга, а в горах – субальпийские и даже альпийские луга. В осеннее и зимнее время куропатки спускаются в долины рек или на равнины. По данным К.Н. Россикова, в суровую зиму 1882 г. в конце января куропатки во множестве появились на станичных задворках, а также в садах и огородах.

По данным Н.Я. Динника (1886), в кладке серой куропатки на Северном Кавказе бывает от 16 до 24 яиц. В 6 найденных мною на субальпийских лугах гнёздах, количество их варьировало от 6 до 10. Птенцов мне приходилось наблюдать во 2-й декаде июня, наиболее поздние выводки отмечены мною во 2-й декаде июля. Так, 18 июля 1956 г. я встретил 6 ещё плохо летавших птенцов в районе с. Плановское, в 2 км от р. Терека. Выводок держался в подсолнухе.

В желудках и зобах трёх добытых в летний период экземпляров были обнаружены листья зелёной травы и остатки насекомых. У двух куропаток, добытых зимой (январь?), желудки и зобы были наполнены ягодами облепихи и тёрна.

7. Сизый голубь *Columba livia livia* Gmelin

Сизый голубь в Кабардино-Балкарии встречается круглый год. В период гнездования он держится в горной зоне и гнездится колониями на скалах, начиная от 700-800 м н.у.м. вплоть до самых высоких перевалов или подножий снежных вершин. В гнездовое время я неоднократно наблюдал сизых голубей в районах ледников Эльбрус, Безенги, Бечо, Шхельда и др.

Наибольшее количество гнездящихся голубей сосредоточено, однако, в районе Скалистого хребта, на высоте 900-1200 м н.у.м. Здесь сизый голубь – довольно обычная птица, которую можно встретить во время каждой экскурсии. Отметим попутно, что в Кабардино-Балкарии сизые голуби не живут в городах, а встречаются только в диком состоянии на скалах. Их нет даже в г. Тырныаузе, расположенном на высоте 1000 м н.у.м. и имеющем 4-5-этажные каменные здания.

Зимой голуби совершают довольно большие вертикальные кочёвки, во время которых встречаются на полях равнинной и предгорной зон. Например, я неоднократно наблюдал сизых голубей в районе г. Прохладного в январе и феврале 1952-1960 гг.

Период кладки яиц у сизых голубей очень сильно растянут. Свежие полные кладки в Кабардино-Балкарии можно находить, начиная с 1-й декады мая до конца 1-й декады августа. Так, 21 августа 1960 г. в Хуламском ущелье в районе с. Безенги я нашёл 3 гнезда сизого голубя с сильно насиженными яйцами. В этом районе я находился с 21 по 25 августа, и всё это время голуби насиживали яйца. Судя по тому, что период насиживания у сизого голубя продолжается 17-18 дней (Мекленбурцев, 1951), кладки в этих гнёздах были закончены, очевидно, в конце 1-й декады августа.

Наиболее ранняя свежая кладка сизого голубя была найдена мною 9 мая (1958 г.) в районе Голубого озера. Данная находка по всей вероятности не является предельно ранней, ибо, судя по появлению первых птенцов, которые в Кабардино-Балкарии появляются иногда в начале 2-й декады июня, у некоторых птиц кладка должна заканчиваться уже в конце апреля или в первых числах мая. Столь раннее размножение характерно, однако, для немногих особей. У большинства птиц кладка заканчивается во 2-й декаде мая, а лётные птенцы появляются в 1-й декаде июля.

Пища сизых голубей довольно однообразна и состоит, в основном, из зёрен пшеницы, кукурузы, ячменя, проса, а также небольшого количества семян различных трав. Зёрна этих сельскохозяйственных культур были обнаружены мною у всех 10 экз., добытых в июне (2 экз.), июле (2 экз.), августе (3 экз.) и феврале (2 экз.). Только у одного экзем-

пляра, добытого 2 апреля 1961 г., в желудке оказалось несколько семян лебеды шаровидной.

В летнюю пору сизые голуби совершают регулярные кормовые вылеты с гор в долины или на поля предгорной зоны, протяжённостью до 20-30 км. При этом птицы летят плотными стаями. Наиболее крупную стаю из 80 птиц мне пришлось наблюдать 19 июня 1960 г. в районе с. Аргудан. Утром голуби появляются на полях с 5 час. и остаются здесь до 6-7 час. Второй вылет на кормёжку наблюдается вечером – в 5-6 час. Часто можно видеть стаи или пары сизых голубей у ручейков, а иногда даже около луж в середине дня (в 12-14 час.), прилетевших на водопой.

Зимой кормовые вылеты становятся более короткими, так как зимняя область обитания голубей находится значительно ниже – в долинах рек предгорной или равнинной зоны, т.е. в непосредственной близости от кукурузных полей, на которых в этот период года голуби преимущественно кормятся. Они собирают падалицу в местах выпаса скота, где снег бывает выбит копытами овец или коров. Несколько раз в январе 1959-1960 гг. мне приходилось наблюдать, как голуби оставались ночевать на кукурузных полях и проводили ночь, сидя на стеблях кукурузы. Просмотр 30 экз. сизых голубей, добытых в разных местах Кавказа, показал, что линька у этих птиц растянута с 1-й декады мая до конца октября.

8. Клинтух *Columba oenas oenas* L.

В гнездовой период в Кабардино-Балкарии клинтух встречается в небольшом количестве в лиственных лесах предгорной и, частично, горной зоны. Гнёзда этого голубя в республике найти мне не удалось.

Э. Менетрие (Menetries, 1832), М.Н. Богданов (1879), Н.Я. Динник (1886) считают клинтуха оседлой птицей на Кавказе. Р.Л. Бёме (1958) указывает, что этот вид является гнездящейся перелётной птицей на Центральном Кавказе. Мои данные относительно клинтуха подтверждают указания предыдущих авторов, и я могу с уверенностью сказать, что небольшая часть этих птиц остаётся зимовать на территории Кабардино-Балкарии. Мне неоднократно удавалось добывать клинтухов зимой 1958-1960 гг. В это время они так же, как и сизые голуби, предпочитают держаться на кукурузных полях. На ночь часть зимующих голубей улетает в лес, а часть, так же как сизые голуби, проводит ночь на полях, сидя на кустарниках или просто на стеблях кукурузы.

Надо отметить, что численность этого вида осенью очень велика. На осеннем пролёте огромные стаи клинтухов встречаются на кукурузных полях, где они находят корм в виде опавших зёрен кукурузы. 15 сентября 1956 г. в одной стае я насчитал около 4 тыс. клинтухов. Они

сидели на проводах высоковольтной линии, проходившей через кукурузное поле. Начиная со 2-й декады октября численность клинтухов в республике резко уменьшается в связи с окончанием пролёта.

В желудках отстрелянных мною 20 экз. на осеннем пролёте и 4 экз. зимой оказались исключительно зёрна кукурузы.

9. Вяхирь *Columba palumbus palumbus* L.

В Кабардино-Балкарии вяхирь встречается круглый год. Возможность зимовки вяхиря в республике предполагал ещё М.Н. Богданов (1879), но Н.Я. Динник (1886) отрицал справедливость этого предположения. Так же, как и Н.Я. Динник, Р.Л. Бёме (1958) считает вяхиря гнездящейся перелётной птицей на Северном Кавказе. Мои же наблюдения подтверждают предположение М.Н. Богданова о возможности зимовок вяхиря на Кавказе. Я неоднократно наблюдал и добывал этих птиц в январе-феврале 1957-1960 гг. Однако надо сказать, что вяхирь встречается зимой в очень ограниченном количестве и только в равнинной и предгорной зонах. В зимний период вяхири держатся небольшими стайками, чаще всего вместе с клинтухами. Зимой вяхири кормятся на кукурузных полях, а на ночь улетают обычно в леса равнинной и предгорной зон.

В период гнездования вяхирь заселяет высокоствольные лиственные леса. В горной зоне в летнее время я наблюдал его до 900 м н.у.м. Полные свежие кладки вяхиря в Кабардино-Балкарии встречаются в 1-й половине мая. Наиболее раннее гнездо со свежей кладкой было найдено мною 8 мая 1957 г. в районе с. Чёрная Речка. Массовый вылет молодых голубей из гнёзд происходит в конце 2-й декады июня. Наиболее поздние сроки вылета птенцов из гнёзд отмечались мною в 2-й декаде июля. Только что покинувших гнёзда молодых вяхирей я добывал 18 июля 1960 г. в районе г. Прохладного. Судя по этому наблюдению, свежие кладки у вяхиря в Кабардино-Балкарии бывают ещё и во 2-й декаде июня.

Пища вяхиря довольно разнообразна. Так, у одного самца, добытого 8 февраля 1960 г., зоб и желудок были заполнены ягодами тёрна, у остальных экземпляров, добытых мною зимой (4 экз.) и летом (6 экз.), в желудках и зобах были обнаружены зёрна кукурузы, пшеницы, подсолнуха, проса и семена конопли.

10. Горлица *Streptopelia turtur turtur* L.

Горлица довольно многочисленная птица в Кабардино-Балкарии. Она заселяет леса различных типов и встречается как в равнинной зоне, так и в горной, куда проникает вплоть до верхней границы соснового леса. Гнездование горлицы я неоднократно наблюдал в сосновом лесу, в

районе Эльбруса, на высоте 1800-2000 м н.у.м. Однако надо сказать, что численность её несравненно выше в лесах равнинной и предгорной зон, чем в горах. Начиная с 900 м н.у.м., количество этих птиц заметно уменьшается.

Основная масса горлиц зимой улетает из республики. Осенний пролёт начинается с конца августа. Массовый пролёт происходит, начиная с 2-й декады сентября. Небольшая часть горлиц остаётся зимовать в Кабардино-Балкарии. Мне приходилось регулярно наблюдать горлиц зимой и добывать их ежегодно с 1955 по 1960 гг. Зимой горлицы держатся преимущественно в равнинной зоне. Чаще всего я видел их в это время года в районе пенькозавода, где птицы концентрировались у складов конопли, семенами которой они, в основном, и питались.

Весенний пролёт происходит обычно, начиная с 2-й декады апреля. Вскоре после прилёта они приступают к размножению. Горлицы размещают свои гнёзда на различной высоте от земли. Найденные мною 30 гнёзд располагались на высоте от 1 до 4 м над землёй и находились как на кустарниках, так и на деревьях как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего, однако, в Кабардино-Балкарии горлицы строят гнёзда на кустарниках, а также на одиночных фруктовых деревьях, растущих среди леса или на лесных полянах.

Кладка у горлиц сильно растянута. В республике свежие яйца можно находить с 1-й декады мая до 1-й декады июля. Естественно, что также сильно растянуты поэтому и сроки вылета птенцов из гнёзд. Наиболее ранний срок вылета птенцов отмечен мною 17-18 июня (1958 г.), а наиболее поздний – в августе. Так, птенцы горлицы, только что вылетевшие из гнезда, были добыты мною 15 августа 1960 г. в Хуламском ущелье. В желудках и зобах добытых мною в августе и сентябре 15 экз. горлиц были обнаружены исключительно зёрна пшеницы и кукурузы. А у 6 экз., добытых мною 20 января 1957 г. и 10 февраля 1960 г., кроме зёрен кукурузы были обнаружены семена конопли, которые составляли 80% всей пищи.

11. Чернобрюхий рябок *Pterocles orientalis* L.

В работе Л.Б. Бёме (1926) есть указания о залёте чернобрюхого рябка зимой на Северный Кавказ. Он наблюдал этот вид в декабре 1915 г. и в ноябре 1924 г. в Северной Осетии, около г. Владикавказа.

12. Саджа *Syrrhaptes paradoxus* Pall.

Л.Б. Бёме (1926) указывает на добычу 1 экз. в ноябре 1913 г. в Северной Осетии у г. Владикавказа. В других местах Северного Кавказа этот вид не встречен.

13. Лысуха *Fulica atra atra* L.

Лысуха встречается в Кабардино-Балкарии в довольно большом количестве на осеннем пролёте. Первые стаи появляются в республике в 1-й половине ноября. За период 1951-1960 гг. наиболее ранний пролёт отмечен 10 ноября 1957 г. Интересно отметить также аномально ранний прилёт лысух в 1950 г., когда одна лысуха была добыта 4 июля около с. Кенже. По всей вероятности, лысухи залетают из других районов Северного Кавказа, а именно из Ставропольского края, граничащего на северо-западе с Кабардино-Балкарией. По данным Н.Я. Динника (1886), в Ставропольском крае, где имеются большие пруды и озёра, поросшие камышом, лысуха является довольно обычной птицей. По его же данным, она поселяется также и на солёных озёрах.

Массовый осенний пролёт лысух в Кабардино-Балкарии происходит в 3-й декаде ноября, причём много лысух погибает в ненастную погоду, налетая на столбы, провода высоковольтных линий, заводские трубы и телеграфные провода. Особенно губительно сказывается моросящий дождь, переходящий ночью в снегопад.

Так, во время массового пролёта лысух в районе г. Нальчика 24 ноября 1954 г. моросил слабый дождь, перешедший к вечеру в снег. Несмотря на ударивший мороз (–19°), целую ночь был слышен несмолкающий крик беспорядочно летевших над городом птиц, а утром 25 ноября школьники принесли в музей Пединститута 6 лысух, подобранных прямо на улице. Такое явление отмечалось и в других районах республики, но особенно было заметно в городах, куда птиц привлекал электрический свет, пробивавшийся сквозь густой туман.

Наиболее поздний пролёт лысух в Кабардино-Балкарии я наблюдал 5 декабря 1955 г. Однако К.Н. Россиков (1884) приводит данные о зимовке лысух в республике. Так, в его работе указано, что "лысуха не раз наблюдалась мною в 1881-1882 г. В последующую зиму видел два раза, 30 декабря и 19 января" (стр.43). Но мне не приходилось наблюдать лысух зимой на территории Кабардино-Балкарии.

Во время пролёта лысухи задерживаются на некоторое время около водоёмов, болотистых мест и рек. Иногда даже попадаются в садах и огородах. Так, 20 ноября 1957 г. на пришкольном опытном участке Аргуданской средней школы я добыл двух лысух – самку и самца. Интересно отметить, что птицы (стая около 10 экз.) сидели в саду на совершенно сухом месте. По всей видимости, это была стая, потерявшая ориентировку и заблудившаяся из-за ночного тумана. Лысухи были обнаружены мною в саду на рассвете.

14. Камышница *Gallinula chloropus chloropus* L.

В Кабардино-Балкарии камышница – гнездящаяся, перелётная птица. В гнездовое время встречается в равнинной зоне, в поймах рек Малка, Терек, Баксан, Черек. Чаще всего мне приходилось наблюдать её в пойме р. Малки, в районе с. Приближное и Екатериноградское, где она заселяет болотистые места, заросшие камышами и тростником.

О характере пребывания камышницы на Кавказе в орнитологической литературе существуют разные мнения. Э. Менетрие (1832) наблюдал этих птиц в камышовых зарослях в районе Ленкорани. М.Н. Богданов (1879) считает камышницу обычной птицей на Кавказе, за исключением горных районов. Н.Я. Динник указывает, что она является гнездящейся перелётной птицей на Северном Кавказе в районе Ставрополя. К.Н. Россиков (1884) включает камышницу в список птиц, зимующих в восточной части долины р. Малки. Г.И. Радде (1885) приводит её в числе гнездящихся перелётных птиц на Кавказе, за исключением горных районов. По данным Л.Б. Бёме (1926) и Р.Л. Бёме (1958), этот вид встречается случайно на пролёте в окрестностях г. Владикавказа. По моим данным, камышница является гнездящейся перелётной и частично зимующей птицей в равнинной зоне Кабардино-Балкарии.

Камышница прилетает весной, начиная со 2-й декады апреля. Самый ранний её прилёт мною отмечен 14 апреля 1958 г., а наиболее поздний – 20 апреля 1960 г. Вскоре после прилёта она приступает к размножению. Полные кладки свежих яиц можно находить в 1-й декаде мая. Самая ранняя кладка в количестве 7 яиц была найдена мною 9 мая 1960 г. в районе с. Приближное, в пойме р. Малки, а самая поздняя – 20 июня 1957 г. в том же районе. Молодых, только что вылупившихся птенцов я нашёл 16 июля 1960 г. в районе с. Екатериноградское.

Осенний пролёт камышницы в республике проходит в сентябре - октябре. На осеннем пролёте мною были добыты 2 экз. 5 сентября 1955 г. в 9 км к северо-востоку от с. Аргудан, в зарослях камыша, и 1 экз. 20 октября 1960 г. около с. Верхний Аргудан, на высоте 600 м н.у.м.

Вполне возможно, что в небольшом количестве камышницы зимуют в Кабардино-Балкарии. На это в своё время указал К.Н. Россиков (1884); в какой-то степени это подтверждается моей находкой 2 экз. этой птицы 26 декабря 1958 г. и 5 января 1960 г. в районе с. Александровское, на высоте 300 м н.у.м. Добытые мною птицы держались поодиночке на участках болот около незамерзающих родниковых источников.

15. Пастушок *Rallus aquaticus aquaticus* L.

В орнитологической литературе мы находим различные данные о характере пребывания этого вида на Кавказе. В работах С. Гмелина

(Gmelin, 1774), Э. Менетрие (1832), К.А. Крыницкого (Kaleniczenko, 1839), М.Н. Богданова (1879) указано, что пастушок – обычная птица в поймах Кубани, Кумы, Терека и Куры. Эти натуралисты наблюдали пастушка на Кавказе в летнее время, но у них нет конкретных данных о характере его пребывания на Кавказе. Возражая им, Н.Я. Динник (1886) отмечает, что пастушок попадается на Кавказе сравнительно редко и только на осеннем и весеннем пролётах.

По данным К.Н. Россикова (1884), этот вид встречается зимой в Кабардино-Балкарии, в восточной части долины р. Малки. Р.Л. Бёме (1958) указывает на пастушка, как на зимующую птицу в предгорьях Центрального Кавказа.

По моим данным пастушок – довольно широко распространённая в Кабардино-Балкарии птица, которая встречается в республике в течение всего года. Однако за неимением достаточного материала трудно сказать, остаются ли все гнездящиеся особи на зиму на территории Кабардино-Балкарии, или часть их покидает её пределы.

В гнездовое время пастушок заселяет поймы р. Терек, Малка, Баксан, Черек, а также болотистые места, заросшие камышом или тростником. Чаще всего я наблюдал его в равнинной зоне. В горах я встречал пастушка только в районе Верхних Голубых озер. Хотя эти озера довольно изолированы от основного места обитания пастушка и представляют собой небольшую котловину, окруженную высокоствольным лесом, тем не менее, пастушок не представляет там большой редкости как летом, так и зимой.

Полные свежие кладки яиц я находил с 1-й декады мая до 3-й декады июня. Самую раннюю кладку в количестве 8 яиц я обнаружил 4 мая 1957 г. В районе с. Александровское из 10 гнезд, встреченных мною с 1952 по 1960 гг., самая поздняя находка свежих яиц относится к 19 июня 1957 г.

Судя по нахождению пуховичков 20 мая 1958 г. в районе с. Приближное, можно предполагать, что отдельные особи заканчивают кладку в 3-й декаде апреля. Нахождение свежих яиц в июне, а также появление птенцов в июле (10 июля 1960 г.) свидетельствует о том, что, как и в других местах гнездования (Спангенберг, 1952), пастушок в условиях Кабардино-Балкарии, возможно, выводит птенцов 2 раза в год.

Линька у пастушка начинается в 1-й декаде июня и заканчивается, в основном, в 3-й декаде августа. При этом смена маховых и рулевых перьев происходит в июле, хотя нормальной длины они достигают в августе. Смена мелкого оперения занимает значительно больший срок, а именно, с 1-й декады июня по август включительно. Следы линьки бывают хорошо выражены у птиц, добытых как в сентябре, так и в октябре.

16. Коростель *Crex crex* L

Коростель принадлежит к числу довольно обычных птиц Кабардино-Балкарии. В гнездовой период он заселяет в соответствующих биотопах все зоны от равнинной до альпийской, но численность его значительно выше в предгорной, чем в горной и равнинной зонах.

Коростели прилетают в Кабардино-Балкарию, начиная с 2-й декады апреля. В 1954 г. я наблюдал первых птиц 14 апреля, в 1955 г. – 13 апреля, в 1956 г. – 21 апреля, в 1957 г. – 18 апреля, в 1958 г. – 22 апреля. Сразу после прилета коростели заселяют болотистые места, заросли кустарников, опушки лесов и небольшие лесные поляны, где остаются прошлогодние растения (камыш, осока, тростник и др.). В этих зарослях птицы находят себе корм и укрытие. По мере подрастания молодых трав постепенно расселяются и коростели. Летом их можно встретить на полях, засеянных злаками, на сенокосных участках, а также во всевозможных зарослях травянистой растительности. Держатся они также вблизи лесов или кустарников предгорной зоны, где и летом бывает достаточно влажных мест с богатой растительностью.

В период гнездовании в горной зоне я наблюдал коростелей по речным долинам до высоты 1300-1500 м н.у.м., а по склонам долин они могут быть встречены и выше, хотя в значительно меньшем количестве, чем в предгорной зоне.

Самая ранняя кладка (6 свежих яиц) в предгорной зоне мною обнаружена 20 мая 1958 г., а наиболее поздняя (7 слабо насиженных яиц) – 26 июня 1956 г. В горной зоне полная кладка (7 яиц) была найдена мною 25 мая 1959 г. в районе с. Верхний Баксан. Всего за период работы (1951-1960 гг.) мне удалось найти 10 гнезд с полными кладками яиц, из них только в одном гнезде, обнаруженном 22 мая 1959 г. около с. Аргудан, было 8 яиц. В остальных гнездах находилось по шесть (6 гнезд) - семь (3 гнезда) яиц.

Судя по данным Н.Я. Динника (1886), который находил пуховичков в августе около г. Алагир (Северная Осетия) и г. Ставрополя, указанные мною сроки нахождения яиц не являются предельно поздними, и весьма возможно, что коростели на Северном Кавказе откладывают яйца и в июле.

Осенний пролет этих птиц начинается с конца августа и заканчивается в октябре. В 1960 г. я наблюдал отлет коростелей вплоть до 15 октября, хотя основная масса птиц улетает из Кабардино-Балкарии с 10 по 25 сентября.

17. Малый погоныш *Porzana parva* Scop.

Один самец, добытый К.Н. Россиковым 24 марта 1884 г. в окрестностях г. Прохладного, хранится в музее Зоологического института

АН СССР. О добыче 1 экз. 20 августа 1906 г. в Северной Осетии указано в работе Л.Б. Беме (1926).

18. Погоныш *Porzana porzana* L.

По данным М.Н. Богданова (1879), погоныш – весьма обыкновенная птица в бассейнах Терека, Кумы и Кубани. Н.Я. Динник (1886) считает этот вид одним из самых распространенных на Кавказе. По его данным, большинство погонышей встречается на весеннем пролете – с середины марта по апрель – и только небольшая часть птиц остается на лето. Л.Б. Беме (1926) указывает на гнездование погоныша в небольшом количестве в предгорьях Северного Кавказа.

Вполне возможно, что погоныш встречается в гнездовое время и в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, в пойме р. Терек, Малка, Черек и Баксан, но мне приходилось наблюдать его только на осеннем пролете (25 сентября 1958 г. и 2 октября 1960 г.). Брачного крика самцов этого вида мне вообще не приходилось слышать на территории Кабардино-Балкарии.

19. Серый журавль *Grus grus grus* L.

М.Н. Богданов (1879) предполагал возможность гнездования серого журавля на Северном Кавказе. Н.Я. Динник (1886) считал, что этот вид принадлежит к числу обыкновенных птиц на Северном Кавказе, и указывал, что журавли прилетают в середине марта или начале апреля и держатся в течение всего лета. По данным этого же автора, пара серых журавлей несколько лет гнездилась на Кравцовом озере недалеко от г. Ставрополя. Гнездо этой птицы было найдено им также в камышах недалеко от Сингилеевского озера. Кроме того, о гнездовании серого журавля в Азербайджане указано в работе Э. Менетрие (1832), в Грузии – в работах Г.И. Радде (1885) и И.Д. Чхиквишвили (1933), в Армении – в работе А.К. Сатунина (1907) и П.В. Нестерова (1911).

В Кабардино-Балкарии эти птицы являются пролетными и встречаются регулярно в большом количестве во время осенних и весенних миграций, причем численность их осенью бывает значительно выше, чем весной. Пролетных журавлей мне приходилось наблюдать, начиная с сентября вплоть до последних чисел ноября. Первые пролетные стаи я отмечал: в 1951 г. – 17 сентября, в 1952 г. – 15 сентября, в 1953 г. – 20 сентября, в 1954 г. – 25 сентября, в 1955 г. – 14 сентября, в 1956 г. – 28 сентября, в 1957 г. – 27 сентября, в 1958 г. – 18 сентября. Основная масса птиц пролетает над территорией Кабардино-Балкарии в октябре. Численность пролетных стай в это время доходит до 120-150 особей.

Во время пролета некоторые стаи иногда задерживаются на несколько дней в предгорьях. Так, 15 октября 1957 г. в районе с. Старый

Урух 8 журавлей держались в течение 5 дней. Иногда они очень близко подходили к птицеферме и даже кормились вместе с курами на выгоне.

В период массового пролета количество стай в отдельные дни достигает максимума. Так, 31 октября 1956 г. над с. Аргудан пролетело 11 групп, в каждой из которых было не менее 100 журавлей. Все стаи пролетали между 12 и 17 час. дня. Такого количество птиц в течение одного дня мне никогда не приходилось больше наблюдать. Бывают случаи, когда журавли, отставшие от стаи, держатся на территории Кабардино-Балкарии и в декабре. Так, 7 декабря 1954 г. мною были встречены 7 журавлей в районе с. Шалушка (около г. Нальчика) на высоте 500 м н.у.м. В этом же районе 8 декабря я нашел журавля с подбитым крылом. По всей вероятности, во время сильного тумана он налетел на высоковольтную линию и подбил крыло.

Весенний пролет серых журавлей начинается в Кабардино-Балкарии с 2-й половины марта и заканчивается уже в 1-й половине апреля. Самый ранний весенний пролет за период 1951-1960 гг. наблюдался мною 20 марта 1956 г., а наиболее поздний – 12 апреля 1958 г.

20. Стерх, или белый журавль *Grus leucogeranus* Pall.

Л.Б. Беме (1926) указывает, что встретил 3 журавлей в конце ноября 1913 г. в Северной Осетии в районе г. Владикавказа.

21. Журавль-красавка *Anthropoides virgo* L.

По данным М.Н. Богданова (1879), журавль-красавка – весьма обыкновенная птица в степях около Терека, Кубани и в Ставропольском крае. Н.Я. Динник (1886) также относит красавку к числу обыкновенных птиц Северного Кавказа. Он пишет, что хотя непосредственно не находил гнезд этого вида, "но неоднократно видел пойманных молодых журавлей, продаваемых на базаре или содержимых на дворе вместе с домашней птицей". Н.Я. Динник не сомневался также в гнездовании этого журавля на Северном Кавказе. Л.Б. Беме (1926) считает красавку пролетной птицей в Северной Осетии и Ингушетии. Вполне возможно, что в Кабардино-Балкарии этот вид встречается и на пролете, но мне не приходилось наблюдать его.

22. Стрепет *Otis tetrax orientalis* Hartert

По данным К.Н. Россикова (1884) и Н.Я. Динника (1886), стрепет имеет широкое распространение в равнинной зоне Северного Кавказа. К.Н. Россиков указывает, что часть стрепетов в теплые зимы (1881-1882) осталась в Кабардино-Балкарии и держалась в районе ст. Солдатская стаями по 10-15 особей. В настоящее время стрепет в Кабардино-Балкарии является очень редкой птицей, и мне удалось наблюдать ее в

гнездовое время всего 2 раза: 10 июня 1954 г. и 20 июня 1960 г. в степях недалеко от г. Прохладного. Чаще я встречал стрепета на осеннем пролете, который проходит в республике с 1-й декады октября до первых чисел ноября. На весеннем пролете я его видел в 1954 г. – 20 марта в районе с. Аргудан, в 1956 г. – 2 апреля в районе с. Старый Лескен и в 1957 г. – 23 марта около с. Аргудан.

23. Дрофа *Otis tarda tarda* L.

По наблюдениям Н.Я. Динника (1886), дрофа встречается на Кавказе круглый год. Когда обширные степные пространства покрываются снегом, дрофы покидают равнины и собираются в предгорьях Северного Кавказа. К.Н. Россиков (1886), работавший в течение нескольких лет в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, сообщает: "Табуны покидают места гнездования и отодвигаются к югу и юго-востоку. В половине, реже в конце ноября, смотря по суровости времени, местные дрофы встречаются с пролетными, некоторые стада из последних присоединяются к местным и остаются на зимовку; остальные же в начале декабря отлетают в Закавказье" (стр.27). По его же данным, зимующие стаи доходят до 200-300 особей.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии дрофа – исключительно зимующая птица. Дрофы прилетают стаями с наступлением холодов и встречаются на полях, около родниковых источников, на лесных полянах, опушках лесов и на южных склонах небольших гор, где быстрее тает или сдувается снег и где им легче добывать корм. Пасутся дрофы стаями от 5 до 20 особей. 2 февраля 1954 г. в окрестностях с. Верхний Аргудан на кукурузном поле я встретил 40 дроф вместе. Количество зимующих птиц в разные годы не одинаково. Иногда в течение зимы попадается всего несколько особей (1956 г.), а бывает, что они попадаются в большом количестве. Так, много дроф было в зимы 1949, 1950, 1953 и 1954 гг. В 1959-1960 гг. я не встретил ни одной дрофы по всей республике, хотя объездил все места, где в предыдущие годы их было много.

Время прилета птиц зависит от характера зимы. В ранние холодные зимы (1953 г.) они прилетают в начале ноября, в более теплые зимы – в декабре. Обычно дрофы отлетают в феврале, хотя отдельные особи остаются до 2-й декады марта (19 марта 1958 г.).

24. Авдотка *Burchinus oedicnemus oedicnemus* L.

Авдотка встречается в Кабардино-Балкарии регулярно на осеннем пролете, который проходит с конца августа до конца 1-й декады октября. Основная масса птиц пролетает с 10 по 25 сентября, хотя самая ранняя пролетная птица добыта мною 28 августа 1960 г. в районе Верх-

них Голубых озер Черекского ущелья, а наиболее поздний экземпляр наблюдался 10 октября 1958 г. На весеннем пролете мне приходилось наблюдать авдотку всего 2 раза: 20 марта 1957 г. и 4 апреля 1958 г. около с. Аргудан на озимой пшенице. Осенний пролет этих птиц проходит с северо-востока на юго-запад, а весенний – в обратном направлении.

25. Луговая тиркушка *Glareola pratincola pratincola* L.

Луговая тиркушка встречается в Кабардино-Балкарии в небольшом количестве во время пролета. Осенняя миграция проходит с конца августа до 1-й декады октября. В октябре луговые тиркушки попадаются редко. Осенняя миграция отмечена мною в 1957 г. – 28 августа, в 1958 г. – 15 сентября, в 1960 г. – 9 октября. На весеннем пролете мною добыто 2 экз. этой птицы – 25 марта 1956 г. и 24 марта 1957 г. около с. Аргудан.

26. Степная тиркушка *Glareola nordmanni* Nordm.

По данным К.Н. Россикова (1884), "степная тиркушка огромными стадами проводит осень до половины ноября на лугах и полях равнины и в степи Кабардино-Балкарии. В половине ноября отлетает" (стр.44). Мне приходилось наблюдать степную тиркушку исключительно на осеннем пролете, причем значительно реже, чем луговую. Пролет ее отмечен мною: в 1957 г. – 10 сентября, в 1958 г. – 15 сентября, в 1960 г. – 20 сентября. Весеннюю миграцию Л.Б. Бёме (1926) наблюдал около с. Гизель (Северная Осетия) 20 марта 1920 г.

27. Золотистая ржанка *Charadrus apricarius altifrons* Brehm.

Золотистая ржанка встречается в Кабардино-Балкарии в небольшом количестве на пролете. Я добыл ее на осеннем пролете 14 и 20 сентября 1960 г. и на весеннем – 10 апреля 1956 г.

28. Хрустан *Charadrius morinellus* L.

Как и предыдущий вид, хрустан в Кабардино-Балкарии встречается в небольшом количестве на пролёте. Осеннюю миграцию я наблюдал 10 сентября 1956 г., а весеннюю – 2 апреля 1957 г. Р.Л. Бёме (1958) указывает, что им в Северной Осетии был добыт 1 экз. хрустана 1 декабря 1955 г.

29. Галстучник *Charadrius hiaticula hiaticula* L.

Галстучник встречается в Кабардино-Балкарии на пролете. Осенняя миграция проходит со 2-й декады августа до 1-й декады октября, причем большинство птиц встречается в октябре. Пролетные особи отмечены мною: в 1951 г. – 10 и 12 августа, в 1954 г. – 15 и 30 августа,

в 1955 г. – 10, 15 и 20 сентября, в 1956 г. – 20 октября, в 1957 г. – 25 сентября, в 1960 г. – 4 сентября.

Весенняя миграция проходит в апреле, хотя отдельные особи встречаются и в мае. Так, в долине р. Баксан в районе с. Черная Речка мне удалось добыть несколько экземпляров 6 мая 1953 г. и 16 мая 1954 г. Добытые птицы держались в одиночку вместе с малыми зуйками и оказались сильно истощенными. Такой же случай я наблюдал в 1958 г.: 4 одиночных галстучника в течение мая держались вместе с перевозчиками в долине р. Черек между с. Псыгансу и Нижний Черек.

30. Малый зуек *Charadrius dubius curonicus* Gm.

Малый зуек в Кабардино-Балкарии – широко распространенная птица. В период гнездования он заселяет речные долины на высоте 200-2000 м н.у.м. Весной малый зуек прилетает в конце марта - начале апреля. Самый ранний пролет отмечен мною в 1952 г. – 28 марта, в 1953 г. – 4 апреля, в 1954 г. – 10 апреля, в 1955 г. – 27 марта, в 1956 г. – 25 марта, в 1957 г. – 2 апреля, в 1958 г. – 5 апреля. Вскоре после прилета образуются пары, и с 2-й половины апреля начинается ток.

К гнездостроению малые зуйки приступают с 3-й декады апреля, и в 1-й декаде мая в равнинной зоне уже встречаются полные свежие кладки яиц. В 1952 г. в 4 гнездах, найденных в долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м., первые яйца были отложены 4 мая. Кладка закончена 7 мая. В 1954 г. в двух гнездах, обнаруженных в долине р. Аргудан, первые яйца были отложены 9 мая. На высоте 300-900 м н.у.м. я не наблюдал существенной разницы в сроках откладки яиц. Так, в найденных мною гнездах в долине р. Черек в 1957 г. кладка началась на высоте 300 м – 8 мая, а на высоте 900 м – 9 мая. Если учесть, что в равнинной зоне некоторые особи приступили к размножению в конце 1-й декады мая (10 мая), то можно сказать, что в пределах этих высот птицы приступают к размножению почти одновременно. Разница во времени начала кладки яиц выявляется лишь при сравнении высокогорной зоны с равнинной. По моим наблюдениям (1951-1960 гг.), как правило, на высоте 1500-2000 м н.у.м. малые зуйки откладывают первые яйца на 5-10 дней позже, чем в равнинной зоне. В 1959 г. эта разница доходила до 15 дней (5 и 20 мая).

Весной уровень в горных реках сильно поднимается, и гнездовые места часто заливаются водой. В результате гибнут многие кладки, и малые зуйки выводят птенцов только из повторно отложенных яиц. Так, в 1956 г. в долине р. Псыгансу на высоте 700 м н.у.м. в двух местах малые зуйки приступили к повторной кладке 12 июня (первая кладка погибла 20 мая). Интересно отметить, что повторная кладка тоже содержала 4 яйца.

В 1958 г. начало повторной кладки в долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м. отмечено 2 июня (первая кладка погибла 18 мая). Иногда после гибели первой кладки птицы сразу же приступают к повторной. В 1959 г. в долине р. Аргудан первая кладка погибла 10 мая, и зуек 14 мая приступил к повторному отложению яиц. Так как гнездо было занесено песком, птицы построили новое в 4 м от старого. Часто вследствие разлива рек гибнут и вторые кладки, и тогда птицы остаются без потомства. Такое явление я наблюдал в 1959 г. в долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м., когда первая кладка погибла 30 мая, а вторая – 25 июня.

Вполне возможно, что после гибели второй кладки некоторые особи гнездятся в третий раз, как это было отмечено у галстучника, который в течение лета может повторить кладку до 5 раз (Гладков, 1951), но таких явлений мне не приходилось наблюдать. Я неоднократно находил довольно поздние свежие кладки малых зуйков (4 июля 1957 г., 11 июля 1958 г., 9 июля 1959 г. и 13 июля 1960 г.). Самая поздняя кладка была найдена в 1960 г., что в некоторой степени объясняется поздней весной.

Длительность гнездового периода (начиная от образования пар до полного оперения птенцов из самых поздних кладок) у большинства особей не превышает 100 дней, хотя в отдельных случаях может затягиваться до 114 дней. Непрерывное насиживание начинается лишь после откладки последнего яйца, причем самка больше сидит на гнезде, чем самец. Он присаживается только на короткое время, чаще всего тогда, когда самка кормится. Длительность насиживания, по данным, приведенным в справочнике «Птицы Советского Союза», колеблется от 24 до 26 дней, а по моим данным – от 19 до 20 дней.

Во время насиживания самка ведет себя осторожно: с приближением опасности сходит с гнезда, отбегает в сторону или незаметно улетает. Часто приходилось наблюдать, как самец, находящийся поблизости от гнезда, криком предупреждает самку о приближении опасности, и тогда она сходила с гнезда. Совершенно иначе ведет себя самка в момент вылупления птенцов. Испуганная птица отлетает от гнезда, но не улетает, а с криком кружится около гнезда. Если в это время в гнезде сидят уже обсохшие птенцы, то они прижимаются к земле и моментально замирают, а иногда незаметно покидают гнездо.

На кормежке зуйков можно встретить в совершенно нехарактерных для них биотопах. Так, с 3 по 10 июня 1960 г. ежедневно я наблюдал кормящихся зуйков около коровника, в 4 км от места гнездования. Зуйки прилетели сюда стайками до 20 особей в утреннее (5-7 час.) и вечернее (5-7 час.) время. У добытых здесь 4 экз. в желудках оказались остатки навозных жуков и дождевых червей. В районе с. Приближное 20 июля 1960 г. я подстрелил зуйка, который держал в клюве медведку.

В 4 из 10 проанализированных желудков оказались личинки ручейников.

Малые зуйки покидают пределы Кабардино-Балкарии с конца августа по октябрь включительно: основная масса птиц улетает в 2-й половине сентября (с 15 по 29 сентября 1959-1960 гг.).

31. Чибис *Vanellus vanellus* L.

Относительно гнездования чибисов на Северном Кавказе в орнитологической литературе имеется очень мало сведений. Наблюдения Э. Менетрие (1832), Р.Ф. Гогенаккера (1837), Г.И. Радде (1873), К.Ф. Кесслера (1878) относились к осени. М.Н. Богданов (1879) предполагал возможность гнездования чибиса на Кавказе. Первые сведения о гнездовой жизни чибисов на Северном Кавказе мы встречаем в работе Н.Я. Динника (1886), который наблюдал их в гнездовое время в Ставропольском крае и находил яйца этих птиц.

В работе Р.Л. Беме (1958) «Птицы Центрального Кавказа» чибис проводится как пролетная птица. В теплые зимы 1959 и 1960 гг. часть особей оставалась в пределах республики на зимовку. Зиму чибисы проводят в долинах рек (преимущественно не замерзающих) и в открытых местах равнинной зоны. В январе - феврале 1959-1960 гг. я неоднократно встречал чибисов в долине р. Черек, в районе с. Нижний Черек, а также на полях около этого села.

Чибисы прилетают в Кабардино-Балкарию в 1-й половине марта. Так, в 1952 г. первые особи наблюдались 10 марта, в 1953 г. – 14 марта, в 1954 г. – 15 марта, в 1956 г. – 4 марта, в 1957 г. – 16 марта, в 1958 г. – 8 марта. Вскоре после прилета, в конце марта, чибисы разбиваются на пары и приступают к размножению. Полные кладки яиц я находил в 1956 г. – 14 апреля, в 1957 г. – 20 апреля, в 1958 г. – 18 апреля, в 1959 г. – 10 мая, в 1960 г. – 4 мая. Однако указанные мною сроки кладки не являются предельно ранними для Северного Кавказа. Так, в 1879 г. Н.Я. Динник нашел 4 яйца 25 марта (старый стиль), а в 1884 г. обнаружил 3-4-дневных чибисят 10 апреля (старый стиль).

В Кабардино-Балкарии чибисы заселяют равнинную зону (от 200 до 400 м н.у.м.), причем обитают на сырых травянистых лугах, в болотах и на паховых полях, часто заливаемых водой. Гнездо этих птиц обычно бывает слабо выстлано стебельками травы. Во всех найденных мною 5 гнездах было по 4 яйца. Размеры яиц (20): 43-45×32-34 мм. Хотя чибис – довольно широко распространенная птица в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, но в общем численность его небольшая. Маленькие гнездовые колонии я находил в районах с. Александровское, Приближное, Урожайное и в 6 км к северу от с. Аргудан. Чаще всего я наблюдал их в период гнездования в районе с. Нижний Черек.

В конце августа в Кабардино-Балкарии начинается пролет чиби-

са, который заканчивается в основном в октябре, если не считать некоторых особей, остающихся на зиму.

32. Кречетка *Chettusia gregaria* Pall.

Пролет кречеток на Северном Кавказе впервые отмечен М.Н. Богдановым (1879), который встречал их в августе в степи между Георгиевским и Ставрополем. Н.Я. Динник (1886) неоднократно наблюдал кречеток в районе Ставрополя весной и осенью вместе с чибисами. Л.Б. Беме (1926) также указывают на кречетку как пролетную птицу в Северной Осетии. Вполне возможно, что и в Кабардино-Балкарии она появляется на пролёте, но мне не приходилось её наблюдать ни разу.

33. Камнешарка *Arenaria interpres* L.

Р.Л. Бёме (1958) указывает, что Н. Волчанов наблюдал камнешарку 9 июня 1924 г. около Пятигорска. Я наблюдал её в Кабардино-Балкарии всего 2 раза – 22 и 23 сентября 1960 г. на высоте 400 м н.у.м. в долине р. Черек, у самой воды.

34. Чернозобик *Calidris alpina alpina* L.

По данным Л.Б. Бёме (1926), чернозобик встречается в Северной Осетии на весеннем и осеннем пролетах. В Кабардино-Балкарии я добыл 20 сентября 1960 г. одного старого самца около с. Аргудан, около небольшого пруда. Здесь же я наблюдал этих птиц 21-22 сентября того же года.

35. Кулик-воробей *Calidris minuta* Leisl.

Кулик-воробей – обычная птица на пролете в Кабардино-Балкарии. Осенний пролет проходит с 2-й половины августа до конца сентября. А.А. Насимович (1955) наблюдал этих птиц 28 августа в горах в районе с. Жемтала*. Я наблюдал пролет куликов 15 августа в долине р. Хулам в 5 км выше с. Безенги, а 20-27 сентября 1960 г. в районе с. Аргудан около небольшого пруда добыл 5 экз. этих птиц. Отдельных запоздалых особей я встречал и в 1-й декаде октября (5-10 октября 1960 г.).

36. Белохвостый песочник *Calidris temminckii* Leisl.

Первые сведения о пролете белохвостого песочника на Кавказе в районах Терека, Кубани и берега Каспия мы находили в работе М.Н. Богданова (1879). На Северном Кавказе этот вид встречается в небольшом количестве на пролете. Л.Б. Бёме (1926) добыл 1 экз. этой птицы 6 августа 1915 г. в Северной Осетии, около г. Владикавказа. В Кабардино-

---

* В работе А.А. Насимовича (1955) указан не *C. minuta*, а *C. temminckii* (прим. ред.).

Балкарии белохвостого песочника я наблюдал всего один раз – 8 сентября 1960 г. в долине р. Черек на высоте 500 м н.у.м. К сожалению, добыть этого кулика мне не удалось.

37. Турухтан *Philomachus pugnax* L.

О пролете турухтана на Кавказе имеются данные в работах Э. Менетрие (1832), М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1855), Н.Я. Динника (1886), И.Д. Чхиквишвили (1933), Р.Л. Беме (1958), И.Б. Волчанецкого (1959). В Кабардино-Балкарии турухтан встречается в небольшом количестве на пролете. В музее Кабардино-Балкарского университета имеется 1 экз., добытый 28 сентября 1958 г. В 1960 г. я наблюдал стайку турухтанов из 5 особей 15 сентября недалеко от с. Аргудан на озимой пшенице.

38. Щеголь *Tringa erythropus* Pall.

Впервые на Кавказе щеголя наблюдал Г.И. Радде (1885) в середине августа. М.Н. Богданов (1879) сообщает про эту птицу: "Я встречал его в августе на Кубани, на Лабе и Куме, а в сентябре на Тереке и в дельте его" (стр.157). В Кабардино-Балкарии этот вид встречается в небольшом количестве на пролете в сентябре (15 сентября 1960 г.).

39. Травник *Tringa totanus* L.

М.Н. Богданов (1879) указывает, что "Красноножка весьма обыкновенна в Кавказском крае. По болотам в бассейне Терека и Кубани, а также по степным болотам Ставропольской губ. этот кулик гнездится" (стр.157). Н.Я. Динник (1886) также предполагал возможность гнездования травника на Северном Кавказе, где он наблюдал его весной и летом. В Кабардино-Балкарии травник встречается в небольшом количестве на пролете. Мною добыт 28 марта 1958 г. в районе с. Александровское и 20 сентября 1960 г. около с. Аргудан.

40. Поручейник *Tringa stagnatilis* Bechst.

Согласно М.Н. Богданову (1879), поручейник на Северном Кавказе – весьма обыкновенная птица и гнездится в бассейнах Терека и Кубани, а также в Ставропольском крае. Н.Я. Динник (1886) сообщает про эту птицу: "Я встречал несколько раз весной и летом в Ставропольской губернии и Кубанской области" (стр.285). В Кабардино-Балкарии я наблюдал поручейника в 1952 г. – 5 мая в долине р. Баксан недалеко от с. Ново-Ивановка, в 1953 г. – 9 мая в том же районе и 10 мая – в долине р. Урух. Гнезда этого кулика я находил в 1952 г. – 14 мая, в 1953 г. – 16 мая, в 1954 г. – 25 мая и в 1955 г. – 28 мая. С 1956 по 1960 г., несмотря на тщательные поиски, я не мог найти гнезда поручейника, хотя и до-

был 4 особи в мае и июле. По всей вероятности эти кулики гнездятся в Кабардино-Балкарии нерегулярно.

41. Большой улит *Tringa nebularia* Gunn.

В Кабардино-Балкарии большой улит встречается в небольшом количестве на пролете. В 1959 г. я наблюдал этого кулика 28 августа в долине р. Черек на высоте 600 м н.у.м., в 1960 г. – 27 августа у Верхних Голубых озер, 4 и 10 сентября – около с. Аргудан у небольшого пруда.

42. Черныш *Tringa ochropus* L.

Первые сведения о нахождении черныша на Кавказе мы находим в работе Э. Менетрие (1832). М.Н. Богданов (1879) сообщает, что этот кулик "водится по всем маленьким и большим рекам Кавказа, как на плоскости, так и в горах, где он доходит до полосы горных лугов" (стр.158). Н.Я. Динник (1886) предполагал возможность гнездования черныша на Северном Кавказе. По данным Р.Л. Бёме (1958), черныш – гнездящаяся, перелетная птица, которая встречается от предгорий до границы лесной растительности Центрального Кавказа

В Кабардино-Балкарии черныш – довольно обычная птица. Она заселяет в период гнездования речные долины равнинной и предгорной зоны республики. Наиболее часто этот вид можно наблюдать в равнинной зоне по долинам рек Терек, Малка, Баксан, Черек и Чегем. В гнездовое время черныш иногда попадается по долинам рек высоко в горах. Я наблюдал его 10 июня 1960 г. в долине р. Баксан на высоте 1800 м н.у.м., но ни разу не находил гнезд этого кулика выше 600 м н.у.м.

Весенний прилет черныша я отмечал в 1952 г. – 23 марта, в 1953 г. – 28 марта, в 1954 г. – 2 апреля, в 1955 г. – 24 марта, в 1956 г. – 4 апреля, в 1957 г. – 19 марта и в 1958 г. – 21 марта. По литературным данным, гнезда черныша помещаются преимущественно на деревьях, чаще поблизости от болота (Гладков, 1951). Найденные мною в равнинной зоне Кабардино-Балкарии 4 гнезда были расположены на земле*.

Первое гнездо с 1 яйцом (начало кладки) я нашел 19 мая 1955 г. в долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м. Оно помещалось на земле между камнями и представляло собой небольшое углубление без подстилки. Второе гнездо с 4 свежими яйцами я обнаружил 29 мая 1956 г. в долине р. Терек в районе с. Александровское. Гнездо находилось также на земле между глыбами песчаника, лоток был выложен очень слабо, букваль-

---

* Черныш на Кавказе сейчас однозначно не гнездится. На обратных миграциях он появляется здесь в начале - середине июня, создавая иногда впечатление недавно вылетевших выводков. Все описанные Х.Т. Моламусовым гнезда принадлежали, скорее всего, перевозчику – обычному обитателю горных и предгорных рек Кавказа (прим. ред.).

но десятками стебельков прошлогодних трав. Третье гнездо было найдено 5 мая 1957 г. в долине р. Черек около с. Нижний Черек. Гнездо было построено на земле, в небольшом углублении среди камней. В кладке было 4 слабо насиженных яйца. Четвертое гнездо с тремя свежими яйцами я обнаружил 14 мая 1960 г. в долине р. Терек около ст. Котляревская. Оно помещалось в небольшом углублении среди камней. Лоток был слабо выстлан. Судя по форме и размеру гнезда, а также составу гнездового материала, оно принадлежало перевозчику, но было занято чернышом.

Начиная с 1-й декады августа, черныши образуют большие стаи (до 50-100 особей) и кочуют в поисках пищи с места на место. Мне часто приходилось наблюдать стаи до 100 особей на рисовых полях Малой Кабарды в 1959-1960 гг. Обычно вместе с чернышами попадались и фифи, которые в некоторых случаях составляли половину стаи (12 августа 1959 г.). Судя по общей численности черныша, в осеннее время большое число особей этого вида залетает в республику из других районов Северного Кавказа. Осенний пролет черныша в Кабардино-Балкарии начинается с конца августа и продолжается до конца сентября. Установить окончание осеннего пролета бывает трудно, потому что в теплые зимы часть особей остается зимовать в республике. Я неоднократно наблюдал и добывал чернышей в январе - феврале 1959-1961 гг. в районах с. Нижний Черек, Александровское и Озрек. Зимой они держатся чаще всего одиночками вблизи незамерзающих рек или болот.

43. Фифи *Tringa glareola* L.

Хотя фифи в гнездовое время не является редкой птицей в Кабардино-Балкарии, тем не менее мне ни разу не удалось найти гнездо этого кулика. В основном фифи встречается летом на высоте 200-400 м н.у.м., т.е. в северо-восточной половине равнинной зоны республики.

Весенний пролет фифи в Кабардино-Балкарии я отмечал в 1953 г. – 28 марта, в 1954 г. – 4 апреля, в 1955 г. – 5 апреля в 1956 г. – 27 марта, в 1958 г. – 3 апреля. Осенью, начиная с 2-й декады августа, этот вид встречается стаями вместе с чернышами. Осенний пролет фифи проходит с 3-й декады августа по сентябрь включительно. В горных ущельях я наблюдал их в 1958 г. – 25 августа, в 1959 г. – 19 августа и в 1960 г. – 26 августа. Основная масса птиц покидает республику с 10 по 25 сентября, хотя отдельные особи встречаются и зимой. В музее Кабардино-Балкарского университета имеется 1 экз., добытый 11 декабря 1958 г. Два экземпляра фифи добыто мною 2 января 1960 г. в долине р. Урух около с. Александровское. В этом районе 4 января 1960 г. я видел 4 особи.

44. Перевозчик *Tringa hypoleucos* L.

Перевозчик – широко распространенная птица в Кабардино-Балкарии. В гнездовое время его можно наблюдать по речным долинам от равнинной зоны почти до самых перевалов. Прилет первых перевозчиков в республику я отмечал в 1953 г. – 2 апреля, в 1954 г. – 25 марта, в 1955 г. – 28 марта, в 1956 г. – 4 апреля, в 1957 г. – 3 апреля, в 1958 г. – 27 марта.

Вскоре после прилета, в конце 1-й декады апреля, наблюдаются первые признаки токования, выражающееся в основном в драках между самцами. Постепенно стайки разбиваются на пары, самцы прекращают драки и в 3-й декаде апреля уже усиленно токуют около своих самок. В равнинной и предгорной зонах перевозчики приступают к устройству гнезд в конце апреля - начале мая. Гнезда, как правило, находятся поблизости от воды, чаще всего под небольшим кустиком.

На высоте 200-900 м н.у.м. полные свежие кладки я находил в 1-й декаде мая. В 1954 г. – 5 мая, в 1955 г. – 8-9 мая, в 1956 г. – 10 мая, в 1957 г. – 9 мая, в 1958 г. – 5, 7, 10 мая, в 1960 г. – 8-9 мая.

В горах, на высоте 1500-2000 м, начало кладки отмечено мною во 2-й декаде мая. В 1959 г. в районе с. Эльбрус, на высоте 1800 м, первое яйцо было отложено 19 мая, а в 1960 г. – 18 мая. В этом районе в 1959-1960 гг. я нашел 10 гнезд с полными кладками. Наиболее поздняя свежая кладка была найдена 20 июня 1959 г. 23-29 июня 1960 г. я отстрелял двух самок, у которых в яйцеводах оказались готовые к сносу яйца. Подобная растянутость сроков размножения, очевидно, объясняется тем, что по каким-либо причинам первая кладка погибла, и птицы повторно откладывали яйца. Чаще всего кладки гибли при разливах горных рек. Токующих самцов можно встретить вплоть до конца июня (16, 18, 21, 28 июня 1960 г.).

Гнездо перевозчика представляет собой конусовидную ямку глубиной 32-48 мм, наружный диаметр лотка 85-112 мм, внутренний – 48-56 мм (21 гнездо). Во всех найденных кладках было по 4 яйца (30 гнезд). Размеры яиц (120) 34-39×25-26 мм. В зависимости от места, где построено гнездо, лоток бывает выложен различными материалом: под травянистым кустиком – сухими стеблями и листьями травы, под облепихой – ее сухими листьями, под сосной – сосновыми иглами* (фото 17).

Насиживание начинается после полной кладки, о чем свидетельствует бросившееся нам в глаза одновременное вылупление птенцов, которое продолжается от 50 до 70 мин. (в 4 случаях). Вылупившиеся

---

* Высота молодых сосен и облепихи, под которыми я находил гнезда, не превышала 40 см.

птенцы покидают гнездо на второй день. Так, 12 июня 1960 г. в 12 час. дня в одном гнезде вылупились 4 птенца, а в 10 час. утра 13 июня они покинули гнездо. В другом случае птенцы покинули гнездо ровно через 20 час. после вылупления*.

Птенцы ведут себя очень осторожно, и при малейшем признаке опасности, о которой они узнают прежде всего по крику родителей, они быстро разбегаются и прячутся в густой траве, под кустарниками, в небольших углублениях между камнями. Как только опасность миновала, самка созывает птенцов, издавая продолжительные крики – фи-и-и, фи-и-и, фи-и-и...

Вместе с птенцами я часто встречал и самцов. Они принимают участие, наряду с самками, в вождении птенцов, но мне не приходилось наблюдать, чтобы самцы насиживали яйца. Ни у одного из добытых в гнездовое время 10 самцов я не обнаружил наседного пятна. По всей вероятности, если самцы принимают участие в насиживании, то в незначительной степени. Самка отводит врага как от птенцов, так и от насиженных яиц. При этом она притворяется подбитой и бегает с полураскрытыми крыльями, качаясь с боку на бок и издавая особый крик, совсем непохожий на обычный свист перевозчика.

Птенцы быстро растут и на 20-й день уже способны летать. С этого времени и начинается их самостоятельная жизнь: сами спасаются от врагов, сами находят себе корм. Однако родители до конца лета (до отлета) остаются в какой-то степени связанными с выводком. Особенно это хорошо заметно в полдень, когда птицы отдыхают поблизости от воды, чистятся и купаются.

С 1-й декады августа к стайкам перевозчиков присоединяются зуйки, черныши, фифи, и все они кочуют по берегам рек. Нередко также можно наблюдать их на прибрежных огородах и рисовых полях. Отлет продолжается с 3-й декады августа по сентябрь включительно. Отдельные запоздалые особи встречаются и в октябре (12 октября 1958 г.. 8 октября 1959 г.. 14 октября 1960 г.).

Вес добытых птиц: самца – 44,4 г (10 июня 1958 г.), самок – 47,5 г (4 июня 1960 г.), 51,7 г (27 июня 1960 г.) и 53,9 г (4 июля 1960 г.). Вес молодой птицы – 63,1 г (4 июля 1960 г.).

45. Круглоносый плавунчик *Phalaropus lobatus* L.

По данным Г.И. Радде (1885), Л.Б. Беме (1926) и Р.Л. Беме (1958), круглоносый плавунчик встречается на Кавказе на осеннем пролете (ав-

---

* В период вылупления птенцов за гнездом было установлено круглосуточное наблюдение.

густ - ноябрь). В Кабардино-Балкарии я наблюдал его всего один раз 27 августа 1960 г. у Голубого озера.

46. Ходулочник *Himantopus himantopus* L.

В Северной Осетии Л.Б. Беме (1926) добыл 1 экз. в середине сентября 1925 г. И.Б. Волчанецкий (1959) относит этого кулика к гнездящимся птицам Восточного Предкавказья (Ставропольский край и Грозненская область). Вполне возможно, что в Кабардино-Балкарии этот вид встречается на осеннем пролете, но мне не приходилось наблюдать его в пределах республики.

47. Шилоклювка *Recurvirostra avosetta* L.

Н.Я. Динник (1886) наблюдал шилоклювку в Ставропольском крае в гнездовое время. Л.Б. Беме (1926) добыл 2 экз. этой птицы на осеннем пролете в 1911 и 1912 гг. на Северном Кавказе около г. Владикавказа. И.Б. Волчанецкий (1959) считает шилоклювку гнездящейся птицей в дельте Терека и на озерах Восточного Предкавказья. Возможно, что в Кабардино-Балкарии она встречается на пролете, но мне не приходилось ее наблюдать.

48. Большой веретенник *Limosa limosa* L.

Данные о нахождении большого веретенника на Кавказе мы находим в работах Р.Ф. Гогенаккера (1837) – в районе Ленкорани, М.Н. Богданова (1879) – в Ставропольском крае, Г.И. Радде (1885) – в Закавказье, Н.Я. Динника (1886) – в Ставропольском крае, Р.Л. Беме (1958) – в Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии этот вид встречается в небольшом количестве на пролете. Добыт всего один раз 10 сентября 1960 г. в долине р. Терек в районе с. Александровское.

49. Большой кроншнеп *Numenius arquata* L.

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что "большой кроншнеп гнездиться в степях Ставропольской губ. Осенью около Кубани и Терека попадается в большом числе" (стр.155). По данным Р.Л. Беме (1958), он встречается в предгорьях Центрального Кавказа на осеннем пролете (29 сентября 1926 г., 23 августа 1947 г.). В Кабардино-Балкарии большой кроншнеп наблюдается в небольшом количестве на пролете. Добыт 29 августа 1959 г. и 19 сентября 1960 г. в районе с. Александровское в долине р. Терек.

50. Малый кроншнеп *Numenius tenuirostris* Vieill.

Согласно М.Н. Богданову (1879), этот кулик весьма обыкновенен и гнездится в степях Ставропольского края. По данным Н.Я. Динника

(1886), кроншнепы прилетают в Ставропольский край с 2-й половины марта (26 марта 1878 г., 24 марта 1879 г. и 4 апреля 1881 г.). По его же наблюдениям, осенний прилет этих птиц начинается в конце 1-й декады августа. Л.Б. Беме (1926) наблюдал малого кроншнепа один раз в Северной Осетии. В Кабардино-Балкарии эту птицу мне никогда не приходилось встречать.

51. Средний кроншнеп *Numenius phaeopus* L.

По данным А.К. Сатунина (1911), средний кроншнеп встречается на пролете по всему Кавказу. Л.Б. Беме (1926) наблюдал его на осеннем пролете в Северной Осетии. Мне не приходилось встречать среднего кроншнепа на территории Кабардино-Балкарии.

52. Вальдшнеп *Scolapax rusticola* L.

Первые сведения о нахождения вальдшнепа на Кавказе мы находим в работах Э. Менетрие (1832), Р.Ф. Гогенаккера (1837), А. Нордмана (1840), А. Виноградова (1870), К.Ф. Кесслера (1878), М.Н. Богданова (1879). Характер пребывания этой птицы на Северном Кавказе впервые выяснен Н.Я. Динником (1886), который писал: "огромное большинство вальдшнепов, населяющих Кавказ, суть временные наши гости, но небольшая часть их остается здесь на лето и размножается" (стр.275). Хотя Н.Я. Динник неоднократно наблюдал вальдшнепов в гнездовое время в Ставропольском крае, но, согласно его данным, ни разу не находил гнезд этой птицы.

О гнездовании вальдшнепов в различных районах Кавказа указано в работах К.А. Сатунина (1907) – в Грузии, Ф.В. Вильконского (1879) – в Западном Закавказье, Л.Б. Беме (1926) – в Северной Осетии, Ю.В. Аверина и А.А. Насимовича (1938) – в пределах Кавказского государственного заповедника, Р.Л. Беме (1958) – в Северной Осетии. Но и в этих работах мы находим очень мало сведений о размножении вальдшнепа на Центральном Кавказе. Л.Б. Беме (1958) приводит сообщение Н.В. Селегененко о том, что в мае - начале июня он наблюдал тягу вальдшнепа около курорта Дарьяли в долине р. Армхи. Других данных о размножении вальдшнепа в центральной части Северного Кавказа в литературе нет.

В Кабардино-Балкарии вальдшнеп, по моим наблюдениям, является гнездящейся перелетной и частично зимующей птицей. Весенний пролет его начинается сравнительно рано. Появление первых вальдшнепов мною отмечено в 1956 г. – 5 марта, в 1952 г. – 10 марта, в 1953 г. – 14 марта, в 1954 г. – 15 марта, в 1955 г. – 25 марта, в 1958 г. – 9 марта, в 1957 г. – 1 апреля, в 1958 г. – 20 марта и в 1959 г. – 24 марта. Вскоре после прилета начинается тяга. Первые токующие самцы отмечены:

в 1956 г. – 20 марта, в 1958 г. – 25 марта, в 1959 г. – 19 марта. Судя по тому, что численность вальдшнепов на тяге в конце марта - начале апреля значительно выше, чем в мае, можно с уверенностью сказать, что большая часть "тянущих" вальдшнепов принадлежит к пролетным, на что указал в свое время Н.Я. Динник (1886).

В гнездовое время вальдшнепов можно наблюдать в лесах как равнинной, так и горной зоны, но всегда в небольшом количестве. Найденные мною гнезда располагались в небольших естественных углублениях под кустиками лесной поросли. Основными материалами для устройства гнезда служили сухие стебли и опавшие прошлогодние листья деревьев. В целом гнездо имеет вид очень неглубокой ямы. Начало кладки я отмечал: в 1958 г. – 2 мая, в 1959 г. – 3 мая, в 1960 г. – 23 апреля. Всего на территории Кабардино-Балкарии я нашел 6 гнезд: одно – в равнинной зоне (10 мая 1957 г.), 3 – в предгорной зоне (2 мая 1958 г. и 3 мая 1959 г. и 23 апреля 1960 г.) и 2 гнезда с пуховичками – в горной зоне (17 мая 1959 г. и 18 мая 1960 г.).

В равнинной и предгорной зонах птенцы покидают гнездо сразу, как только обсохнут. В горной зоне, на высоте 1800 м я наблюдал иную картину. Здесь птенцы оставались в гнезде 2-3 дня. Так, 17 мая 1959 г. в 6 часов вечера вылупились 4 птенца. 18 мая они сидели в гнезде, 19-го – в 10 часов утра, когда солнце пригрело, – птенцы покинули гнездо и до 5 час. вечера держались вместе с матерью поблизости от него, а затем снова вернулись в гнездо. 18 мая ночью выпал снег; 19-го птенцы сидели в гнезде и самка грела их. 20 мая птенцы покинули гнездо в 8 час. утра, и я их больше не видел. В том же районе 18 мая 1960 г. было найдено гнездо с 4 птенцами 2-3-дневного возраста, которые сидели в гнезде (фото 18). Самка грела их.

Такое поведение птенцов в горной зоне можно объяснить тем, что в горах в 3-й декаде мая часто бывают по ночам заморозки, выпадает слабый снег (17-20 мая 1959-1960 гг.) и температура воздуха понижается до –2° (18 мая 1960 г.). Естественно, что при такой низкой температуре пуховички менее активны и самке легче их обогреть в гнезде. Низкая температура отражается и на росте птенцов. Так, 4 птенца, взвешенные сразу после вылупления 17 мая 1959 г., весили 17-17,5 г., на третий день, 20 мая, в 7 час. утра – 18-19,1 г. Птенцы были очень слабые. Взятые мною 2 птенца прожили всего 5 час.

Осенний пролет вальдшнепов в Кабардино-Балкарии начинается с 2-й декады сентября и продолжается до первых чисел ноября. Основная масса пролетает с 20 сентября по 25 октября. Зимой я видел вальдшнепов всего 3 раза – 4 января 1959 г., 10 и 15 января 1960 г. в равнинной зоне, в районе с. Александровское (в лесу у незамерзающих ручьев).

53. Бекас *Capella gallinago gallinago* L.

Бекас в Кабардино-Балкарии – обычная птица, но встречается только на пролете. Весенний пролет начинается с 2-й половины марта и продолжается до последних чисел апреля. В 1960 г. я наблюдал бекаса и в мае (19-15 мая), что объясняется поздней весной этого года. Осенний пролет бекасов проходит с 1-й декады августа по октябрь включительно. Появление первых пролетных птиц в равнинной и предгорной зонах я отмечал в 1958 г. – 8 августа, в 1959 г. – 10 августа, в 1960 г. – 9 августа. Основная масса пролетает с 15 сентября по 20 октября. Отдельные особи зимуют в равнинной зоне, поблизости от незамерзающих рек. На зимовке мною добыты 2 экз. в районе с. Александровское 10 января 1959 г. и 16 января 1960 г.

54. Азиатский бекас *Capella stenura* Bp.

В работе Р.Л. Беме (1958) есть указание на добычу азиатского бекаса в Северной Осетии 4 сентября 1934 г. в районе г. Владикавказа.

55. Дупель *Capella media* Lath.

Дупель – обычная птица на пролете в равнинной и предгорных зонах республики. Весенний пролет начинается с 2-й половины марта и продолжается до конца 1-й декады мая. Отдельные особи попадаются по сырым лугам и в течение всего мая. Весенний пролет мною отмечен: в 1951 г. – 25 марта, в 1952 г. – 20 марта, в 1953 г. – 27 марта, в 1954 г. – 24 марта, в 1955 г. 4 апреля, в 1956 г. – 10 апреля, в 1957 г. – 8 апреля, в 1958 г. – 16 марта и в 1959 г. – 17 марта. Запоздалых особей на весеннем пролете я наблюдал 10 мая 1958 г., 15 мая 1959 г., 20-28 мая 1960 г. Численность дупеля на весеннем пролете значительно выше, чем на осеннем, который проходит с 3-й декады августа по сентябрь включительно (в 1958 г. – 20 августа, в 1959 г. – 28 августа, в 1969 г. – 5-29 сентября). Отдельные особи встречаются в октябре (6-10 октября 1960 г.).

56. Гаршнеп *Lymnocryptes minima* Brünn.

Гаршнеп является пролетной птицей в Кабардино-Балкарии. Весной он появляется обычно с 2-й половины марта. Начало пролета я отмечал: в 1955 г. – 16 марта, в 1956 г. – 19 марта, в 1957 г. – 22 марта, в 1959 г. – 15 марта. Пролет заканчивается в 1-й половине апреля (в 1957 г. – 10 апреля, в 1958 г. – 8 апреля, в 1959 г. – 15 апреля). Один раз я видел его в конце апреля (29 апреля 1960 г.) в районе с. Александровское. Осенний пролет проходит с конца августа до 1-й половины ноября (в 1959 г. – 29 августа, в 1960 г. – 6 ноября). Основная масса птиц пролетает в сентябре (в 1959-1960 г. 10-29 сентября).

57. Кулик-сорока *Haematopus ostralegus longipes* But.

О гнездовании этого кулика в центральной части Северного Кавказа в орнитологической литературе нет определенных указаний. Существует лишь предположение о возможности его гнездования. Л.Б. Беме (1926) отмечает, что в Северной Осетии кулик-сорока является редкой пролетной птицей. Про этого кулика Р.Л. Беме (1958) сообщает: "нами пара куликов-сорок наблюдалась в течение всего лета 1947 г. по отмелям р. Терек около г. Владикавказа. Птицы, вероятно, здесь гнездились" (стр.127).

В Кабардино-Балкарии этот вид является гнездящейся, перелетной птицей. Весной она прилетает в 3-й декаде [марта]. Появление кулика-сороки я отмечал: в 1955 г. – 22 марта, в 1956 г. – 17 марта, в 1957 г. – 25 марта, в 1958 г. – 8 апреля, в 1959 г. – 4 апреля и в 1960 г. – 15 апреля. В апреле птицы держатся стайками и совершают довольно большие кормовые кочевки, во время которых их можно наблюдать в 10-20 км от места гнездования. Кормовые кочевки совершаются и в гнездовое время. Так, я неоднократно наблюдал кулика-сороку в июне по речным долинам до высоты 900-1000 м, хотя его гнездовые места в Кабардино-Балкарии расположения не выше 500 м н.у.м.

Кладка у кулика-сороки начинается с 3-й декады мая. Полные свежие кладки я находил: в 1955 г. 4 июня, в 1957 г. – 2 июня, в 1958 г. – 14 июня, в 1959 г. – 3 июня, в 1960 г. – 29 мая. Всего один раз я нашел полную свежую кладку в 1-й декаде мая (9 мая 1956 г.). В период гнездования кулик-сорока расселяется по речным отмелям в равнинной зоне на высоте 200-500 м н.у.м. Небольшие гнездовые колонии были найдены в 1953-1969 гг. в долинах рр. Черек, Чегем, Малка. Чаще всего я наблюдал их в долине р. Черек в районе с. Нижний Черек. Общая численность гнездящегося кулика-сороки в этом районе больше, чем где-либо в республике.

Появление птенцов кулика-сороки падает на конец 2-й декады июня. Одно-двух-дневных птенцов я находил: в 1957 г. – 20 июня, в 1958 г. 20 июня, в 1959 г. – 18 июня, в 1960 г. – 19 июня. По всей вероятности эти сроки не являются предельно ранними, так как я нашел 22 июня 1959 г. четырех птенцов в возрасте примерно 8-9 дней. Только что вылупившихся птенцов я наблюдал и в июле (10 июля 1960 г.). Видимо, эти птенцы были из повторной кладки.

Осенний пролет кулика-сороки начинается с конца 2-й декады августа и продолжается до первых чисел октября (в 1957 г. – до 5 октября, в 1958 г. – до 10 октября, в 1959 г. – до 2 октября, в 1960 г. – до 11 октября). Основная масса птиц покидает республику в сентябре. Во время пролетов этих куликов можно наблюдать высоко в горах по до-

линам рек Малка, Баксан, Черек, Чегем и Хулам, а также у Верхних Голубых озер.

58. Сизая чайка *Larus canus* L.

В Кабардино-Балкарии этот вид я наблюдал всего 2 раза в долине р. Терек в районе с. Александровское (10 ноября 1957 г. и 25 октября 1958 г.).

59. Морской голубок *Larus genei* Breme

Морской голубок встречается в Кабардино-Балкарии очень редко. Добыт 1 экз. 20 января 1954 г. в районе г. Нальчика. Летом я наблюдал его всего 2 раза – 4 мая 1954 г. в долине р. Баксан и 6 мая 1954 г. в долине р. Терек.

60. Черноголовый хохотун *Larus ichtyaetus* Pall.

М.Н. Богданов (1879) предполагал возможность залета черноголового хохотуна в долины внутренних кавказских рек, в частности Терека, Куры и Аракса. Н.В. Селегененко (1949) отмечает случай залета этой птицы в предгорья Северной Осетии 24 марта 1949 г. (5 особей).

61. Обыкновенная чайка *Larus ridibundus* L.

По данным М.Н. Богданова (1879), обыкновенная чайка водится по всему Кавказу, за исключением горной области. Согласно Г.И. Радде (1885) и М.А. Мензбира (1895), этот вид встречается летом на горных озерах Армении, где и гнездится. И.Д. Чхиквишвили (1933) находил обыкновенную чайку в гнездовое время в Джавахетии. И.Б. Волчанецкий (1959) считает ее гнездящейся птицей Восточного Предкавказья. Л.Б. Беме (1926) указывает, что неоднократно встречал этих чаек в долине р. Терек около г. Владикавказа. В Кабардино-Балкарии я наблюдал обыкновенную чайку всего один раз – 22 октября 1960 г. в долине р. Терек около с. Александровское.

62. Малая чайка *Larus minutus* Pall.

Малая чайка в Кабардино-Балкарии является обычной пролетной птицей. Добыта 20 октября 1960 г. в долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м. и 19 августа 1961 г. около с. Аргудан.

63. Обыкновенная черная крачка *Chlidonias nugra nigra* L.

М.Н. Богданов (1879) наблюдал черную крачку в июне, июле и августе в долинах Терека и Кубани. В Кабардино-Балкарии черная крачка появляется обычно во время миграций. Весенний пролет начина-

ется с 2-й половины апреля и длится до конца 2-й декады мая. Иногда она встречается и в 3-й декаде мая (2 экз. добыты мной 25 мая 1959 г.). Осенний пролет наблюдается с 3-й декады августа по сентябрь включительно. В горах у Верхних Голубых озер я добыл 2 экз. 20 августа 1960 г.

64. Чайконосая крачка *Gelochelidon nilotica nilotica* Gmelin

Этот вид редко встречается в Кабардино-Балкарии, и бывает лишь на пролете. Один экземпляр добыт мною 22 сентября 1956 г. в долине р. Терек около с. Урожайное.

65. Обыкновенная речная крачка *Sterna hirundo hirundo* L.

В орнитологической литературе, посвященной птицам центральной части Северного Кавказа, нет точных данных о гнездовании речной крачки в этом районе. В работах Н.Я. Динника (1886), Л.Б. Беме (1926), Р.Л. Беме (1958) она даже не упоминается как пролетная птица.

В Кабардино-Балкарии эта крачка является довольно обычной птицей и держится по речным долинам равнинной зоны. Весной они прилетают обычно, начиная с 3-й декады апреля. Появление первых крачек в этом районе отмечалось в 1954 г. – 29 апреля, в 1955 г. – 10 мая, в 1956 г. – 28 апреля, в 1957 г. – 15 мая, в 1958 г. – 4 мая, в 1959 г. – 6 мая, в 1960 г. – 4 мая. В гнездовое время крачки заселяют речные долины в пределах от 200 до 600 м н.у.м., образуя небольшие колонии. Такие колонии встречаются по р. Черек на высоте 200-700 м н.у.м., по р. Чегем – от 200 до 300 м, по р. Баксан – от 200 до 500 м, по р. Малке – от 200 до 600 м. В поисках пищи крачки поднимаются по речным долинам даже до 800-1000 м. В гнездовое время я наблюдал крачек в долинах и более мелких рек – Лескен, Аргудан, Урвань, Шалушка, Нальчик, но гнезд этих птиц здесь я не находил. Видимо, они сюда прилетают только на кормежку.

Основная масса птиц гнездится на высоте 200-300 м н.у.м. обычно на песчаных и галечниковых участках, а также на плавнях. Гнездо представляет собой небольшое углубление, чаще всего естественное, со слабой растительной подстилкой. Из найденных мною 15 гнезд, 6 были совершенно без подстилки. Начало кладки я наблюдал: в 1955 г. – 2 июня, в 1956 г. – 4 июня, в 1957 г. – 8 июня, в 1958 г. – 29 мая, в 1959 г. – 2 июня, в 1960 г. – 30 мая. Птенцы появляются в 3-й декаде июня (в 1955 г. – 25 июня, в 1956 г. – 27 июня, в 1957 г. – 30 июня, в 1958 г. – 21 июня, в 1959 г. – 24 июня, в 1960 г. – 22 июня). Судя по нахождению хорошо летавших слётков 11 июля 1957 г. (фото 19), наши данные не являются предельно ранними. По всей вероятности, некоторые особи выводят птенцов, начиная со 2-й декады июня. Соответственно этому и кладка происходит раньше, чем в указанные мною сроки. Но это не массовое явление.

Нахождение слабо насиженных яиц в конце июня (28 июня 1960 г.) и в начале июля (3 июля 1959 г.) наводит на мысль о возможности повторной кладки в случае гибели первой. Это подтверждается нахождением птенцов 16 июля 1960 г. в пойме р. Малки около с. Приближное. Здесь я наблюдал ежедневно с 15 по 22 июля, как речные крачки носили корм и, по всей вероятности, кормили птенцов, еще не поднявшихся на крыло. С конца 1-й декады августа речные крачки начинает совершать значительные кормовые кочевки, во время которых они встречаются в долинах как малых, так и больших рек, а также на искусственных водоемах вдали от мест гнездования. Кочевки постепенно переходят в осенний перелет (с 3-й декады). Миграция продолжается до 3-й декады сентября.

В желудках добытых мною 10 экз. этого вида оказалась исключительно рыба – главным образом мелкие усачи.

66. Обыкновенная малая крачка *Sterna albifrons albifrons* Pall.

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что "малая мартышка встречается в большом количестве по Тереку, Куме, Кубани и их притокам, но только до подножья гор. В горной полосе никогда не встречал ее" (стр.185). И.В. Волчанецкий (1959) считает малую крачку гнездящейся птицей Восточного Предкавказья (на озерах и в дельте Терека). В Кабардино-Балкарии эта крачка тоже встречается в небольшом количестве на пролете. Осенняя миграция проходит в конце августа до 1-й декады октября. Основная масса птиц пролетает с 5 по 25 сентября. 25 августа 1960 г. я добыл 2 особи этого вида на верхних Голубых озерах на высоте около 1000 м н.у.м. В этом же году я наблюдал пролетные стаи 2-4 сентября в долине р. Нальчик (в районе парка), 5-29 сентября в долине рек Черек, Аргудан, Лескен и Урух, 8-10 октября на пруду около с. Аргудан. Два экземпляра добыты мною 25 мая 1959 г. в районе г. Нальчика и хранятся в музее Кабардино-Балкарского университета.

67. Чернозобая гагара. *Gavia arctica arctica* L.

В Кабардино-Балкарии чернозобая гагара встречается редко на пролете. Мною добыт всего 1 экз. 21 сентября 1960 г. на р. Нальчик (фото 20-21).

68. Чомга *Colymbus cristatus cristatus* L.

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что "хохлатый нырец водится в бассейнах Терека и Кубани" (стр.179). К.Н. Россиков (1884) относит этот вид к зимующим птицам восточной части долины р. Малки (равнинная зона Кабардино-Балкарии). Р.Л. Беме (1959) считает чомгу редко зимующей птицей в предгорьях Центрального Кавказа. В Кабардино-

Балкарии чомга встречается на пролете. Я неоднократно наблюдал ее на осеннем пролете в равнинной и предгорной зонах республики. Пролет начинается с конца августа (в 1959 г. – 28 августа, в 1960 г. – 30 августа). Основная масса птиц появляется в сентябре. Вполне возможно, что некоторые особи остаются на зиму в равнинной зоне в поймах р. Малка, Черек, Терек и на небольших озерах, но мне ни зимой, ни весной не приходилось наблюдать чомгу в Кабардино-Балкарии. В Зоологическом институте АН СССР, однако, имеется 1 экз., добытый Л.Б. Беме 14 мая 1921 г. в Терской губернии.

69. Серощекая поганка *Colymbus grisegena* Bodd.

По данным Л.Б. Беме (1926), серощекая поганка на Северном Кавказе является случайной залетной птицей. В Кабардино-Балкарии я наблюдал ее всего 2 раза – 12 октября 1958 г. и 15 октября 1960 г. Экземпляр, добытый мною 15 октября 1960 г., находится в моей коллекции.

70. Черношейная поганка *Colymbus caspicus caspicus* Hablizl

По данным М.Н. Богданова (1879), это весьма обыкновенная птица в бассейне Терека и Кубани. Ю.В. Аверин и А.А. Насимович (1938) сообщают: "черношейная поганка в течение всего лета встречается на горных озерах* (Б. Бамбак, Алоус, Ачипста, Черногорье, Тубинский пер., Хуко), что позволяет предположить гнездование этой птицы" (стр.46). Р.Л. Беме (1958) относит черношейную поганку к редко залетным птицам на Центральном Кавказе. Он наблюдал ее один раз в Северной Осетии (10 января 1947 г.). И.В. Волчанецкий (1959) указывает на гнездование этого вида в Восточном Предкавказье (в дельтах рек Кумы и Терека и на озере Каракизова).

В Кабардино-Балкарии я наблюдал черношейную поганку только на пролетах – 25 сентября 1959 г. и 14 мая 1960 г. У самки, добытой 14 мая на пруду около с. Аргудан, в яйцеводе оказалось много развитых фолликул размером от 9×9 мм до 4,5×4,5 мм. Судя по началу кладки в местах гнездования – на Украине в мае (Сомов, 1897), в Казахстане в первых числах июня (Сушкин, 1908), в низовьях Сыр-Дарьи в начале июня (Спангенберг, 1936), можно предполагать, что некоторые особи остаются на лето в поймах р. Малка и Терек. Это подтверждает также в некоторой степени добыча одного самца 25 мая 1960 г. в пойме р. Малка около с. Приближное.

---

* Имеется в виду северо-западная часть Кавказа.

71. Малая поганка *Colymbus ruficollis* Pall.

Чаще всего эту поганку я наблюдал в Кабардино-Балкарии во время осенних и весенних миграций. Осенний пролет проходит с конца августа до первых чисел ноября (4 ноября 1958). Отдельные особи встречались мне и зимой на незамерзающих озерах и родниковых источниках равнинной зоны (29 декабря 1958 г., 10 января 1959 г. и 4 февраля 1959 г.). Весенний пролет обычно я наблюдал с конца марта до первых чисел мая (25 марта 1957 г., 28 марта 1958 г., 4 апреля 1960 г.). Вполне возможно, что малая поганка гнездится в поймах р. Малка, Терек и Черек, но мне очень мало известно о жизни этой птицы летом. Я видел ее всего несколько раз в июле 1960 г. в районе с. Приближное (16, 17, 20 и 29 июля 1960 г.). 17 июля я видел одну взрослую птицу и двух молодых на озере, заросшим камышом, около с. Екатериноградское (пойма р. Малка).

72. Лебедь-кликун *Cygnus cygnus* L.

Относительно нахождения этого вида на Кавказе М.Н. Богданов (1879) сообщает: "я видел лебедей-кликунов во множестве осенью в дельте Терека, но не удалось убедиться, гнездится ли эта птица в Кавказском крае" (стр.171). К.Н. Россиков (1884) наблюдал зимующих лебедей-кликунов в 1881 г. в долине р. Малка. Объясняет он это необычайно теплой зимой того года. О зимовке этих птиц в Закавказье указано в работах Г.И. Радде (1885) на Гатченском озере и Л.В. Шелковникова (1934) на озере Севан. В Кабардино-Балкарии лебедь-кликун встречается редко на осеннем пролете. Добыт 1 октября 1955 г. на Голубом озере (900 м н.у.м.).

73. Лебедь-шипун *Cygnus olor* J.F. Gm.

О гнездовании лебедя-шипуна на Кавказе имеются сведения в орнитологической литературе. В частности, М.Н. Богданов (1879) указывает на его гнездование в дельте Терека, Л.Б. Беме (1925, 1935) – на рр. Терек и Сулак, А.В. Шапошников (1932)* – в плавнях Кубани. В Кабардино-Балкарии этот вид в настоящее время встречается редко и только на осеннем пролете. 29 сентября 1953 г. мною был убит один самец в Черекском ущелье (на Голубом озере). В том же году 10 октября один лебедь-шипун был доставлен лесниками живым в зверинец Дворца пионеров г. Нальчика.

---

* Ссылка приведена по данным из сводки «Птицы Сов. Союза», т.4. 1952.- С.270. В диссертации библиография этой работы не указана, и нам она неизвестна (прим. ред.).

74. Серый гусь *Ansser anser* L.

М.Н. Богданов (1879) сообщает, что серый гусь "в бассейне Терека гнездится и живет в большом количестве в дельте" (стр.171). В Кабардино-Балкарии я наблюдал этот вид только на пролете и зимовке. Осенняя миграция проходила в октябре - ноябре (в 1955 г. – 10 октября, в 1956 г. – 15 октября, в 1957 г. – 20 ноября). Весенняя миграция мною наблюдалась в 1953 г. – 20 марта, в 1954 г. – 23 марта, 1955 г. – 16 марта, в 1956 г. – 10 марта, в 1957 г. – 8 марта.

Зимой серые гуси встречаются редко и держатся не постоянно в течение всей зимы, а лишь короткое время. Так, 2 января 1953 г. я встретил 6 особей около с. Озрек, а 10 января они куда-то улетели, и мне не удалось снова найти их, хотя я обошел все места равнинной зоны, где могли задержаться эти птицы. 20 января 1954 г. стая серых гусей (5 экз.) кормилась около с. Верхний Аргудан. Я наблюдал их там 5 дней, а затем они исчезли. В 1958 г. пару серых гусей я видел в районе с. Александровское с 10 по 15 января.

75. Белолобый гусь *Anser albifrons albifrons* Scop.

В Кабардино-Балкарии белолобые гуси встречаются в небольшом количестве на осеннем пролете, который я наблюдал в 1957 г. – 20 октября, а в 1958 г. – 15 ноября в районе с. Аргудан. Иногда они остаются зимовать в районах незамерзающих озер (3 января 1958 г. около с. Александровское) и родниковых источников (10 февраля 1959 г. около с. Нижний Черек). Добыть их мне не удалось.

76. Краснозобая казарка *Rufibrenta ruficollis* Pall.

Л.Б. Беме (1925) указывает, что в сентябре 1914 г. в Северной Осетии был добыт 1 экз. этой птицы. В Кабардино-Балкарии краснозобая казарка – редкая залетная птица. В музее Кабардино-Балкарского университета имеются 2 экз., добытые 10 декабря 1959 г. в районе г. Нальчика.

77. Пеганка *Tadorna tadorna* L.

По данным Л.Б. Беме (1925), пеганка – случайно залетная птица на Северном Кавказе. Он добыл двух особей из стайки в 5 птиц в Северной Осетии 21 октября 1915 г. Р.Л. Беме (1958) указывает, что Н. Волчанов встречал пеганок около г. Пятигорска 8 апреля 1924 г. В музее Кабардино-Балкарского университета имеется 1 экз., добытый студентом Н. Гуговым 20 марта 1960 г. в районе с. Гедук в долине р. Баксан. По его словам он добыл пеганку из стайки в 4 особи.

78. Огарь *Tadorna ferruginea* Pall.

По данным Р.Л. Беме (1958), огарь – редкая пролетная птица на Центральном Кавказе. Он указывает, что Н. Волчанов встречал этот вид около г. Пятигорска 29 марта и 8 апреля 1924 г. Возможно, она встречается и в Кабардино-Балкарии на пролете, но мне не приходилось ее наблюдать.

79. Шилохвость *Anas acuta* L

Относительно нахождения шилохвости в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) сообщает: "шилохвость, как и серуха, распространен по р. Куре, реже встречается по р. Малке, от ст. Прохладной до слияния с Тереком. Осенью до наступления морозов шилохвостей вообще больше* от присоединения прилетающих с севера" (стр.28). Я наблюдал зимой шилохвость в Кабардино-Балкарии всего один раз – 2 января 1960 г. в районе с. Александровское. Обычно же мне приходилось его видеть лишь на осенних и весенних пролетах.

Осенний пролет проходит в октябре - ноябре. Я отмечал его в 1954 г. – 5 октября, в 1955 г. – 20 октября, в 1956 г. – 15 октября, в 1957 г. – 25 октября и в 1958 г. – 25 ноября. Весенний пролет начинается с конца февраля и продолжается до конца 1-й декады апреля (в 1957 г. – 27 февраля, в 1958 г. – 4 марта, в 1960 г. – 10 апреля). Одиночных особей я наблюдал и до первых чисел июня в низовьях р. Малка, Баксан, Урвань, Черек и Терек (в 1954 г. – 20 мая, в 1955 г. – 15 мая, в 1957 г. – 2 июня и в 1958 г. – 3 июня). Хотя я довольно тщательно искал гнездо шилохвости, но поиски оказались безуспешными; даже самих птиц я не наблюдал в середине июня. По всей вероятности, по каким-то причинам отдельные особи задерживаются на определенное время, а затем покидают пределы республики и улетают в Закавказье или Предкавказье, где шилохвости гнездятся.

80. Чирок-свистунок *Anas crecca crecca* L.

В Кабардино-Балкарии основная масса чирков этого вида встречается на осенних и весенних миграциях. Осенний пролет начинается с конца августа и продолжается до первых чисел ноября. На горных озерах (Верхние Голубые озера) они появляются с 3-й декады августа, а в редких случаях даже в 1-й половине августа (10 августа 1956 г.). Массовая миграция происходит с 10 по 25 сентября (1959-1960 гг.). С октября численность пролетных стай редко сокращается, а с 2-й декады ноября чирков можно наблюдать в основном только в равнинной зоне в поймах р. Малка, Баксан, Черек, Терек, а также на озерах.

---

* Имеется в виду увеличение численности шилохвости.

В зимний период чирки встречаются в горной зоне на незамерзающих речках и озерах (12 января 1957 г., 4 января 1958 г.). В предгорной зоне значительно меньше благоприятных мест для зимовки чирков, и здесь они появляются на короткое время. Весенний пролет этих птиц начинается с 1-й декады марта и заканчивается в 2-й декаде апреля (в 1952 г. – 4 марта, в 1953 г. – 10 марта, в 1956 г. – 20 апреля, в 1957 г. – 22 апреля).

В небольшом количестве чирков можно наблюдать и в гнездовое время. Так, я ежедневно наблюдал этих уток с 3 по 29 июля 1960 г. в районе с. Приближное и Екатериноградское на озерах в пойме р. Малка. 16 июля мне удалось добыть 2 экз. – старую самку и молодую птицу. В стайках было по 5-9 особей и всегда было заметно, что это птицы разного возраста. Гнезд чирка-свистунка я ни разу не находил.

81. Кряква *Anas platyrhynchos platyrhynchos* L.

По данным К.Н. Россикова (1884), "кряковая утка распространена по всем восточным частям речных долин степи и равнины. В половине ноября к жилым уткам присоединяются прилетающие с севера и держатся до конца февраля" (стр.27). Хотя я неоднократно наблюдал крякву в гнездовое время в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, гнезд этой утки мне найти не удалось. Стайки до 5-10 особей я наблюдал регулярно с 13 по 20 июля 1960 г. в районе г. Прохладного в пойме р. Малка.

Начало осеннего пролета хорошо заметно по резкому увеличению численности птиц. Так, в районе с. Приближное 20 июля появились большие стаи крякв с серыми утками и чирками. 22-25 июля в течение дня (с 5 час. утра до 6 час. вечера) в разных местах поблизости от р. Малка я наблюдал десятки больших стай (до 50-60 особей). Часть птиц остается здесь на всю зиму, а остальные улетают. Судя по их появлению в горной зоне, осенний пролет начинается с конца августа и заканчивается в 3-й декаде октября. Зимующие кряквы зимой встречаются на незамерзающих речках и озерах. Основные места зимовок находятся в равнинной зоне, на высоте 200-300 м н.у.м. (район с. Александровское и г. Прохладного). Весенний пролет продолжается с середины 3-й декады февраля до конца марта. Массовый пролет наблюдается в 3-й декаде марта. Отдельные небольшие стайки встречаются и в апреле (10-20 апреля 1956-1960 гг.).

82. Серая утка *Anas strepera strepera* L.

По данным К.Н. Россикова (1884), серая утка обитает в плавнях и заводях р. Куры, на границе Ставропольского края. В Кабардино-Балкарии я наблюдал этот вид лишь на пролетах и зимовке. Осенний

пролет продолжается с 3-й декады августа до конца октября, а весенний – с конца февраля (в 1956-1960 гг. – 25-28 февраля) по март включительно. Во время миграций этих птиц можно наблюдать во всех зонах (равнинной, предгорной и горной) в болотистых местах, около родниковых источников, на озерах, заросших прибрежными растениями. Кроме того, серую утку можно обнаружить в сильно заросших камышами, тростниками и кустарниками долинах рек, на искусственно орошаемых полях, где образуются небольшие болотистые участки, заросшие тростником и осокой. Основные места зимовки этих уток находятся в равнинной зоне, в поймах р. Малка и Терек, а также около с. Александровское. Численность зимующих серых уток значительно меньше, чем кряквы.

83. Свиязь *Anas penelope* L

По данным М.Н. Богданова (1879), свиязь встречается на Кавказе повсеместно, но реже других уток. В Кабардино-Балкарии я наблюдал эту птицу обычно на пролетах в значительно меньшем количестве, чем крякву или серую утку. Осенний пролет проходил в 1954 г. – 20 сентября, в 1955 г. – 4 ноября, в 1956 г. – 10 октября, в 1957 г. – 29 сентября, в 1958 г. – 10 октября, в 1960 г. – 19 сентября, а весенний в 1956 г. – 4 марта, в 1957 г. – 20 марта, в 1958 г. – 10 марта. В Зоологическом институте АН СССР имеется 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 30 декабря 1882 г. в районе г. Прохладного (в пойме р. Малка).

84. Чирок-трескунок *Anas querquedula* L.

В Кабардино-Балкарии чирок-трескунок – довольно обычная птица на пролетах. Осенний пролет этих птиц начинается с 3-й декады августа и продолжается до конца октября. В это время их можно наблюдать как в равнинной, так и в горной зонах по речным долинам и на озерах. 25 июля 1960 г. большая стая чирков-трескунков появилась в районе с. Приближное. 26 июля мною было добыто в этом районе 4 экз. (3 самца и 1 самка). Весенний пролет начинается с конца февраля (в 1958 г. – 27 февраля, в 1960 г. – 25 февраля) и продолжается до конца 1-й декады апреля (в 1956 г. – 8 апреля, в 1957 г. – 10 апреля и в 1958 г. – 9 апреля). Численность пролетных особей осенью значительно больше, чем весной. В зимний период мне не приходилось добывать чирка-трескунка в Кабардино-Балкарии, но по всей вероятности небольшая часть птиц остается зимовать в поймах р. Малка и Терек. В зоологическом институте АН СССР хранится 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 22 ноября 1883 г. в районе г. Прохладного.

85. Широконоска *Anas clypeata* L.

Широконоска встречается в Кабардино-Балкарии значительно реже, чем другие утки на пролетах. Осенний пролет я отмечал в 1957 г. – 10 октября, в 1958 г. – 2 ноября, в 1960 г. – 22 октября, а весенний – с марта по первую половину апреля (в 1957 г. – 4 марта, в 1958 г. – 14 апреля). Отдельные особи остаются зимовать в Кабардино-Балкарии на незамерзающих речках и озерах равнинной зоны. 10 января 1960 г. мною добыты 2 экз. в районе с. Александровское.

86. Красноносый нырок *Netta rufina* Pall.

К.Н. Россиков (1884) сообщает: "красноносый нырок живет по реке Куре, где избирает только большие и вместе с тем открытые плавни, окаймленные мелколесьем. В январе, реже в феврале, не раз появляется на р. Малке" (стр.28). В Зоологическом институте АН СССР хранится 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 3 февраля 1882 г. в районе г. Прохладного. На территории Кабардино-Балкарии я наблюдал его всего один раз 10 сентября 1955 г. в долине р. Баксан недалеко от с. Ново-Ивановка.

87. Красноголовый нырок *Aythya ferina ferina* L.

По данным К.А. Сатунина (1912), красноголовый нырок встречается на пролете по всему Кавказу, где имеются подходящие места. Ю.В. Аверин и Л.А. Насимович (1938) указывают, что встречали на весеннем пролете красноголового нырка у северной границы Кавказского заповедника в бассейне р. Белой. Согласно данным Р.Л. Беме (1958), этот вид – редко зимующая птица на Центральном Кавказе. В Кабардино-Балкарии мне не приходилось наблюдать его ни на пролетах, ни на зимовке.

88. Белоглазый нырок *Aythya nyroca* Guld.

М.Н. Богданов (1879) пишет, что этот нырок "очень обыкновенен в бассейнах Терека и Кубани" (стр.177). По данным И.Б. Волчанецкого (1959), красноголовый нырок гнездится на озерах и в дельте Терека*. Р.Л. Беме (1958) указывает, что этот вид является редко зимующей птицей на Центральном Кавказе. В Кабардино-Балкарии мне приходилось добывать его всего один раз – 20 января 1958 г. в пойме р. Малка.

89. Хохлатая чернеть *Aythya fuligula* L.

В Кабардино-Балкарии этот вид встречается в небольшом количестве на пролетах и на зимовке. Осенний пролет я отмечал в 1958 г. –

---

* И.Б. Волчанецкий (1959) находил белоглазого нырка на разливах в низовьях Кумы и изредка – на разливах Маныча, а красноголового – на Маныче, Куме и Тереке (прим. ред.)

25 октября, в 1960 г. – 19 октября. На весеннем пролете я наблюдал его всего один раз – 15 марта 1958 г. в долине р. Черек на высоте 300 м н.у.м. 10 февраля 1956 г. в 9 км к северу от с. Аргудан на незамерзающем родниковом источнике я встретил на зимовке стаю хохлатых чернетей в количестве 10 экз. вместе с 6 серыми утками. Больше мне не приходилось наблюдать этих птиц зимой в республике.

90. Морская чернеть *Aythya marila* L.

Морская чернеть – случайная птица в Кабардино-Балкарии. Один экземпляр добыт мною 2 января 1956 г. в долине р. Урух в районе с. Александровское.

91. Гоголь *Bucephala clangula* L.

По данным К.Н. Россикова (1884), гоголь зимует в Кабардино-Балкарии. Появляется он на р. Малка с января и живет стайками от 10 до 15 особей. В музее Ленинградского университета хранится 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 18 января 1886 г. на р. Терек около ст. Эльхотово (Северная Осетия). Зимующие гоголи улетают из Кабардино-Балкарии в 1-й половине марта (Россиков, 1884).

92. Луток *Mergus albellus* L.

М.Н. Богданов (1879), Г.И. Радде (1885), К.А. Сатунин (1912) указывают, что луток является зимующей птицей. По данным Р.Л. Беме (1958), это обычная птица зимой на Центральном Кавказе. Прилетает она в конце октября и держится до начала марта.

93. Средний крохаль *Mergus serrator* L.

О нахождении этого вида осенью и зимой на Кавказе имеются сведения в работах М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1885), К.А. Сатунина (1912). По данным Л.Б. Беме (1926), эти птицы случайно залетают зимой в Северную Осетию.

94. Большой крохаль *Mergus merganser* L.

По данным К.Н. Россикова (1884), эта птица появляется в Кабардино-Балкарии в январе - феврале и держится на р. Малка до половины марта.

95. Колпица *Platalea leucorodia* L.

Н.Я. Динник (1886) наблюдал ее на пролете в Ставропольском крае. О пролете колпицы на Кавказе есть указания в работах М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1885), К.А. Сатунина (1912). По данным Л.Б. Беме (1926), колпица встречается на пролете на Северном Кавказе. Он упоминает о добыче 2 экз. в Северной Осетии в мае 1912 г. и осенью 1923 г.

96. Каравайка *Plegadis falcinellus* L.

По данным М.Н. Богданова (1879), каравайка весьма обыкновенная птица на озерах и реках равнин Кавказа. Н.Я. Динник (1886) встречал ее и весной, и осенью в Ставропольском крае на берегах Сингилеевского озера. На этом же озере он наблюдал около 10 особей 4 апреля 1879 г. Л.Б. Беме (1926) указывает, что 1 экз. этой птицы был добыт осенью 1908 г. около г. Владикавказа. Вполне возможно, что в Кабардино-Балкарии каравайка встречается на пролетах, но мне не приходилось ее наблюдать.

97. Черный аист *Ciconia nigra* L.

По данным Н.Я. Динника (1886), черный аист обитает в летнее время по берегам рек бассейнов Терека и Кубани и гнездится в этих районах. По его данным, "черный аист часто попадается по берегам горных речек, поднимаясь до высоты около 3000 футов" (стр.286). Р.Л. Беме (1958) считает, что этот аист – редко гнездящаяся птица лесной полосы Центрального Кавказа. Я неоднократно наблюдал этот вид осенью, весной и в гнездовое время. Но мне ни разу не удалось найти гнездо или встретить молодых птиц. Один экземпляр добыт в июле 1959 г. в районе г. Нальчика (в долине р. Шалушка).

98. Белый аист *Ciconia ciconia* L.

Белый аист в Кабардино-Балкарии встречается в небольшом количестве во время миграций. Осенний пролет проходит в сентябре и октябре (в 1957 г. – 10 сентября, в 1960 г. – 20 октября). Весенний пролет отмечен всего один раз 25 марта 1956 г. По данным Р.Л. Беме (1958), Н. Волчанов наблюдал белых аистов 12 апреля 1921 г. около г. Пятигорска.

99. Серая цапля *Ardea cinerea cinerea* L.

Н.Я. Динник (1886) указывает, что серая цапля встречается на Северном Кавказе, за исключением горной полосы, по берегам озер, рек и больших прудов, где и выводит свое потомство. Р.Л. Беме (1958) считает серую цаплю обычной пролетной птицей в болотистых долинах Центрального Кавказа.

В Кабардино-Балкарии серая цапля – гнездящаяся перелетная, частично зимующая птица. Весной она появляется, начиная с 2-й декады марта (в 1953 г. – 10 марта, в 1954 г. – 12 марта, в 1955 г. – 16 марта, в 1956 г. – 13 марта, в 1957 г. – 22 марта, в 1958 г. – 17 марта). В период гнездования серую цаплю часто можно встретить по долинам крупных рек Кабардино-Балкарии на высоте 200-400 м н.у.м. Наибольшее количество серых цапель сосредоточено в поймах р. Малка, Баксан, Черек и Терек. Кормящихся цапель можно часто встретить вдали от речных до-

лин на небольших болотистых местах. Мне не удалось найти гнездо серой цапли, но я неоднократно наблюдал молодых, еще плохо летавших птиц (10 июня 1956 г., 2 июля 1957 г., 4 июня 1958 г., 15 июня 1959 г., 22 июня 1960 г.).

Осенний пролет серых цапель начинается с конца 1-й декады августа и продолжается до первых чисел ноября. Массовый пролет проходит в сентябре (в 1958-1960 гг. – 15-29 сентября). 22 сентября 1960 г. в 9 час. утра около с. Аргудан пролетали 2 стаи – одна из 43, а другая – из 56 особей. Таких крупных стай мне не приходилось наблюдать за все время работы. Птицы летели с северо-востока на юго-запад, т.е. пересекали Главный Кавказский хребет по долине р. Псыгансу. Зимующих серых цапель я наблюдал в Кабардино-Балкарии 20-22 января 1959 г. и 1-10 января 1960 г. в долине р. Черек в районе с. Нижний Черек.

100. Рыжая цапля *Ardea purpurea purpurea* L.

Рыжая цапля появляется в Кабардино-Балкарии в 3-й декаде марта. Так, первые цапли были отмечены в 1952 г. – 20 марта, в 1953 г. – 28 марта, в 1954 г. – 19 марта, в 1955 г. – 2 апреля, в 1956 г. – 10 апреля, в 1957 г. – 23 марта, в 1958 г. – 15 апреля. Хотя я неоднократно наблюдал этих птиц в гнездовое время в районах с. Урожайное, Александровское, Приближное, Екатериноградское и в других местах равнинной зоны, мне ни разу не удалось встретить птенцов или найти гнездо. Чаще всего в летнее время я видел рыжих цапель в районе ст. Котляревская в пойме р. Терек, но мои попытки найти в этом районе гнездо были безуспешны (один раз, 4 июня 1960 г., я добыл самку с наседным пятном).

Судя по появлению этих птиц в горной зоне на высоте 900-1000 м н.у.м., осенний пролет начинается уже с 1-й декады августа. Так, 9-12 августа 1956 г. я видел 3 рыжих цапель на Голубом озере в Черекском ущелье. Массовый пролет проходит в сентябре, хотя отдельных запоздалых особей я наблюдал в октябре (в 1958 г. – 10 октября, в 1960 г. – 29 октября).

101. Большая белая цапля *Egretta alba alba* L.

В Кабардино-Балкарии большая белая цапля встречается в небольшом количестве на осенних и весенних миграциях и на зимовке. Появление первых птиц на осеннем пролете я отмечал в 1959 г. – 29 октября, в 1960 г. – 19 октября. На весеннем пролете я наблюдал их всего один раз 22 марта 1955 г. Зимой эта цапля держится на незамерзающих болотистых местах, причем зимующие особи появляются с 2-й декады декабря (1956-1959 гг.). В 1960 г. пара больших белых цапель держалась в течение 20 дней (с 1 по 20 января) около с. Нижний Черек.

102. Малая белая цапля *Egretta garzetta* L.

Из всех цапель, встречающихся в Кабардино-Балкарии, малая белая цапля – самая редкая птица. В Кабардино-Балкарии эти птицы появляются с 2-й половины марта - первых чисел апреля. Так, в 1955 г. она была встречена мной 15 марта около с. Аргудан в зарослях тростника, а в 1956 г. – 6 апреля там же. Около с. Нижний Черек 5 апреля 1956 г. я добыл 1 экз., который отличался преобладанием серого цвета на маховых и рулевых перьях.

Осенний пролет я отмечал в 1956 г. – 25 октября, в 1957 г. – 22 октября. В 1960 г. одна малая цапля наблюдалась 18 августа в долине р. Хулам в 10 км ниже ледника Безенги. Во время пролета этот вид встречается в основном по речным долинам, заросшим приречными растениями, иногда встречается и у горных озер. Так, 26 августа 1950 г. я наблюдал пару таких цапель у Голубого озера.

103. Египетская цапля *Bubulcus ibis ibis* L.

Случаи отстрела египетских цапель на Северном Кавказе в августе 1899 г. и мае 1947 г. указаны в работах Л.Б. Беме (1926) и Р.Л. Беме (1958).

104. Желтая цапля *Ardeola ralloides* Scop.

В Кабардино-Балкарии желтая цапля обычная птица на осеннем и весеннем пролетах, во время которых ее можно наблюдать не только у больших озер, прудов и речных долин, но даже на маленьких лужайках вблизи жилищ человека. Так, 28 сентября 1960 г. в с. Аргудан я наблюдал пару рыжих цапель* на лужайке площадью 2×3 м в 200 м от жилого дома.

Осенний пролет этих цапель начинается с 2-й половины августа, когда они появляются на горных озерах, и продолжается до первых чисел ноября. Весенний пролет обычно затягивается. Первых пролетных я наблюдал в 1957 г. – 15 марта, в 1958 г. – 10 марта. В 1960 г. пролет проходил с конца 2-й декады апреля по май включительно. Так, 20 мая я добыл одного самца из стаи, в которой насчитывалось 30 особей, в районе с. Эльбрус в Баксанском ущелье на высоте 1800 м н.у.м. В этом же районе 25 мая я видел 3 желтых цапель. Они сидели на трех небольших соснах у р. Баксан в 6 час. вечера.

Хотя я неоднократно наблюдал желтых цапель в гнездовое время в равнинной зоне Кабардино-Балкарии (в поймах рек Терек, Малка, Баксан, Черек и Урвань), однако мне ни разу не удалось найти гнездо или встретить птенцов этой цапли. Поэтому в настоящее время я не могу с достоверностью утверждать, что желтая цапля гнездится в Кабар-

---

* У автора, вероятно, опечатка, так как речь здесь идет о желтой цапле (прим. ред.).

дино-Балкарии. В музее Кабардино-Балкарского университета имеется 1 экз., добытый 5 июня 1958 г. недалеко от г. Нальчика.

105. Кваква *Nycticorax nycticorax nycticorax* L.

М.Н. Богданов (1879) отмечает, что "кваква весьма обыкновенна и гнездится на Тереке и Кубани" (стр.168). Н.Я. Динник (1886) наблюдал эту птицу около г. Ставрополя 28 марта и указывает, что она часто встречается на р. Терек. По данным Р.Л. Беме (1958), кваква на Центральном Кавказе многочисленна на весеннем пролете, но обычна на осеннем.

В Кабардино-Балкарии кваква встречается в основном во время пролетов. Появление первых птиц на осеннем пролете я наблюдал в 1958 г. – 20 октября, в 1959 г. – 10 сентября, в 1960 г. – 24 апреля. Во всех случаях я встречал квакву в равнинной зоне в районе с. Александровское и Нижний Черек. Вполне возможно, что кваква гнездится в Кабардино-Балкарии в поймах р. Малка и Терек. За это говорит нахождение мною 2 взрослых птиц 18 июня 1960 г. в 5 час. утра в районе г. Прохладного в пойме р. Малка. Птицы кормились в зарослях камыша.

106. Малая выпь *Ixobrychus minutus* L.

По данным М.Н.Богданова (1879), малая выпь водится в камышах по берегам озер и рек Кавказа, за исключением горных районов. В Кабардино-Балкарии мне приходилось наблюдать ее в основном на пролетах. Начало весеннего пролета я отмечал: в 1956 г. – 25 марта, в 1957 г. – 4 апреля, в 1958 г. – 10 апреля, в 1959 г. – 28 марта. Осенний пролет проходит обычно с 3-й декады августа по сентябрь включительно. Отдельные запоздалые особи встречаются и в октябре, например, 10 октября 1056 г., 5 октября 1957 г., 20 октября 1960 г. Судя по экземплярам, добытым 20 июня 1958 г. и 14 июня 1960 г., можно предположить, что малая выпь гнездится в поймах р. Малка и Терек, а также в болотистых местах равнинной зоны на высоте 200-300 м н.у.м.

107. Выпь *Botaurus stellaris stellaris* L.

По данным Н.Я. Динника (1886), "выпь принадлежит к числу обыкновенных птиц Кавказа. Прилетают выпи на Северный Кавказ в первой половине марта и остаются здесь до октября". К.Н. Россиков (1884) сообщает, что "выпь обыкновенна в другие времена года по всем речным долинам Малки, Баксана, Куры, где есть болота и плавни. Зимой же мне довелось наблюдать выпь всего один раз, 12 декабря 1883 г." (стр.44). В Кабардино-Балкарии, хотя я неоднократно наблюдал выпь в гнездовое время, мне ни разу не удалось найти ее гнездо. Возможно, она гнездится в равнинной зоне в районах с. Приближное, Екатериноградское, Псыкод и ст. Котляревская. Осенний пролет этой птицы до-

вольно растянут. Он проходит с 3-й декады августа по 1-ю декаду ноября (в 1952 г. – 29 августа, в 1953 г. – 14 октября, в 1954 г. – 10 сентября, в 1955 г. – 9 сентября, в 1956 г. – 20 августа, в 1957 г. – 19 октября, в 1958 г. – 10 ноября.). Весенний пролет длится обычно с 2-й половины марта по апрель включительно (в 1957 г. – 15 марта, в 1958 г. – 14 апреля, в 1960 г. – 24 апреля). В гнездовое время я наблюдал выпь в районе с. Александровское – 10 июня 1958 г., Нижний Черек – 20 мая 1957 г., Приближное – 12 июня 1958 г. и 15-20 июня 1960 г. Зимой в Кабардино-Балкарии мне не приходилось встречать этот вид.

По данным М.Н. Богданова (1879), И.Н. Россикова (1884), Н.Я. Динника (1886), а также по утверждениям местных охотников, выпь гнездится в поймах рек Терек, Малка, Баксан, Черек и Кура, но я ни разу не находил гнезд этой птицы в Кабардино-Балкарии.

108. Фламинго *Phoenicopterus ruber roseus* Pall.

Л.Б. Беме (1926) наблюдал фламинго в Северной Осетии 10 января 1917 г. около с. Шанаево и в феврале 1916 г. около с. Дарг-Кох. В Кабардино-Балкарии я видел этих птиц (4 особи) всего один раз – 12 декабря 1957 г. в долине р. Терек, около с. Плановское, когда они кормились на болоте.

109. Сокол *Falco peregrinus brevirostris* Menzbier

Этот сокол изредка попадается в Кабардино-Балкарии на осеннем пролете и зимой. Добыт 21 января 1960 г. около с. Аргудан.

110. Кавказский сокол *Falco peregrinus caucasicus* Kleinshmidt.

В Кабардино-Балкарии кавказский сокол заселяет в период гнездования горную зону. Зимой он совершает кочевки, во время которых встречается в равнинной и предгорной зонах – на полях и опушках лесов. Нередко кавказский сокол охотится за домашними птицами и голубями в городах и селениях. Гнездится он на скалах и высоких старых башнях. На одной из таких башен в Черекском ущелье на высоте 1400 м н.у.м. 10 июня 1954 г. я нашел гнездо с 4 вполне оперившимися птенцами. В целом численность вида по всей республике небольшая. Чаще всего я наблюдал этих птиц в Баксанском ущелье в районе пос. Былым и в Хуламском ущелье в районе с. Безенги. В этих местах я часто наблюдал кавказских соколов, преследовавших скалистых голубей, каменных куропаток, клушиц и альпийских галок. У гнезда, найденного 10 июня 1954 г., я обнаружил много перьев перечисленных мною птиц.

111. Европейский балобан *Falco cherrug danubialis* Kleinschmidt

По данным М.Н. Богданова (1879), балобан – весьма обыкновенная птица в долинах Терека и Кубани. Относительно распространения этого вида в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) пишет: "Балобан пролетает в конце сентября. Зиму проводит в открытой степи и на равнине на стогах, реже в мелких рощах по Эристовскому каналу, где охотится на зайцев и куропаток. В первой половине марта, а иногда и во второй, балобан отлетает на север. Летом встречается чрезвычайно редко" (стр.38). О нахождении балобана на Северном Кавказе в летний период указано в работе Л.Б. Беме (1926), который добыл одну самку 30 июня 1915 г. около г. Владикавказа.

В Кабардино-Балкарии основная масса этих соколов является зимующей птицей. Прилетают они в конце августа - первой половине сентября, а улетают – в 1-й половине марта, хотя отдельные особи остаются и на летний период. За период работы я наблюдал всего 6 экз. этой птицы в лиственном лесу предгорной и горной зон, а в 1954 г. в буковом лесу около с. Зарагиж нашел одно гнездо с 4 яйцами. Гнездо было построено на дереве, на высоте 5 м от земли.

112. Обыкновенный чеглок *Falco subbuteo subbuteo* L.

Относительно распространения чеглока на Кавказе М.Н. Богданов (1879) писал: "Белогорлика я встречал очень часто на плоскости в бассейне Терека, Кубани и Кумы с их притоками. Нередко попадался он мне и в нижнем поясе гор (в поясе лиственных лесов); а по широким долинам северного склона видел его даже до пояса елей… Нет сомнения, что он гнездится в Кавказском крае" (стр.42). По данным Н.Я. Динника, чеглок наблюдается на равнинах и предгорьях Кавказа летом и осенью.

В Кабардино-Балкарии эта птица встречается довольно часто на равнине и в предгорной зоне. В горной зоне я наблюдал его, в основном, осенью на пролете. Чеглок появляется в пределах республики в 2-й половине марта и держится до конца октября, а отдельные особи иногда остаются на зимовку. Я добывал его несколько раз: 10 января 1956 г., 2 января 1957 г., 4 января 1959 г. Осенний пролет птиц проходит в сентябре - октябре, а весенний – с 2-й половины марта. В гнездовое время чеглок заселяет леса равнинной и предгорной зон. Численность птиц резко возрастает на осеннем пролете, особенно в сентябре, когда появляется много пролетных перепелов, за которыми они охотятся.

Полные свежие кладки в республике можно найти с 3-й декады мая. Хотя мне неоднократно приходилось наблюдать чеглока в период гнездования, я нашел всего одно гнездо с только что вылупившимися пуховичками 15 июня 1951 г. в районе с. Аргудан. В 1960 г. 20 мая око-

ло с. Нижний Черек я нашел гнездо с 3 свежими яйцами, а 4 и 5 июня в том же районе 2 гнезда, в каждом из которых было по 4 сильно насиженных яйца.

У добытых мною 6 экз. в желудках оказались исключительно остатки мелких птиц. Р.Л. Беме (1958) указывает на то, что в желудках чеглоков, отстреленных 28 марта 1947 г., 21 июня 1947 г. и 14 июня 1951 г. в Северной Осетии, находились хитиновые надкрылья жуков, остатки прямокрылых и в одном случае какого-то жаворонка.

113. Обыкновенный дербник *Falco columbarius* Tunst.

В Кабардино-Балкарии дербник является пролетно-зимующей птицей. Первые особи появляются в конце сентября - первой половине октября. В зимний период эти птицы придерживаются преимущественно открытых мест равнинной и предгорной зоны. Чаще всего их можно встретить на полях и опушках леса, где зимует много мелких птиц. Зимующие дербники покидают республику в конце февраля - первой половине марта.

114. Степной дербник *Falco columbarius christiani-ludovici* Kleinschmidt

По данным Р.Л. Беме (1958), степной дербник является на Центральном Кавказе пролетно-зимующей птицей. Вполне возможно, что этот вид зимует в Кабардино-Балкарии, но мне его не приходилось наблюдать.

115. Обыкновенная пустельга *Falco tunninculus tunninculus* L.

В Кабардино-Балкарии пустельга является гнездящейся перелетной, частично зимующей птицей (фото 22). Судя по резкому увеличению ее численности, весенний пролет начинается с 2-й половины марта. В гнездовое время она заселяет как равнинную, так и предгорную зоны. В горах я неоднократно наблюдал пустельгу в июне, июле и августе в районе ледников Эльбрус, Безенги, Бечо и Шхельда.

Полные свежие кладки в республике можно находить, начиная с 1-й декады мая (9 мая 1960 г.), а более поздние – в 3-й декаде мая (25 мая 1960 г.). Всего в Кабардино-Балкарии я нашел 7 гнезд с полными кладками яиц и 4 гнезда с пуховичками. Из 11 гнезд пустельги заняли 6 гнезд сороки, 2 – серой вороны и 3 – грача. Всё это были прошлогодние гнезда. Вылупление птенцов я отмечал в 1959 г. – 10 июня, в 1960 г. – 12, 15 и 16 июня, а лётных молодых добывал 5 июля 1959 г. и 3 июля 1960 г. В Зоологическом институте АН СССР хранятся 2 птенца, добытые Л.Б. Беме 20 мая 1925 г. в Дагестане. Рулевые у них раскрыты на 22-23 мм. В такой ранний срок мне не приходилось наблюдать появления птенцов в Кабардино-Балкарии.

Основной пищей пустельги в Кабардино-Балкарии являются мышевидные грызуны. В желудках 15 экз., добытых как на равнине, так и в горах, оказались остатки полевых и лесных мышей, обыкновенной, общественной, кустарниковой и водяной полевки (фото 23). В горах я неоднократно наблюдал, как эта птица нападала на кекликов, но такие попытки всегда кончались безуспешно. Интересно отметить, что бывают случаи, когда в одном гнезде выводят своих птенцов пустельга и полевой воробей, причем пустельга совершенно не трогает своих "соседей". Так, 10 июня 1960 г. я нашел гнездо пустельги с 4 пуховичками. Птенцы сидели в старом сорочьем гнезде, от которого осталась только нижняя часть. Сбоку в этом же гнезде устроилась пара полевых воробьев. Они нормально вывели своих птенцов, которые покинули гнездо 20 июня.

Вес старого самца 200.2 г (добыт 22 июля 1960 г.), старой самки – 174.6 г (добыта 10 августа 1960 г.), молодого самца – 171.5 г (добыт 3 июля 1960 г.).

116. Степная пустельга *Falco naumanni* Fleischer

Относительно распространения степной пустельги на Кавказе М.Н. Богданов (1879) пишет: "Красная пустельга весьма обыкновенна на всем пространстве Кавказского края. Я встречал ее летом на равнинах по обе стороны Кавказского хребта и в горных лугах его, где она поднимается до 3000 м" (стр.43). По данным К.Н. Россикова (1884), степная пустельга в Кабардино-Балкарии является гнездящейся перелетной, частично зимующей птицей. Он добыл ее 10 декабря 1882 г. около г. Прохладного и наблюдал в январе и феврале 1883 г. в равнинной зоне. По наблюдениям Н.Я. Динника (1886), степная пустельга держится на Северном Кавказе приблизительно в тех же местах, где и обыкновенная. В Северной Осетии степная пустельга добыта один раз в период гнездования – 6 мая 1925 г. (Беме, 1926). В.Г. Гептнер (1926) наблюдал эту птицу в Кабардино-Балкарии как на равнине, так и в горах. Р.Л. Беме (1958) считает ее пролетной птицей на Центральном Кавказе.

По моим наблюдениям, степная пустельга встречается в Кабардино-Балкарии примерно в тех же местах, где и обыкновенная, но в горной зоне значительно реже, чем в равнинной. В горах я наблюдал ее гнездовой период преимущественно до высоты 1000-1300 м н.у.м. Весной она прилетает в конце февраля - первой половине марта (в 1958 г. – 28 февраля, в 1959 г. – 27 марта). В отдельные годы первые пролетные особи появляются в республике в первых числах апреля (5-8 апреля 1960 г.). Самую раннюю кладку в республике я обнаружил 10 мая 1953 г. в районе с. Ново-Ивановка. В гнезде было 2 яйца. Наиболее поздние кладки я находил 20 мая 1954 г. и 25 мая 1958 г. в районах с. Озрек и

Александровское. В Зоологическом институте АН СССР хранится молодая пустельга, добытая К.Н. Россиковым 22 августа 1882 г. около г. Прохладного.

Осенний пролет начинается с 2-й половины августа. Основная масса птиц покидает пределы республики в период с 20 августа по 15 сентября, хотя отдельные особи остаются до конца ноября. Зимой мне не приходилось наблюдать степной пустельги в Кабардино-Балкарии.

117. Обыкновенный кобчик *Falco vespertinus vespertinus* L.

По данным Э. Менетрие (1832), кобчик – редкая птица на Кавказе. В своей работе М.Н. Богданов (1879) указывает, что наблюдал кобчиков в августе в Ставропольском крае. Относительно распространения этого вида на Северном Кавказе Н.Я. Динник (1886) пишет: "На Северном Кавказе встречается почти всюду, но несравненно реже, чем другие близкие к нему виды соколов, как например, пустельга. Что касается больших высот, то он избегает их вовсе. На Северном Кавказе кобчик встречается весной, летом и осенью, зимой же он мне не попадался ни разу" (стр.360). Согласно Р.Л. Беме (1958), кобчик попадается на Центральном Кавказе в небольшом количестве на осеннем и весеннем пролете.

В Кабардино-Балкарии кобчик, по моим наблюдениям, встречается в гнездовое время в равнинной и, частично, в предгорных зонах. Весной он появляется в 2-й половине марта (в 1956 г. – 10 марта, в 1957 г. – 18 марта, в 1958 г. – 15 марта). Численность его по всей республике небольшая. С 1951 по 1960 г. я нашел всего 2 гнезда 10 июня 1956 г. в долине р. Терек около Мало-Кабардинской оросительной станции. В гнездах было по 4 слабо насиженных яйца. В этом же районе я наблюдал 8 пар (16 особей), но гнезд этих птиц не обнаружил. Судя по появлению кобчиков в горных ущельях, осенний пролет их начинается с 1-й половины сентября и продолжается до первых чисел ноября. Отдельные особи остаются зимовать в пределах республики. Я несколько раз добывал кобчика: 4 января 1956 г., 5 февраля 1958 г. 29 января 1960 г. Эти экземпляры хранятся в моей коллекции.

Небезынтересно отметить случай отложения яйца кобчиком в сентябре. 20 сентября 1956 г. я подстрелил одну самку. У нее было перебито левое крыло, и она осталась жива. Я взял птицу домой, и 23 сентября она снесла яйцо значительно меньше нормальной величины (26,5×22 мм) и совершенно белого цвета. Обычно же яйца кобчика охристого цвета с густо расположенными ржаво-бурыми пестринами, более яркими, чем у пустельги. Упомянутое яйцо находится в моей коллекции.

118. Среднеевропейский тетеревятник *Accipiter gentilis gentilis* L.

Этот подвид ястреба встречается в Кабардино-Балкарии в небольшом количестве во время сезонных миграций и на зимовке. Один экземпляр добыт мной 20 октября 1959 г. в районе с. Аргудан, а другой – 4 января 1960 г. около с. Нижний Черек.

119. Западносибирский тетеревятник *Accipiter gentilis buteoides* Menz.

Р.Л. Беме (1958) указывает на случай залета этой птицы в ноябре 1953 г. в Северную Осетию, когда был добыт молодой самец около с. Эммаус.

120. Кавказский тетеревятник *Accipiter gentilis caucasicus* Kleinschmidt

Кавказский тетеревятник встречается в Кабардино-Балкарии в период гнездования преимущественно в предгорной и горной зонах и совершает кормовые кочевки как летом, так и зимой. В зимний период его часто можно видеть в равнинной и предгорной зонах, а летом – за десятки километров от мест гнездования. Так, я часто наблюдал летом тетеревятника в равнинной зоне, но ни разу не обнаружил гнезда ниже 500 м н.у.м.

Полные свежие кладки тетеревятников в Кабардино-Балкарии я находил, начиная с 2-й половины мая (в 1955 г. – 16 мая, в 1956 г. – 14 мая, в 1957 г. – 17 мая, в 1958 г. – 18 мая, в 1959 г. – 20 мая). В 1960 г. я нашел гнездо с 4 насиженными яйцами 22 мая в сосновом лесу около с. Тегенекли (район Эльбруса). Гнездо было построено на сосне, на высоте 10 м от земли. Размеры яиц: 41,6×56,0; 41,7×54,6; 41,7×54,6; 41,5×x55,0 мм. Вес яйца (4): 30-33 г. В этом гнезде первый птенец, весом 30,750 г. вылупился 8 июня. В том же районе 15 июня 1960 г. лесники разорили гнездо тетеревятника с 4 птенцами 4-5-дневного возраста, потому что птицы унесли на корм своим птенцам 6 цыплят. Гнездо было построено на сосне, на высоте 15 м от земли. Вероятно, наши данные относительно срока кладки яиц не являются предельно ранними, так как Р.Л. Беме (1958) указывает на нахождение Н. Волчановым свежих яиц 22 и 24 апреля в районе Кисловодска.

121. Перепелятник *Accipiter nisus nisus* L.

Этот вид широко распространен в Кабардино-Балкарии. В период гнездования численность его в равнинной и предгорной зонах значительно выше, чем в горной. Количество птиц резко возрастает во время осеннего пролета, когда в республику прилетает много перепелятников, "сопровождающих" мелких птиц. Особенно велико их число во время пролета перепела, в сентябре. Если в период гнездования перепелятник

придерживается лесной чащи, то во время осеннего пролета его часто можно наблюдать и на открытых местах, где он преследует пролетных птиц.

Полные свежие кладки я обычно находил в 2-й декаде мая (в 1951 г. – 16 мая, в 1952 г. – 12 мая, в 1955 г. – 20 мая, в 1957 г. – 10 мая). Наиболее поздние свежие кладки обнаружены мною 25 мая 1959 г. В 2 кладках было по 5 яиц, а в 4 – по 3 яйца.

Зимой чаще всего перепелятника можно встретить около зернохранилищ, на лесных опушках, кукурузных полях, где на зиму остаются неубранные стебли на корм скоту, а также по речным долинам и глухим балкам, заросшим сорняками. Именно в таких местах держится особенно много мелких птиц (воробьиных), которыми, в основном, и питается перепелятник. В летнее время я часто наблюдал, как перепелятник нападает на птенцов домашних птиц и уносит их.

122. Европейский тювик *Accipiter badius brevipes* Sev.

Тювик в Кабардино-Балкарии – обычная птица. На осеннем пролете он держится в равнинной и предгорной зонах, а также в широких долинах горной зоны. В период гнездования он встречается в небольшом количестве в лесах равнинной зоны республики. Мне удалось обнаружить всего 2 гнезда этой птицы. Первое – с 4 свежими яйцами я нашел 20 мая 1954 г. в припойменном лесу около с. Черная Речка к северо-востоку от Нальчика, а второе – с 3 свежими яйцами было найдено студентами Кабардино-Балкарского университета 20 мая 1959 г. в равнинной зоне около с. Приближное.

Появление первых тювиков весной в пределах республики я отмечал в 1955 г. – 2 мая, в 1956 г. – 14 мая, в 1957 г. – 18 апреля, в 1958 г. – 15 апреля, в 1959 г. – 20 апреля, в 1960 г. – 17 апреля. Судя по появлению этих птиц в долинах горной зоны, осенний пролет их происходит с первых чисел сентября до первых чисел октября. Отдельные особи задерживаются до конца 1-й декады ноября (в 1955 г. – до 10 ноября, в 1957 г. – до 8 ноября, в 1958 г. – до 9 ноября).

123. Полевой лунь *Circus cyaneus cyaneus* L.

Согласно наблюдениям М.Н. Богданова (1879), этот вид попадается довольно часто в степях Ставропольского края, а также по Тереку и Кубани. Относительно распространения его в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) пишет: "Полевой лунь остается зимовать, но не каждый год. Так, в зиму 1882-83 г. я его вовсе не наблюдал, в зиму 1881-82 г. полевой лунь встречался почти ежедневно. В 1883 г., как видно, он остался зимовать, так как в предыдущем году в 2-й половине декабря я его нигде не видел. Живет полевой лунь одиноко, исключительно придерживаясь степи и равнины. Осенний пролет в конце сентября" (стр.41).

По данным Н.Я. Динника (1886), полевой лунь прилетает на Северный Кавказ в начале апреля, нередко в марте. Гнездо он устраивает в бурьяне, осоке или камыше, растущем на сухом месте. В начале мая в гнездах попадаются еще совсем не насиженные яйца. Л.Б. Беме (1926) указывает на нахождение свежих яиц этого луня в 10-х числах мая в Северной Осетии недалеко от г. Владикавказа. Молодых птиц он встречал 10 июля 1920 г. Р.Л. Беме (1958) приводит случай нахождения 3 июня 1924 г. Н. Волчановым гнезда с 4 слабо насиженными яйцами – около г. Пятигорска. В.Г. Иванов и С.П. Чунихин (1959) отрицают нахождение полевого луня в Кабардино-Балкарии в гнездовое время и считают его исключительно зимующей птицей.

Мои наблюдения не подтверждают выводов последних авторов. Я присоединяюсь к мнению Л.Б. и Р.Л. Беме, так как неоднократно наблюдал и добывал полевых луней в гнездовое время на территории Кабардино-Балкарии. В моей коллекции имеются экземпляры, добытые 10 июня 1954 г., 7 мая 1960 г. и 8 июня 1960 г. Определения подтверждены сотрудниками Зоологического института АН СССР К.А. Юдиным и Л.А. Портенко. Может возникнуть вопрос, не встречаются ли в летнее время в Кабардино-Балкарии только холостые самцы и самки, а также неполовозрелые молодые особи; однако добытые мной птицы оказались старыми, с хорошо развитыми семенниками (7 мая) и яичниками (8 июня). Кроме того, у 1 экз., добытого 10 июня, хорошо было выражено наседное пятно. К работам К.Н. Россикова и Н.Я. Динника, которые считают, что полевые луни изредка зимуют на Северном Кавказе, могу добавить, что в Кабардино-Балкарии эти птицы зимуют регулярно и в довольно большом количестве.

124. Луговой лунь *Circus pygargus* L.

Луговой лунь в Кабардино-Балкарии является гнездящейся перелетной, частично зимующей птицей. Весенний пролет начинается с 2-й половины апреля: в 1955 г. – 10 апреля, в 1956 г. – 15 апреля, в 1957 г. – 14 апреля, в 1958 г. – 17 апреля. В гнездовое время численность вида в равнинной зоне значительно выше, чем в предгорной. В горах я наблюдал его только на осеннем пролете в сентябре - октябре.

В Кабардино-Балкарии луговой лунь заселяет сырые луга, высохшие и заросшие камышами и тростниками болота, поля с густыми зарослями сорняков. Вскоре после прилета начинаются брачные полеты. Наиболее усиленные брачные игры я наблюдал в 1960 г. с 28 апреля по 5 мая. В предыдущие годы (1957-1968 гг.) такие игры начинались с 20 апреля.

К постройке гнезд птицы приступают с 1-й декады мая. Гнездо

они делают довольно просто: самки* натаскивают сухие стебли соломы, травы, камыша и т.д. и кладут их в небольшие естественные углубления или просто на ровную площадку в соответствующих биотопах. Состав гнездостроительного материала зависит от места, где строится гнездо. Обычно самка собирает этот материал поблизости от будущего гнезда. К кладке луговые луни приступают в 1-й половине мая. Самая ранняя кладка отмечена в 1955 г. – 8 мая, в 1956 г. – 9 мая, в 1957 г. – 7 мая, в 1958 г. – 11 мая, в 1959 г. – 13 мая, в 1960 г. – 15 мая. Наиболее поздние свежие кладки я находил в 1957 г. – 20 мая, в 1958 г. – 19 мая, в 1959 г. – 17 мая, в 1960 г. – 2 июня. Количество яиц в кладках неодинаково в разные годы. В гнездах, найденных в 1955-1959 гг. было по 3-5 яиц, а в 1960 г. в 2 гнездах – по 1 яйцу. Видимо, это связано с численностью мышевидных грызунов, которая в 1960 г. в Кабардино-Балкарии была очень низка. Это подтверждается также данными Кабардино-Балкарской санэпидемстанции.

Питание птиц этого вида изучалось по содержимому 15 желудков и зобов, а также по остаткам пищи, собранным у 20 гнезд. Результаты анализа показали, что в мае в составе пищи преобладали ящерицы (прыткая ящерица) (80%), в июне и июле стало попадаться много мышевидных грызунов (70%). В двух случаях были найдены остатки мелких птиц – обыкновенной овсянки и хохлатого жаворонка. У 2 экз., добытых 25 декабря 1958 г. и 4 января 1960 г., в желудках оказались исключительно остатки мелких птиц (вьюрка, щегла и зеленушки).

125. Степной лунь *Circus macrourus* S.G. Gmelin

По данным М.Н. Богданова (1879), степной лунь – весьма обыкновенная птица в степях вдоль Терека и Кубани, а также в Ставропольском крае. Согласно наблюдениям Н.Я. Динника (1886), степной лунь в пределах Северного Кавказа является гнездящейся перелетной птицей. По данным В.Г. Гептнера (1926), степной лунь встречается нередко в районе с. Атажукино (Заюково), а особенно часто около г. Нальчика. 5 августа 1926 г. около с. Заюково он наблюдал, кроме молодых одиночек, и неразбившиеся выводки. Р.Л. Беме (1958) считает степного луня пролетной птицей на Центральном Кавказе. В работе В.И. Иванова и С.П. Чунихина (1959) степной лунь отмечен также как пролетная птица в пределах Кабардино-Балкарии.

По моим наблюдениям, степной лунь встречается в республике в гнездовой период и в небольшом количестве зимует (21 января 1959 г. добыт старый самец). Основная масса этих луней наблюдается на осен-

---

* Я не наблюдал, чтобы самцы принимали участие в постройке гнезд.

них и весенних пролетах. Весенний пролет проходит с 1-й половины апреля до 2-й декады мая. Осенний пролет начинается с 1-й декады августа и продолжается до конца сентября. Пролетные луни отмечены мной в 1958 г. – 19 сентября, в 1959 г. – 21 сентября, в 1960 г. – 26 сентября.

Хотя я неоднократно наблюдал и добывал в гнездовое время в Кабардино-Балкарии степного луня, однако его гнезда мне найти не удалось.

126. Болотный лунь *Circus aeruginosus aeruginosus* L.

Болотный лунь в Кабардино-Балкарии является гнездящейся пролетной птицей. Весной он прилетает в конце марта - первой половине апреля. Появление первых болотных луней я отмечал в 1952 г. – 2 апреля, в 1953 г. – 27 марта, в 1954 г. – 4 апреля, в 1955 г. – 6 апреля, в 1956 г. – 27 марта, в 1957 г. – 1 апреля, в 1958 г. – 7 апреля, в 1959 г. – 26 марта и в 1960 г. – 23 апреля. В период гнездования он заселяет сырые луга и болота, заросшие камышами на высоте 200-300 м н.у.м.

Основная масса гнездящихся особей этого вида в летний период сосредоточена в районах с. Приближное, Екатериноградское, Александровское, Черек, Урожайное и Плановское. К строительству гнезд луни приступают с 2-й половины апреля (в 1957 г. – 20 апреля, в 1958 г. – 25 апреля) гнезда строят они, в основном, над водоемами, глубина которых не превышает 1 м. В редких случаях луни устраивают гнезда на сухих площадках, что я наблюдал 14 мая 1959 г.

Полные свежие кладки я обычно находил, начиная с 2-й половины мая: в 1953 г. – 14 мая, в 1954 г. – 16 мая, в 1955 г. – 15 мая, в 1956 г. – 26 мая, в 1957 г. – 19 мая, в 1958 г. – 23 мая, в 1959 г. – 5 июня и в 1960 г. – 10 июня. Появление летных птенцов наблюдалось, как правило, с 2-й декады июля. В некоторых случаях они встречались и раньше (8 июля 1958 г.). В 1980 г. в районе с. Приближное я нашел четыре гнезда, в каждом из которых было по четыре птенца. Интересно отметить, что во всех гнездах птенцы поднялась на крылья 19 июля. Вылетевшие птенцы до 25 июля держались поблизости от гнезда, и их кормили родители. Гнезда были построены прямо на болоте, заросшем камышом, в 100-200 м от берега, причем исключительно на камыше.

Осенний пролет болотных луней в Кабардино-Балкарии начинается с 3-й декады августа и продолжается до 1-й декады ноября. Один болотный лунь был добыт зимой (1 февраля 1953 г.) около с. Вакадзухо, в долине р. Аргудан. Вес старой самки, добытой 23 июля 1960 г., – 698,2 г, а молодой, добытой в тот же день, – 666,0 г.

В составе пищи болотного луня в Кабардино-Балкарии большой процент занимают мышевидные грызуны и лягушки. Это наблюдается в

основном в тех районах, где гнездовые места болотных луней отдалены на значительное расстояние от населенных пунктов (с. Александровское, Аргудан, Нижний Черек), но в таких районах, как с. Приближное в Екатериноградское, где птицефермы находятся буквально в нескольких десятках метров от места гнездования болотных луней, последние приносят существенный вред птицеводству. Так, с 16 по 25 июля 1960 г. я нашел несколько гнезд этих луней в районах с. Приближное и Екатериноградское. В каждом гнезде (или около гнезда) было от 7 до 12 куриных или утиных лап, всего 78. Если бы мы проследили за этими птицами от начала кормления птенцов до их вылета из гнезда, то, я уверен, наши цифры возросли бы в несколько раз. Следует учесть также, что за последние годы количество птицеферм в каждом колхозе республики сильно возросло, и строятся они, по возможности, вблизи озер, болотистых мест или искусственных водоемов (особенно утиные фермы), т.е. в тех местах, где сосредоточена в гнездовое время основная масса болотных луней. И вряд ли вред, приносимый лунями птицеводству, компенсируется уничтожением мышевидных грызунов

127. Черный коршун *Milvus korschun korschun* Gmelin

В Кабардино-Балкарии черный коршун является гнездящейся перелетной птицей. Появление первых коршунов весной в республике отмечено мною в 1953 г. – 20 марта, в 1954 г. – 25 марта, в 1955 г. – 12 марта, в 1956 г. – 19 марта, в 1957 г. – 7 апреля, в 1958 г. – 28 марта. В гнездовое время коршун заселяет лиственные леса равнинной и, частично, предгорной зоны. Вскоре после прилета птицы начинают весенние игры и приступают к гнездостроению.

Обычно я находил полные свежие кладки, начиная с 1-й декады мая: в 1956 г. – 10 мая, в 1957 г. – 8 мая, 1958 г. – 7 мая. Наиболее поздние свежие кладки я обнаружил 15 и 26 мая 1960 г., 7 июня того же года нашел гнездо с двумя слабо насиженными яйцами. Гнездо было построено на тополе, на высоте 10 м от земли, сделано из веток ивы и тополя и выложено внутри мягкими лубяными волокнами. Под постилкой было муравьиное гнездо с огромным количеством муравьев. Во всех других гнездах лотки были выложены всевозможным материалом – шерстью, тряпками, бумагой, ватам, шнурками и др. Размеры яиц (20) 55-56×42-46 мм. Вес (10) яиц 52-57 г. Судя по нахождению Н. Волчановым 1 мая около г. Пятигорска насиженных яиц (Р.Л. Беме, 1958), черные коршуны приступают к кладке яиц на Северном Кавказе значительно раньше указанных мною сроков.

С 3-й декады июля коршуны объединяются в стаи. Судя по появлению этих птиц в горной зоне и резкому увеличению их количества в

равнинной и предгорной зонах, осенний пролет начинается с 1-й декады сентября и продолжается до конца октября. Отдельные небольшие стаи встречаются до последних чисел ноября (в 1956 г. – 20 ноября, в 1957 г. – 25 ноября, в 1958 г. – 22-28 ноября). Численность пролетных особей значительно выше осенью, чем весной. Весной я только один раз наблюдал большую стаю до 400 особей (7 апреля 1957 г.), тогда как осенью такие стаи встречаются часто (в 1956 г. – 10 сентября, в 1957 г. – 19-20 сентября, в 1960 г. – 25 сентября).

У добытых мною в июле и сентябре 6 экз. черного коршуна в желудках и зобах оказались исключительно остатки мышевидных грызунов. В желудке 1 экз., добытого в августе 1960 г. в районе с. Пролетарское, были обнаружены 3 черепа обыкновенной полевки и нижняя челюсть большого тушканчика.

128. Красный коршун *Milvus milvus milvus* L.

По данным К.А. Сатунина (1907), красный коршун гнездится в приречных лесах дельты Терека. Л.Б. Беме (1926) указывает, что им были добыты 2 экз. этого вида в Северной Осетии в сентябре 1897 и 1917 гг. В Кабардино-Балкарии я наблюдал красного коршуна 2 раза – 4 мая 1957 г. и 25 сентября 1960 г. в долине р. Терек.

129. Орлан-белохвост *Haliaeetus albicilla albicilla* L.

Относительно распространения орлана-белохвоста в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) пишет: "Белохвост осень и начало зимы проводит больше вблизи предгорий, в западных частях речных долин Малки, Баксана и Куры, где в это время года бывает сосредоточение овечьих отар и лошадиных табунов. В конце ноября к местным неделимым присоединяются прилетающие с севера. Сосредоточение пищи близ человеческих жилищ заставляет белохвоста в январе и феврале держаться в рощах и садах у станиц и аулов, расположенных в долине р. Малки. Живут белохвосты всегда парами, реже одиноко, на корме собираются по 8-10 неделимых. В начале марта белохвосты, прилетавшие на зиму, постепенно отодвигаются к северу" (стр.18).

Н.Я. Динник (1886) также считает орлана-белохвоста оседлой птицей на северном Кавказе. По данным А.С. Ефимцевой и Е.Н. Яценко (1935), этот орлан является оседлой птицей в Кабардино-Балкарии и гнездится на равнинной зоне. Я наблюдал орлана-белохвоста в республике только в зимний период: в 1957 г. – 10 января, в 1958 г. – 2 февраля, в 1959 г. – 2-4 января и в 1960 г. – 10 февраля.

130. Орлан-долгохвост *Haliaeetus leucoryphus* Pall.

М.Н. Богданов (1879) наблюдал орлана-долгохвоста один раз в конце сентября в дельте Терека. К.Н. Россиков (1884) отмечал эту птицу в Кабардино-Балкарии в декабре и январе 1881-1882 гг. в степи на стогах. Н.Я. Динник (1886) указывает на нахождение гнезда этого орлана недалеко от г. Ставрополя. Л.Б. Беме (1926) сообщает, что добывал орланов-долгохвостов в Северной Осетии в ноябре 1910 и 1911 гг. В Кабардино-Балкарии я наблюдал этого орлана всего один раз – 2 января 1960 г. в районе с. Аргудан.

131. Обыкновенный стервятник *Neophron percnopterus percnopterus* L.

Относительно распространения стервятника в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) писал: "Стервятник на равнине и в степи обыкновеннее ягнятника и чернобурого грифа, но реже белоголового грифа. Осенью вообще редок в описанном пространстве, между тем как в предгорной полосе Кабардино-Балкарской равнины встречается в это время ежедневно. В конце декабря он слетается к речным долинам Малки и др. и держится исключительно вблизи аулов, станиц и хуторов, словом, где только возможно предполагать присутствие падали… Время пребывания до конца февраля" (стр.31). По данным Г.И. Радде (1885), стервятник на Кавказе является гнездящейся перелетной, частично зимующей птицей. Н.Я. Динник (1886) наблюдал его на Северном Кавказе только в гнездовое время. Р.Л. Беме (1958) также считает стервятника гнездящейся перелетной птицей на Центральном Кавказе.

По моим наблюдениям, в Кабардино-Балкарии эта птица является гнездящейся перелетной и частично зимующей птицей. В гнездовое время стервятник заселяет скальные участки горной зоны, а зимой спускается в предгорную и равнинную зоны, где держится до первых чисел марта. В зимний период чаще всего я наблюдал этих птиц около мясокомбината (г. Нальчик) и поблизости от овцеводческих ферм.

Численность стервятника по всей республике небольшая; основная масса гнездящихся особей сосредоточена в северо-западной части (Зольское пастбище). В гнездовой период в поисках пищи они совершают довольно значительные кочевки, во время которых их можно видеть в долинах рек до высоты 500-600 м н.у.м.

Не территории республики я нашел всего три гнезда стервятника. Первое было найдено 4 июня 1954 г. в Верхней Балкарии, в районе с. Мухол. В гнезде было одно слабо насиженное яйцо. Второе гнездо – с двумя сильно насиженными яйцами – я обнаружил 25 июня 1954 г. в Хуламском ущелье, в районе с. Безенги, а третье – с двумя яйцами – 26 июня 1959 г. в долине р. Баксан, около алебастрового завода. Р.Л.

Беме (1958) указывает на нахождение Н. Волчановым гнезда стервятника с двумя сильно насиженными яйцами 15 июля 1923 г. около г. Пятигорска. Только что покинувший гнездо молодой стервятник был добыт в Северной Осетии 18 июля 1921 г. (Л.Б. Беме, 1926).

132. Обыкновенный белоголовый сип *Gyps fulvus fulvus* Hablizl

По данным М.Н. Богданова (1879), белоголовый сип очень обыкновенная птица на всем пространстве Кавказского края. Относительно распространения этого грифа в Кабардино-Балкарии К.Н. Россиков (1884) писал: "Белоголовый гриф раньше предыдущих (других грифов) видов покидает область гор и водворяется на плоскости. Уже в начале ноября в степях на стогах очень часто попадаются белоголовые грифы… Время пребывания на плоскости: ноябрь, декабрь, январь и даже половина февраля. В 1882 г. я его наблюдал стадами до первых чисел марта. Живет осень и зиму белоголовый гриф стадами в 5-10 неделимых, реже больше" (стр.31).

В настоящее время численность белоголового сипа в Кабардино-Балкарии невелика, и гнездящиеся особи сосредоточены в северо-западной части горной зоны республики, где в основном сконцентрированы скотоводческие фермы. Я нашел всего одно гнездо этого сипа с двумя пуховыми птенцами 5 июня 1954 г. в районе с. Безенги, которое было построено на уступе высокой скалы.

О размножении белоголового сипа Н.Я. Динник сообщает следующее: "Яйца они кладут, вероятно, очень рано, так как, несмотря на несомненно продолжительное насиживание и медленный рост птенцов, в июне, как я сам мог убедиться, встречаются молодые грифы уже весьма большого роста и со вполне развитым оперением" (стр.355). По данным Л.Б. Беме (1926), в середине июня 1915 г. в Северной Осетии в гнездах сипов на горе Адай-Хох были молодые, которых кормили старики.

133. Черный гриф *Aegypius monachus* L.

Этот гриф в Кабардино-Балкарии встречается в небольшом количестве в горной полосе. С 1-й декады декабря по 3-ю декаду февраля его можно видеть в равнинной и предгорной зонах, а затем он возвращается на место гнездования. Срок пребывания этих птиц на равнине зависит от характера зимы. В теплые зимы черные грифы возвращаются в горную зону с конца января (1959-1960 гг.), в холодные – в последних числах февраля (1954-1958 гг.).

Хотя нельзя сказать, что черные грифы очень редкие птицы в Кабардино-Балкарии, тем не менее, за период 1951-1960 гг. удалось найти всего 2 гнезда. Первое гнездо я нашел 5 мая 1954 г. в Черекском ущелье, на

самой верхней границе леса. Гнездо было построено на старом высоком буковом дереве; в нем было одно яйцо. Второе гнездо я обнаружил 20 июня 1959 г. в районе с. Былым, на отвесной скале; в гнезде было два яйца.

В 1959 г. в районе Эльбруса я узнал от одного лесника-балкарца, что в верховье р. Ирик он наблюдал в течение 5 лет пару черных грифов, гнездившихся ежегодно на одной большой сосне. По его словам, в середине мая он обычно находил в гнезде одно яйцо, а в конце июля птенец достигал размеров взрослой птицы. Л.Б. Беме (1926) нашел гнездо с одним птенцом в мае 1915 г. в Северной Осетии*.

134. Бородач, или ягнятник *Gypaetus barbatus aureus* Hablizl

По данным К.Н. Россикова (1884), "ягнятник, одна из самых редких птиц альпийской полосы, Кавказского хребта; вылетает из области гор на плоскость в 2-й половине ноября, где так же, как и в горах, редок и чрезвычайно трудно поддается наблюдениям" (стр.29). Н.Я. Динник (1886), наоборот, считает ягнятника одной из самых обычных птиц в горах Кавказа и пишет, что ни разу не наблюдал ее на плоскости. По его данным, в гнездовое время этот вид чаще всего попадается в районах Эльбруса, Безенги, Казбека и Бермамыта.

Мои наблюдения подтверждают данные К.Н. Россикова. Численность этого вида в республике в настоящее время невелика; зимой (декабрь - январь) его можно встретить в равнинной и предгорной зонах. Я наблюдал этих птиц в равнинной и предгорной зонах 18 декабря 1954 г., 2 января 1955 г., 25 января 1957 г. и 10 декабря 1958 г. Хотя я неоднократно встречал ягнятника в период гнездования в районах с. Хабаз, Эльбрус, Былым, Безенги, Мухол, однако его гнезда найти так и не удалось.

135. Орёл-беркут *Aquila chrysaetos chrysaetos* L.

Л.Б. Беме (1926) наблюдал орла-беркута в Северной Осетии в ноябре-декабре и 24 марта 1924 г. По данным Р.Л. Беме (1958), на Центральном Кавказе он является регулярно залетной птицей осенью, зимой и ранней весной. В Кабардино-Балкарии с 1951 по 1924 г. мне [не] удалось добыть этот подвид беркута, но, возможно, бывают случаи его залета в республику.

---

* Гнездование на отвесных скалах для черного грифа вовсе не характерно. Сейчас в районе с. Былым на скалах находится большая колония белоголовых сипов. Очевидно, гнездо на скале, найденное там автором, принадлежало не грифу, а сипам. Дополнительные комментарии по данному виду в Кабардино-Балкарии – см.: Аккиев, Белик, 2016. Гнездование черного грифа в Кабардино-Балкарском заповеднике // Стрепет, т.14, вып.1-2.- С.206-209 (прим. ред.).

136. Южноевропейский орёл-беркут *Aquila chrysaetos fulva* L.

Первые сведения о находках этого орла-беркута на Кавказе мы находим в работах А. Нордмана (1840), Г.И. Радде (1873), М.Н. Богданова (1879), К.Н. Россикова (1884), Н.Я. Динника (1886), Ф.К. Лоренца (1887), но в них очень мало сведений о характере пребывания этого вида на Кавказе. М.Н. Богданов писал: "Пребывание там беркута, впрочем, весьма возможно по местным условиям…" (стр.38). Г.И. Радде (1873) наблюдал в Ахалцихе (Грузия) прирученный экземпляр этого хищника. В другой работе Г.И. Радде (1885) сообщает, что неоднократно встречал эту птицу в горах Армении. К.Н. Россиков (1884) несколько рез видел этого орла-беркута в декабре 1883 г. в равнинной зоне Кабардино-Балкарии. Н.Я. Динник (1886) наблюдал его около г. Ставрополя 25 января 1881 г. и 3 января 1884 г. Ф.Н. Лоренц добыл одну самку в марте 1884 г. около г. Кисловодска.

Сведения о находках этого вида на Северном Кавказе в гнездовое время мы встречаем в работах Л.Б. Беме (1926) и В.Г. Гептнера (1926). Л.Б. Беме наблюдал беркутов в летнее время около с. Казбек, Коби (Грузинская ССР) и с. Цей (Северная Осетия). В.Г. Гептнер пишет, что в течение ряда дней несколько беркутов постоянно держались около с. Орзоковское (Былым), и предполагает, что среди них был еще неразбившийся выводок.

В Кабардино-Балкарии беркут является оседлой птицей. В гнездовое время он заселяет горную зону на высоте 1000-2000 м н.у.м. Зимой особей этого вида можно наблюдать в предгорной и равнинной зонах. В целом численность их по всей республике невелика. Основная масса гнездящихся птиц сосредоточена в долинах рек Малка, Баксан, Чегем, Хулам и Черек. Чаще всего я встречал беркутов в долинах рек Баксан (около с. Былым) и Хулам (около с. Безенги). Вероятно, это происходит потому, что в этих районах обитает большое число сусликов, являющихся, видимо, основным кормом этих птиц.

Данных о размножении беркутов у меня мало. Я нашел всего одно гнездо 15 августа 1960 г. в Хуламском ущелье, в районе с. Усхур. В гнезде было 2 птенца, которые по размерам не отличались от взрослых птиц. Они часто покидали гнездо и летали вместе с родителями. 20 августа одна из взрослых птиц принесла в гнездо зайца-русака, и молодые ели его на уступе скалы. В желудке у добытого 24 августа 1960 г. беркута были остатка сусликов и водяных полевок.

137. Орёл-могильник *Aquila heliaca heliaca* Savigny

Относительно распространения этого орла М.Н. Богданов (1879) писал: "На основании собственных наблюдений я утверждаю, что кара-

гуж* гнездится по долине Терека и его притокам на Кумыкской плоскости. В области гор ни разу не встречал его. Зимует ли он здесь – неизвестно" (стр.39).

По данным К.Н. Россикова (1884), часть могильников остается зимовать в Кабардино-Балкарии, питаясь исключительно теплокровными животными – зайцами, лисицами и куропатками. О зимовке могильников на Северном Кавказе имеются указания и в работе Н.Я. Динника (1886). Согласно наблюдениям Р.Л. Беме (1958), орел-могильник на Центральном Кавказе является гнездящейся перелетной птицей и в гнездовое время встречается в самой северной части предгорий.

Мои наблюдения подтверждают данные К.Н. Россикова и Н.Я. Динника, но в отличие от их наблюдений мне чаще всего приходилось встречать этого орла в горной зоне, от 1000 м н.у.м. до самой верхней границы субальпийского и альпийского поясов.

Зимой численность орла-могильника значительно меньше, чем в гнездовое время. В Зоологическом институте АН СССР хранится 1 экз., добытый К.Н. Россиковым 26 января 1883 г. около г. Прохладного. Я добывал этих птиц 2 января 1956 г., 20 февраля 1957 г. и 24 января 1960 г. в районах с. Аргудан, Нижний Черек и Александровское. Зимой эти хищники держатся на открытых полях, по опушкам леса и речным долинам, где обычно много зимующих птиц и мелких млекопитающих. Судя по резкому увеличению численности особей, весенний пролет начинается с 1-й декады марта. Пролетных птиц я наблюдал: в 1954 г. – 8 марта, в 1955 г. – 2 марта, в 1956 г. – 9 марта и в 1957 г. – 10 марта.

Н.Я. Динник (1886) указывает, что нашел 2 гнезда орла-могильника. Одно – с 2 свежими яйцами – 21 марта около г. Ставрополя и второе – с 2 сильно насиженными яйцами – 22 апреля. По данным Р.Л. Беме (1958), Н. Волчанов нашел 3 гнезда: одно – с одним свежим яйцом – 15 апреля 1924 г. около г. Пятигорска; второе – с 2 свежими яйцами 22 апреля 1924 г. и третье – с 1 свежим яйцом – 11 мая 1924 г. В Кабардино-Балкарии свежие кладки я находил, начиная с 3-й декады апреля до 1-й декады мая (в 1955 г. – 22 апреля, в 1956 г. – 4 мая, в 1957 г. – 2 мая и в 1958 г. – 25 апреля).

8 июля 1960 г. я обнаружил гнездо орла-могильника с одним 5-6-дневным пуховичком в Баксанском ущелье, в районе с. Верхний Баксан (фото 24). Гнездо находилось на большой сосне, на высоте 10 м от земли (фото 25), на самой верхней границе соснового леса. Оно было построено из веток сосны и не имело подстилки. Самка и самец кормили птенца сусликами. Второе гнездо с двумя 7-8-дневными пуховичками я

* Орел-могильник.

нашел в районе с. Эльбрус, на самой верхней границе соснового леса, на северном склоне долины р. Баксан 9 июля 1960 г. Гнездо находилось на развилке раскидистой сосны, на высоте 6 м от земли. И в этом гнезде родители кормили птенцов сусликами, которых ловили на южном склоне горы около с. Эльбрус.

Я неоднократно наблюдал в Баксанском ущелье орлов-могильников, охотившихся за сусликами, в мае, июне, июле 1959-1960 гг. в районах с. Былым (900 м н.у.м.), Верхний Баксан (1500 м) и Эльбрус (1800 м). Эти хищники часто нападают на домашних птиц, притом довольно удачно. Так, 30 марта 1956 г. Моламусов Хамаус отстрелял 1 могильника, который держал в лапах курицу*. 1 сентября 1959 г. я добыл 1 молодую самку в районе с. Аргудан, на опушке леса. Желудок ее и зоб были наполнены куриным мясом, в зобе было 600 г, а в желудке 200 г. Судя по количеству конечностей (4 лапы), она съела 2 курицы. Вес этой самки был равен 4 кг.

138. Степной орёл *Aquila rapax orientalis* Cabanis

По данным Р.Л. Беме (1958), степной орел встречается на Центральном Кавказе во время осеннего и весеннего пролетов (в 1947 г. – 24 октября; в 1958 г. – 10 марта). А.С. Ефимцев и Е.Н. Яценко (1935), которые обработали коллекционный материал А.М. Радищева**, пишут, что степной орел встречается в большом количестве на территории Малой Кабарды. В Зоологическом институте АН СССР имеются экземпляры, добытые 4 августа 1882 г. и 4 февраля 1883 г. около г. Прохладного (К.Н. Россиков), 16 октября 1882 г. около г. Кисловодска (Ф.К. Лоренц), 26 сентября 1916 г. и 10 июля 1917 г. около г. Владикавказа (Л.Б. Беме). В Кабардино-Балкарии я наблюдал степных орлов в 1955 г. – 2 мая, в 1956 г. – 4 мая и 10 сентября, в 1957 г. – 15 октября, в 1958 г. – 25 мая и 8 июня, а в 1959 г. – 23 марта.

Литературные источники и мои наблюдения, позволяют предположить, что степные орлы гнездятся в небольшом количестве в самой северо-восточной части республики, на границе со Ставропольским краем, а также к востоку от с. Хамидие. В этих районах я встречал степных орлов как летом, так и на пролете, но ни разу мне не удалось обнаружить их гнезда.

139. Большой подорлик *Aquila clanga* Pall.

В многочисленной орнитологической литературе, посвященной Кавказу, большой подорлик отмечен как гнездящаяся птица (Г.И. Радде,

---

* Могильник успел оторвать у курицы голову и проглотить ее.

** А.М. Радищев собирал материал в Кабардино-Балкарии.

1885; Н.Я. Динник, 1886; К.А. Сатунин, 1912; Л.Б. Беме, 1926). Относительно характера пребывания этого вида в горной части северо-западного Кавказа Ю.В. Аверин и А.А. Насимович (1938) сообщают: "… наблюдается в значительном количестве летом от пояса широколиственных лесов до альпийских лугов. Гнездятся, очевидно, в поясе хвойных, так как и на альпийских лугах встречается чаще всего в июне и июле. На пролете обычен" (стр. 41).

По данным Р.Л. Беме (1958), этот вид наблюдается на Центральном Кавказе во время осенних и весенних пролетов. Автор указывает, что встречал эту птицу около г. Владикавказа 20 сентября 1947 г. и 12 марта 1948 г. Л.А. Портенко (1958) считает большого подорлика на Кавказе пролетно-зимующей птицей. В Зоологическом институте АН СССР имеются экземпляры, добытые 24 апреля 1884 г. в долине р. Малки (К.Н. Россиков), 1 июня 1888 г. на Северном Кавказе (Ф.К. Лоренц), 2 марта 1914 г., 21 сентября 1915 г., 1 и 14 октября 1924 г. в районе г. Владикавказа (Л.Б. Беме).

В Кабардино-Балкарии я наблюдал большого подорлика в 1952 г. – 4 мая, в 1958 г. – 10 мая, в 1954 г. – 7 апреля, в 1956 г. – 15 сентября, в 1960 г. – 20 октября, но гнезда его мне найти не удалось.

140. Европейский малый подорлик *Aquila pomarina pomarina* Brehm

Первые сведения о нахождении малого подорлика на Кавказе мы находим в работах Э. Менетрие (1832), Р.Ф. Гогенаккера (1837), К.Ф. Кесслера (1878), М.Н. Богданова (1879), Г.И. Радде (1885) и К.А. Сатунина (1912).

В Кабардино-Балкарии малый подорлик довольно обычная птица в лиственных лесах равнинной и предгорной зон. В горной зоне в период гнездования мне приходилось наблюдать его редко (15 мая 1953 г., 10 июня 1957 г. и 15 июля 1959 г.) Основная масса подорликов зимой улетает из республики. Осенний пролет мною отмечен: в 1953 г. – 20 сентября, в 1954 г. – 15 октября, в 1955 г. – 15 сентября, в 1956 г. – 13 октября, в 1957 – 1958 гг. – 8 октября. В это время я наблюдал стаи, летящие с северо-востока на юго-запад. Отдельные особи остаются зимовать в пределах республики. Один экземпляр был добыт мною 12 января 1956 г., а другой – 15 января 1960 г. Весной подорлики появляются в республике, начиная с 3-й декады марта (в 1954 г. – 28 марта, в 1955 г. – 29 апреля, в 1956 г. – 25 марта, в 1957 г. – 10 апреля). Основная масса птиц прилетает в 1-й декаде апреля.

Гнезда со свежими яйцами я находил обычно в 1-й декаде мая (в 1958 г. – 10 мая, в 1954 г. – 4 мая, в 1955 г. – 2 и 6 мая, в 1957 г. – 7 мая). Однажды я нашел гнездо с 2 свежими яйцами в апреле (28 апреля 1958 г.)

в буковом лесу около с. Аргудан. В кладках 2-х гнезд было по 2 яйца, а в 4-х по одному. В одном из найденных гнезд вылупление птенцов происходило 3 июня 1960 г. (фото 26). Это гнездо было построено на старом тополе, на высоте 13 м от земли; сделано оно было из старых и свежих веток тополя и ивы, лоток был выложен листьями этих деревьев. Судя по зеленым листьям, подорлик положил их в гнездо в период насиживания, вероятно, даже в конце его.

Гнездостроительный материал зависит от типа леса, где строится гнездо. В буковом лесу найденные гнезда были построены из веток и листьев бука. В гнездостроении принимают участие оба родителя; 15 апреля 1954 г. я наблюдал, как пара малых подорликов носила ветки деревьев к гнезду. Величина гнезда и слоистость его дает основание предполагать, что в одном гнезде подорлики выводят своих птенцов в течение ряда лет. Трудно сказать, однако, насколько постоянно в этих гнездах выводят птенцов одни и те же особи.

Обычно у гнезд малых подорликов я находил остатки хомяков, сусликов, водяных крыс и полевых мышей. Птичье мясо в пищевом рационе подорликов также занимает довольно значительное место. Так, 5 июня 1960 г. родители принесли двухдневному птенцу перепела и хомяка; 6 июня самка принесла домашнюю курицу (около леса была птицеферма). Птенец не съел и половины. За этим гнездом я наблюдал с 3 по 10 июня; за это время родители принесли птенцам, кроме грызунов, шесть перепелов и три курицы. Если в первые дни птенцы не справлялись с обилием пищи, то уже через 10-12 дней родители едва успевали подносить им корм. Птенцы были очень прожорливы. Я держал одного птенца в течение 10 дней, ежедневно отстреливая для него по 8-10 сусликов, весом по 50-70 г, и он все съедал без остатка. В один день птенец съел 13 сусликов общим весом 910 г (птенцу было 15 дней).

141. Орёл-карлик *Hieraaetus pennatus pennatus* Gmelin

По данным Л.А. Портенко (1958), орел-карлик гнездится на Кавказе в лесах равнинной и горной зон, поднимаясь до их верхней границы. Р.Л. Беме (1958) указывает, что Н. Волчанов находил гнезда этого орла. Так, 2 мая 1924 г. он обнаружил гнездо с 1 свежим яйцом, 9 мая 1924 г. – гнездо с 2 яйцами и 21 мая 1929 г. около г. Пятигорска – гнездо с 2 слабо насиженными яйцами.

Орел-карлик встречается в Кабардино-Балкарии в небольшом количестве в лесах равнинной и предгорной зон. В горах обычно наблюдается на пролетах. Пролетные особи отмечены мною: в 1955 г. – 12 сентября, в 1956 г. – 4 октября, в 1957 г. – 15 сентября. Весной эти птицы появляются в республике с 2-й половины марта. Я видел их: в 1955 г.

– 19 марта, в 1956 г. 2 апреля, в 1957 г. – 25 марта. В 1960 г. пролет этих птиц я наблюдал 10, 15, 29 апреля. Хотя в гнездовое время я и встречал этих птиц, но гнезда орла-карлика в республике мне найти не удалось.

142. Малый сарыч *Buteo buteo vulpinus* Gloger

В Кабардино-Балкарии этот сарыч обычная птица на осенних и весенних пролетах. Осенняя миграция наблюдается в сентябре-октябре, а весенняя – растянута еще сильнее. Первых пролетных сарычей можно встретить, начиная с 2-й половины марта, а наиболее запоздалые особи попадаются и в 3-й декаде мая. Так, 20 мая 1960 г. в районе Эльбруса, в течение 30 минут я насчитал 40 пролетных сарычей. Отдельные особи встречаются в равнинной зоне и в летнее время. Так, 7 июня и 8 июля 1960 г. я добыл 2 экз. Они оказались *Buteo buteo vulpinus*. Мое определение подтвердил Л.А. Портенко. Видимо, это были молодые особи, которые остались в этом году холостыми. Это подтверждается также тем, что у добытых птиц семенники и яичники были очень слабо развиты, а у самки, отстрелянной мною 8 июля, отсутствовало наседное пятно.

143. Кавказский сарыч *Buteo buteo menetriesi* Bogdanow

По данным Н.Я. Динника (1886), этот сарыч встречается по всему Кавказу, за исключением больших высот. "По крайней мере, – указывает Н.Я. Динник, – я никогда не встречал его в области горных лугов и поясе хвойных деревьев, в поясе же лиственных и даже у верхней границы его он попадается весьма часто" (стр.364). Согласно наблюдениям Р.Л. Беме (1958), в пределах Центрального Кавказа, кавказский сарыч гнездится в лиственном лесу.

По моим наблюдениям, в Кабардино-Балкарии сарыч встречается в гнездовое время во всех типах лесов равнинной, предгорной и горной зон. Чаще всего я видел сарычей в предгорной и горной зонах, причем нельзя сказать, что численность их в сосновом лесу (район Эльбруса) меньше, чем в лиственном. Я неоднократно находил этих птиц даже у самой верхней границы соснового леса, в районе Эльбруса (фото 27).

На основании 3 экз., добытых мною 5 февраля 1955 г., 10 и 15 января 1956 г., в моей работе (Моламусов, 1959) сарыч указан как оседлая птица для Кабардино-Балкарии. В последующие 2 года мне ни разу не приходилось наблюдать этих птиц зимой в пределах республики. Самые поздние находки сарычей относятся к ноябрю (10 ноября 1957 г. и 15 ноября 1958 г.). Основная масса птиц покидает Кабардино-Балкарию с 1-й декады сентября по 1-ю половину октября. Весной они появляются с 2-й половины марта (в 1957 г. – 16 марта, в 1958 г. 25 марта).

Полные свежие кладки я находил, начиная с 2-й половины мая. Самая ранняя кладка обнаружена мною 15 мая 1956 г. в буковом лесу, около с. Аргудан, на высоте 600 м н.у.м., самая поздняя – 26 мая 1960 г. в сосновом лесу, в районе с. Тегенекли, на высоте 1800 м н.у.м. В этом районе 20, 23 и 24 мая 1960 г. я нашел три гнезда, в которых было по два свежих яйца. Размеры яиц (8) 54-56 × 41-42 мм. Гнезда были построены на высоких соснах на высоте 6-10 м над землей. Подстилкой служили лишайники и мхи.

Как и у других хищников, состав гнездостроительного материала у сарычей зависит от типа леса. В буковом лесу они строят свои гнезда из веток лиственных деревьев, что я и наблюдал 15 мая 1956 г., 20 мая 1957 г., 16, 20, 22 мая 1958 г., 28, 29 мая и 4 июня 1959 г. В сосновом лесу сарычи для устройства гнезд используют ветки сосны, березы и черемухи (последняя в Кабардино-Балкарии произрастает только в горной зоне).

Самцы кавказского сарыча так же, как и малого, принимают участие в насиживании яиц. Так, 23 мая 1960 г. в долине р. Ирик, в 4-5 км от ледника Эльбрус, было найдено гнездо сарыча на высокой сосне, а на следующий день, 24 мая, студенты кабардино-балкарского университета убили самку в 8 часов утра. При проверке мною гнезда в 12 часов дня самец насиживал яйца, но это продолжалось недолго. 27 мая он бросил гнездо и больше в него не возвращался. Видимо, самцы насиживают яйца только в течение короткого времени, а именно, когда самки кормятся.

По данным Л.Б. Беме (1926), птенцы кавказских сарычей покидают гнездо в конце июня. Однако 13 июля 1960 г. на правом берегу р. Ирик, на самой верхней границе соснового леса я нашел гнездо с птенцами, которые еще не умели летать. Я снял их с гнезда и взвесил. Вес птенцов оказался 730 и 980 г. В том же районе на следующий день, 14 июля, я нашел второе гнездо с такими же птенцами.

Питание кавказских сарычей довольно разнообразно. У добытых мною 10 экз. в желудках и зобах оказались: прыткая ящерица (5 апреля), жаба (25 мая), остатки различных грызунов (суслика, обыкновенной, общественной и кустарниковой полевок) и мелких воробьиных (дрозда-дерябы, черного дрозда, полевого воробья, щегла, зеленушки). Остатки птиц обнаружены у 3 экз., добытых в зимний период. По данным Стаховского, кавказский сарыч ловит цикад "по слуху", сидя и слушая их стрекотание. Согласно наблюдениям И.В. Жаркова (1938), в пищевом рационе кавказского сарыча лесные мыши составляют 38,28%.

144. Европейский мохноногий канюк *Buteo lagopus lagopus* Brunn.

В Кабардино-Балкарии этот канюк является регулярно зимующей птицей и встречается в довольно большом количестве на полях, по лес-

ным опушкам, в садах равнинной и предгорной зон. Он прилетает в октябре и держится до апреля. Отдельные особи иногда встречаются и в гнездовое время. Мне удалось добыть 1 экз. этого канюка 5 мая 1956 г. в предгорной зоне, в районе с. Верхний Аргудан и 10 июля 1954 г. в районе Верхних Голубых озер. По всей вероятности, эти особи почему-то задержались на местах зимовки. Интересно отметить, что они отличалась меньшими размерами и более темной окраской. В последующие годы я не наблюдал этих канюков в Кабардино-Балкарии позже первых чисел апреля.

145. Сибирский мохноногий канюк *Buteo lagopus menzbieri* Dementiev

Этот подвид, отличающийся более крупными размерами и светлой окраской. Реже встречается в Кабардино-Балкарии в зимний период. Птицы появляются с середины октября и держатся до 3-й декады марта. Самый ранний экземпляр добыт мною 10 октября 1957 г., а самый поздний – 25 марта 1958 г. Столь позднее пребывание сибирского мохноногого канюка объясняется тем, что зима 1957/58 г. была очень суровой. Это, очевидно, и послужило причиной раннего прилета и позднего отлета. В другие годы первых канюков я наблюдал обычно с конца октября, а последних – в первых числах марта.

146. Восточный курганник *Buteo rufinus rufinus* Cretzschmar

Относительно этого курганника М.Н. Богданов (1879) сообщает: "Мне не удалось найти эту птицу на Кавказе, хотя я убежден, что она водится в Ставропольской губ. в Терской области" (стр.45). По данным Н.Я. Динника (1886), курганник встречается на Кавказе очень часто и выводит птенцов. О гнездовании этого вида на Кавказе имеются также указания в работах Г.И. Радде (1885), П.В. Нестерова (1911), К.А. Сатунина (1912), Л.А. Портенко (1958). По данным этих авторов, курганник гнездится в безлесных районах. В работе И.Б. Волчанецкого (1959), курганник отмечен как гнездящаяся птица в Восточном Предкавказье. Р.Л. Беме (1958) приводит его как редко залетную птицу на Центральном Кавказе осенью и весной.

В Кабардино-Балкарии я наблюдал его во время миграций. Осенью пролетные особи отмечены в 1955 г. – 4 сентября, в 1956 г. – 24 сентября, в 1957 г. – 27 августа, в 1958 г. – 14 сентября и 10 октября. Отдельные особи встречаются также и зимой (20 января 1959 г.; 1, 4, 25 января 1960 г.). На осеннем пролете А.М. Радищев добыл 2 экз. курганника в районах с. Кеньже и Котляревское (Ефимцева, Яценко, 1935). В работе В.Г. Иванова и С.П. Чунихина (1959) указано, что ими был добыт 1 экз. курганника 4 апреля 1954 г. Г.Н. Подъяпольский сообщил мне, что ему удалось добыть 1 экз. курганника в мае около г. Нальчика.

Мне не приходилось наблюдать эту птицу в республике позже 1-й декады апреля (8 апреля 1960 г.).

147. Европейский осоед *Pernis apivorus* L.

По данным Л.Б. Беме (1926) осоед является гнездящейся перелетной птицей в Северной Осетии. Он нашел гнездо с двумя свежими яйцами 11 мая 1915 г. около г. Владикавказа. Р.Л. Беме (1958) приводит осоеда как пролетную птицу на Центральном Кавказе.

В Кабардино-Балкарии я наблюдал осоедов как на пролетах, так и в гнездовое время в лесах равнинной, предгорной и горной зон и добывал их 22 мая 1952 г., 20 мая 1958 г., 22 мая 1958 г., 8 мая 1960 г. Зимой мне удалось добыть осоеда 15 января 1957 г. в районе с. Аргудан, на опушке леса.

Нахождение осоеда в гнездовое время в различных местах Северного Кавказа дает основание предполагать, что он является птицей, нередко гнездящейся в этом крае. В Зоологическом институте АН СССР хранятся экземпляры осоедов, добытых 6 мая 1915 г., 17 июня 1922 г. около г. Владикавказа (П.И. Жуков), 3 июля 1919 г. около г. Владикавказа (Л.Б. Беме). На Северо-Западном Кавказе осоеды добывались М.Н. Богдановым (1879) в середине августа, М.А. Мензбиром 17 июля 1908 г., С.С. Туровым (1928) 28 августа 1930 г. О нахождении осоеда в том же районе 30 августа 1935 г. указано в работе Ю.В. Аверина и А.А. Насимовича (1938).

148. Европейский змееяд *Circaetus gallicus gallicus* (Gm.)

О гнездований змееяда на Северном Кавказе впервые сказано в работе Н.Я. Динника (1886). Он нашел гнездо с 1 насиженным яйцом 10 апреля 1885 г. в Ставропольском крае, неподалеку от Ставрополя. В районе Пятигорска Н. Волчанов нашел 2 гнезда: одно – с 1 насиженным яйцом – 14 мая 1921 г. и другое – с 1 свежим яйцом – 27 мая 1924 г. (Р.Л. Беме).

Гнездование змееяда на Северном Кавказе подтверждается имеющимися в Зоологическом институте АН СССР экземплярами, добытыми Быковым в районе Железноводска 15 июня, 23 июля и 6 августа 1898 г. К.Н. Россиков добыл одну старую самку 24 апреля 1884 г. в долине р. Малки около г. Прохладного. Мне не удалось найти гнезда змееяда в Кабардино-Балкарии, хотя я неоднократно наблюдал его в гнездовое время в лесах равнинной и предгорной зон.

Весной эти птицы появляются в республике, начиная с 3-й декады марта: в 1955 г. – 22 марта, в 1956 г. – 19 марта, в 1957 г. – 24 марта, а осенью откочевывают с 1-й декады сентября. Позже 20 октября (1960)

я не встречал змееядов в Кабардино-Балкарии. Во время миграций их чаще всего можно наблюдать на полях, лугах, по опушкам леса, на лесных полянах, а также по речным долинам более крупных рек Малки, Баксана, Черека и Терека.

149. Скопа *Pandion haliaetus haliaetus* L.

По данным М.Н. Богданова (1879), "скопа весьма обыкновенна на Тереке, Кубани и их притоках. Особенно часто она попадается в дельте Терека" (стр.37). Согласно наблюдениям Н.Я. Динника (1886), она встречается по берегам почти всех больших рек Кавказа, включая и горную зону. Р.Л. Беме (1958) отмечает скопу как редкую залетную птицу на Центральном Кавказе. В Зоологическом институте АН СССР хранится 1 экз., добытый Л.Б. Беме 3 октября 1920 г. около г. Владикавказа. Я наблюдал эту птицу в Кабардино-Балкарии всего 2 раза – 20 апреля 1958 г. и 2 мая 1960 г. в долине р. Терек, около с. Плановское.

150. Белая сова *Nyctea scandiaca* L.

Л.Б. Беме (1935) указывает на залеты белой совы в Северную Осетию около с. Ольгинское 18 февраля 1936 г.

151. Филин *Bubo bubo interpositus* Rotschild et Hartert

Филина можно наблюдать в Кабардино-Балкарии в гнездовое время в лиственных лесах предгорной и горной зон. В равнинной зоне в летнее время он встречается значительно реже. Я наблюдал его всего 2 раза – 5 мая 1957 г. и 8 мая 1960 г. Зимой филин совершает небольшие кочевки, во время которых его можно видеть на кукурузных полях, по опушкам леса, в долинах рек, глубоких оврагах, заросших древесной и травянистой растительностью. Я их наблюдал всегда одиночками. Численность вида в целом по республике небольшая; во многих районах, где он раньше встречался довольно часто, за последние годы филин стал редким явлением, очевидно, вследствие вырубки лесных массивов.

По биологии филина я располагаю очень скудным материалом. Только один раз мне удалось добыть птенца филина 15 июня 1960 г. в буковом лесу, возле с. Аргудан на высоте 600 м н.у.м. О питании филина я могу судить по 4 экз., добытым в зимний период. В желудках этих филинов было обнаружено 10 черепов полевок, остатки зайца-русака и мелких воробьиных – овсянки, щегла и черного дрозда. Во всех желудках было много шерсти и мелких косточек мышевидных грызунов.

152. Сплюшка *Otus scops scops* L.

Еще никто из орнитологов, работавших на Кавказе, не указывал на гнездование этого вида на Северном Кавказе. М.Н. Богданов (1879) и

Н.Я. Динник (1886) вообще не включили ее в список кавказских птиц. Л.Б. Беме (1926) приводит сплюшку как пролетную птицу в сентябре-октябре в Северной Осетии.

В равнинной зоне Кабардино-Балкарии сплюшка в гнездовое время довольно обычная птица. Весной она прилетает в 2-й половине марта. Весенний прилет я отмечал: в 1956 г. – 10 марта, в 1957 г. – 20 марта, в 1958 г. – 15 марта. Осенний пролет начинается с конца августа. Основная масса птиц улетает в сентябре, но отдельные особи я наблюдал и в конце октября (28 октября 1957 г.). В зоологическом институте АН СССР имеются 4 экз., добытые К.Н. Россиковым в районе г. Прохладного (12 марта и 15 апреля 1884 г.). В гнездовое время сплюшки заселяют равнинную зону от 200 до 400 м н.у.м. Чаще всего я их наблюдал в районе Гедукского леса и с. Черная Речка.

Полные свежие кладки в Кабардино-Балкарии встречаются с 2-й половины апреля. Из 9 известных мне гнезд самая свежая ранняя кладка в количестве шести яиц была найдена мною 16 апреля 1956 г., самая поздняя – 2 мая 1960 г. Кроме того, в 1952 г. в районе с. Курское в 22,5 км от Нальчика 10 мая было найдено 2 гнезда, причем в каждом было по 6 однодневных птенцов (фото 28). Гнезда находились в дуплах старых ив (одно у самой дороги, а другое в пшеничном поле). 7 июня 1960 г. в Гедукском лесу я нашел еще 2 гнезда; в каждом из них было по пять 7-8-дневных птенцов.

153. Ушастая сова *Asio otus otus* L.

Ушастая сова в Кабардино-Балкарии довольно обычная птица и встречается здесь как летом, так и зимой. И в гнездовое время я неоднократно наблюдал ее в лиственных лесах предгорной и горной зон. В равнинной зоне в эго время мне удалось добыть сову всего один раз – 4 мая 1958 г. Зимой ушастые совы объединяются в большие стаи – до 20 штук. Такие скопления я отмечал: 2 января 1959 г. и 10 января 1960 г. на опушке леса около с. Верхний Аргудан. Из этих двух стай мною было добыто 4 экз. Л.Б. Беме (1926) указывает на скопление до 40 сов в Северной Осетии.

Полные свежие кладки яиц в Кабардино-Балкарии можно найти, начиная с 3-й декады марта. Самую раннюю кладку я нашел 19 марта 1957 г., хотя эта зима была довольно суровой. Более поздняя кладка была найдена 29 апреля 1960 г. Всего в Кабардино-Балкарии я нашел 5 полных кладок по 6 яиц и 1 гнездо с 5 только что вылупившимися птенцами и 1 яйцом (16 апреля 1957 г.). Обнаруженные мною кладки находились в старых гнездах серой вороны.

Насиживание совы начинают, видимо, с первого яйца, поэтому и птенцы вылупляются в разные сроки. Так, 16 апреля 1957 г. я нашел гнездо с 5 яйцами и 1 птенцом; второй птенец вылупился 17-го, а последний – 21 апреля. За этим гнездом я наблюдал с 16 апреля по 10 мая, но ни разу не видел самца. Самка одна кормила птенцов мышевидными грызунами (в основном полевками).

О питании взрослых птиц в зимний период я могу судить на основании 5 экз., добытых 2-10 января 1959 г. и 10 января 1960 г. В желудках этих сов оказалось 10 черепов полевок, 1 череп зеленушки, 1 череп овсянки и 1 череп снегиря, много остатков указанных птиц и полевок, а также шерсть и мелкие кости грызунов.

154. Болотная сова *Asio flammeus flammeus* Pontopp.

К.Н. Россиков (1884) и Н.Я. Динник (1886) приводят болотную сову для Северного Кавказа (Ставропольский край и Кабардино-Балкария) как гнездящуюся птицу. Они отмечают также нахождение этой совы в зимний период. В Зоологическом институте АН СССР имеются экземпляры, добытые Быковым 14 июля 1898 г. около Кисловодска и Л.Б. Беме 11 июня 1929 г. в окрестностях г. Владикавказа. В более поздних работах (Р.Л. Беме, 1958; Иванов, Чунихин, 1959) болотная сова приводится как зимующая птица на Северном Кавказе (Северная Осетия и Кабардино-Балкария).

Мои наблюдения подтверждают данные К.Н. Россикова и Н.Я. Динника. Я неоднократно наблюдал болотную сову в гнездовое время в равнинной зоне Кабардино-Балкарии, и экземпляры, добытые мною в мае-июле, имеются в моей коллекции. Численность болотной совы зимой значительно выше, чем в гнездовое время. В зимний период эти совы встречаются стайками до 20 особей. По всей, видимости, значительная часть этих птиц прилетает я Кабардино-Балкарию на зимовку. В основном прилет происходит в октябре-ноябре, хотя в отдельные годы его можно наблюдать даже с середины сентября (1958 г.). Отлетает болотная сова с половины марта.

В желудках добытых зимой и летом 9 экз. оказались остатки полевых мышей и мелких птиц (овсянки, полевого воробья, зеленушки и жаворонка). Хотя я и наблюдал этих птиц в гнездовое время, но их гнезд мне найти не удалось.

155. Кавказский мохноногий сыч *Aegolius funereus caucasicus* But.

Мохноногий сыч – сравнительно редкая оседлая птица в Кабардино-Балкарии. Встречается в лиственных и хвойных лесах горной зоны. Я наблюдал его 5 июля 1954 в Черкесском ущелье, в районе Верх-

них Голубых озер; 10 июля 1954 г. в том же ущелье, в районе с. Мухол, и 10 августа 1955 г. в сосновом лесу, около с. Эльбрус. Гнезд этого сыча я не находил.

156. Домовый сыч *Athene noctua indigena* Brehm

Домовый сыч в Кабардино-Балкарии – довольно широко распространенная птица. Его можно видеть в равнинной, предгорной и горной зонах. В горах я наблюдал этого сыча до высоты 1300 м (Черекское ущелье, с. Мухол) – 1500 м (Баксанское ущелье, с. Верхний Баксан).

Сыч гнездится в норах по речным обрывам, в карнизах жилых домов, в дуплах деревьев, в расщелинах скал и во всевозможных постройках. Полные свежие кладки в республике можно найти, начиная с 1-й половины мая. Самая ранняя свежая кладка обнаружена мной 2 мая 1954 г., а самая поздняя – 3 июня 1958 г. Всего я нашел в Кабардино-Балкарии 30 полных кладок. В кладках было по пять (19 гнезд) - шесть (11 гнезд) яиц. Если разорить первую кладку, сычи делает повторную кладку. Так, я нашел кладку из 6 яиц 20 мая 1958 г., 21 мая гнездо было разорено, а 10 июня сыч приступил к повторной кладке в том же гнезде, но в данном случае отложил всего 4 яйца. Гнезда были построены в карнизах жилых домов (18 гнезд), в норах и трещинах глинистых обрывов речных долин (10 гнезд) и в дуплах старых деревьев (2 гнезда).

6 июня 1960 г. я нашел гнездо с 6-7-дневными птенцами домового сыча в карнизе здания полевого стана с. Баксаненок. Родители кормили птенцов в основном полевками, но носили им и мелких птиц (воробьев полевых и домовых). Интересно отметить, что в том здании, где было построено гнездо, было 10 гнезд домовых воробьев, но ни одного из них сыч не трогал, хотя я неоднократно видел, как он приносил в гнездо других воробьев.

По данным Н.Я. Динника (1886), сыч на Северном Кавказе является гнездящейся перелетной птицей; весной он прилетает в конце марта - первых числах апреля, а осенью отлетает в сентябре - октябре. Мои наблюдения не подтверждают этого. Я считаю, что сыч в Кабардино-Балкарии является оседлой птицей. "…Никогда я не видел, – пишет Н.Я. Динник, – чтобы сыч садился не крыши домов или вообще каких-либо построек… Никогда я не видел, чтобы он гнездился на старых крышах, чердаках и брошенных зданиях, как это бывает в других странах" (стр.371). По моим данным, наоборот, в Кабардино-Балкарии значительная часть домовых сычей гнездится в различных постройках. Безусловно, они садятся на крыши домов и на карнизы, в которых и гнездятся.

157. Кавказская неясыть *Strix aluco wilkonskii* Menzbier

В лиственных лесах предгорной и горной зон Кабардино-Балкарии встречаются неясыти трех типов окраски: серая, рыжая и черная. По размерам рыжая неясыть больше других, а по численности серая неясыть превосходит рыжую. Черная неясыть – очень редкая птица. Как указывают В.Г. Иванов и С.П. Чунихин (1959), зимой в республике добыт всего 1 экз. черной неясыти в районе с. Аргудан. Этот экземпляр неясыти был добыт мной 24 декабря 1956 г., но не в районе с. Аргудан, как ошибочно сообщает В.Г. Иванов и С.П. Чунихин, а около с. Второй Лескен. Птица держалась на опушке леса у дупла старой яблони и была очень упитанной. В ее желудке оказалось четыре черепа кустарниковых полевок. Второй раз я наблюдал черную неясыть 22 января 1958 г. в том же районе, но добыть ее мне не удалось.

Серую неясыть я неоднократно встречал в буковом лесу в районе с. Верхний Аргудан, Второй Лескен, Бабугент, а также около верхних Голубых озер и добывал 27 января 1956 г., 27 января 1957 г. и 15 января 1959 г. У всех птиц в желудках оказались остатки мышевидных грызунов. Рыжих неясытей я отстрелял 2 февраля 1957 г. и 4 января 1960 г. в буковом лесу около с. Аргудан. Гнезд обыкновенной неясыти в республике я не встречал.

158. Обыкновенная кукушка *Cuculus canorus canorus* L.

Кукушка довольно широко распространенная птица в Кабардино-Балкарии. Она появляется в республике с 3-й декады апреля – 1-й декады мая. Так, первое кукование кукушки отмечено мною в 1952 г. – 2 мая, в 1953 г. – 8 мая, в 1955 г. – 25 апреля, в 1956 г. – 28 апреля, в 1957 г. – 2 мая, в 1958 г. – 27 апреля, в 1959 г. – 4 мая, в 1960 г. 26 апреля.

В первые дни после прилета кукушки держатся в лесной чаще равнинной и предгорной зон, затем, начиная с 2-й декады мая, постепенно расселяются по всей республике, в тех биотопах, где гнездятся мелкие воробьиные. В период гнездования кукушки наблюдаются всюду от равнинной зоны до верхней границы альпийского пояса. Я неоднократно встречал этих птиц в мае (начиная с 3-й декады), июне и июле в районах ледников Эльбрус, Бечо, Шхельда, Безенги, а также в верховьях рек Ирик, Адыл-Су, Кыртык, Адыр-Су и Черек.

В работе А.С. Мальчевского (1960) приводится 48 видов птиц, гнездящихся в Европейской части СССР, в гнезда которых кукушки подкладывают свои яйца. Из этого числа в Кабардино-Балкарии в гнездовое время встречаются 36 видов. Тем не менее, до сих пор яйца кукушки обнаруживали только в гнездах горных коньков, в сосновых лесах высокогорной зоны – в гнезда лесных завирушек, в речных долинах

– в гнезда белых трясогузок, а в поймах рек равнинной зоны – в гнезда дроздовидных камышевок.

Свежие яйца кукушек я находил в Кабардино-Балкарии, начиная с 3-й декады мая. Самое раннее яйцо кукушки, отложенное в гнезде лесной завирушки, я нашел 25 мая 1959 г. в районе с. Тегенекли, в сосновом лесу, на высоте 1800 м н.у.м. в долине р. Баксан (фото 29). Наиболее позднее свежее яйцо кукушки я обнаружил 19 июня 1960 г. в той же долине, около с. Байдаево. Яйцо было отложено в этом случае в гнезде лесной завирушки.

В долине р. Баксан, около с. Эльбрус, Тегенекли и Байдаево в 1959 г. я нашел 8 гнезд лесных завирушек с яйцами кукушек (25, 28, 29, 30 мая, 4, 13, 15 и 19 июня). Размеры яиц (8): 23-23,2×16,5-17,2 мм. Все яйца чисто белые. Интересно отметить, что ни в одном случае из этих яиц кукушки не вылупились птенцы. У завирушек птенцы вылуплялись и развивались нормально, в срок, а яйца кукушки оставались болтунами. Я их подкладывал другим завирушкам, которые насиживали в это время свои яйца, но безуспешно, хотя одно яйцо кукушки 2 или даже 3 завирушки насиживали в продолжение 26-30 дней.

За 2 года работы в районе Эльбруса (май, июнь, июль) в районе соснового леса я ни разу не видел птенцов кукушки, которых воспитывали бы завирушки, тогда как выше, в альпийском поясе, неоднократно наблюдал, как горные коньки кормили птенцов кукушки (25 июня 1958 г., 4 и 10 июня 1954 г., 6 июля 1960 г.).

В поймах рек Терек, Малка, Баксан и Черек я неоднократно наблюдал в 2-й декаде июля кормление дроздовидными камышевками молодых кукушек. С 15 по 25 июля в районе с. Приближное я ежедневно отмечал кормление молодых кукушек дроздовидными камышевками. В это время дроздовидных камышевок можно было видеть в совершенно не характерных для них местах, а именно в лесной чаще, на расстоянии до 1000-2000 м от мест гнездования, это происходило потому, что молодые кукушки улетали в лес, а за ними, чтобы кормить, последовали и камышевки. Хотя поблизости были всевозможные насекомые, которыми кормились лесные насекомоядные птенцы, дроздовидные камышевки каждый раз летали в заросли камыша и оттуда приносили корм молодым кукушкам, которые сидели на ветках деревьев и беспрерывно кричали.

25 июля 1960 г. около с. Приближное я отстрелял молодую кукушку, весом 92,8 г. Вес дроздовидной камышевки (самки), которая кормила этого птенца, равнялся всего 26,65 г. Вес взрослой кукушки (самец), добытой 22 июня 1960 г., составлял 97,37 г. Судя по экземплярам, добытым 9, 15, 25 и 28 мая 1960 г., некоторые особи откладывают

яйца очень поздно или вообще остаются холостыми. У этих кукушек размеры яичника не превышают величины булавочной головки.

Осенний пролет начинается с 2-й половины августа и продолжается до 1-й половины октября. Последний раз я наблюдал кукушек в предгорной зоне в 1956 г. – 14 октября, в 1957 г. – 10 октября, в 1958 г. – 4 октября.

159. Обыкновенный козодой *Caprimulgus europaeus meridionalis* Hart.

Относительно распространения козодоя на Кавказе Н.Я. Динник (1886) пишет: "Во всех лиственных местах встречается очень часто. Не видел я его только в верхней полосе лесной области, именно в хвойных лесах" (стр.377). В Кабардино-Балкарии эту птицу в гнездовое время можно встречать в лесах всех типов, включая хвойные. Я неоднократно наблюдал козодоя в мае, июне и июле 1959-1960 гг. в районе Эльбруса в сосновом лесу, вплоть до самой верхней его границы. Также я видел этих птиц в субальпийском поясе среди кустарниковых зарослей.

Козодой прилетает в республику, начиная с 2-й половины апреля. Появление первых особей я отмечал в 1951 г. – 20 апреля, в 1952 г. – 15 апреля, в 1953 г. – 25 апреля, в 1954 г. – 1 мая, в 1955 г. – 17 апреля, в 1956 г. – 22 апреля, в 1957 г. – 19 апреля, в 1958 г. – 28 апреля. Прилет козодоев на Северный Кавказ Н.Я. Динник (1886) наблюдал в 1879 г. – 11 апреля, в 1883 г. – 8 апреля, в 1885 г. – 6 апреля. Р.Л. Беме (1958) около г. Владикавказа отмечал первых козодоев 20 апреля 1944 г.

Полные свежие кладки я обычно находил с 1-й декады мая: в 1954 г. – 10 мая, в 1955 г. – 8 и 9 мая, в 1956 г. – 4 мая, в 1957 г. – 5 и 10 мая. Наиболее поздние свежие кладки я встречал: в 1959 г. – 25 мая и в 1960 г. – 12 июня. Судя по нахождению слётков (фото 30-31) 16 августа 1960 г. в районе с. Орджоникидзе, отдельные особи откладывают яйца значительно позже указанных мною сроков, а именно в 1-й декаде июля. Л.Б. Беме (1926) нашел гнездо с одним только что вылупившимся птенцом и одним яйцом 15 июня 1925 г. в Северной Осетии, около с. Дарг-Кох. Таким образом, период размножения у козодоя на Северном Кавказе сильно растянут и длится с 1-й декады мая до конца 1-й половины августа, т.е. более трех месяцев.

Осенний пролет козодоя в республику проходит с 1-й декады сентября до первых чисел ноября. Последние особи я наблюдал: в 1956 г. – 25 октября, в 1957 г. – 1 ноября, в 1958 г. – 4 ноября, в 1959 г. – 29 октября, в 1960 г. – 3 ноября.

Вес двух старых самцов, добытых 19 и 25 июля 1960 г., 70,8 и 72,5 г.

160. Обыкновенная сизоворонка *Coracias garrulus garrulus* L.

Сизоворонка – широко распространенная птица в Кабардино-Балкарии. Она прилетает в республику, начиная с 2-й половины апреля.

Появление первых особей я отмечал: в 1953 г. – 25 апреля, в 1954 г. – 2 мая, в 1955 г. – 14 апреля, в 1956 г. – 10 мая, в 1957 г. – 5 мая, в 1958 г. – 22 апреля, в 1959 г. – 4 мая, в 1960 г. – 30 апреля. Судя по встречам сизоворонок в высокогорной зоне, весенний пролет длится до конца мая. Так, в 1959-1960 гг. я неоднократно наблюдал этих птиц в районах ледников Эльбрус (24, 25, 28, 29 мая) и Бечо (26-27 мая).

В период гнездования сизоворонка заселяет равнинную и предгорную зоны, не поднимаясь выше 600 м н.у.м. Гнездится она в глинистых обрывах, преимущественно речных долин. Полные свежие кладки я обычно находил в конце мая в 1-й половине июня. Самые ранние свежие кладки были мною найдены: в 1957 г. – 29 мая, в 1958 г. – 8 июня, в 1959 г. – 2 июня. Наиболее поздние свежие кладки наблюдались в 1956 г. – 20 июня, в 1959 г. – 10 июля, в 1960 г. – 2 июля. Основная масса сизоворонок откладывает яйца в 2-й декаде июня. Так, за период 1955-1960 гг. с 10 по 20 июня я нашел в республике 20 гнезд с полными кладками яиц в долинах рек Терек, Баксан, Лескен и Аргудан. В кладках бывает по четыре (10 гнезд) – пять (16 гнезд) яиц. Судя по тому, что в первых числах июня попадаются самцы и самки со слабо развитыми яичниками и семенниками, можно предположить, что часть сизоворонок, прилетающих в республику, либо приступает к размножению во второе лето, либо остается холостыми. Так, 5 июня 1960 г. я добыл двух самцов, у которых размеры семенников достигали половины нормальной величины – 4×3,2 мм* (нормальная величина семенников у 6 самцов 8×5 мм). У самок, добытых 10 июня, размеры яичников не превышали булавочную головку.

Осенний пролет продолжается с конца августа до первых чисел октября. Последний раз в 1959 г. я видел сизоворонку 5 октября, а в 1960 г. – 8 октября.

161. Золотистая щурка *Merops apiaster* L.

В Кабардино-Балкарии золотистая щурка является многочисленным видом. Она прилетает в республику начиная с конца апреля. Появление этих птиц я отмечал: в 1951 г. – 4 мая, в 1952 г. – 29 апреля, в 1953 г. – 25 апреля, в 1951 г. – 4 мая, в 1952 г. – 29 апреля, в 1953 г. – 25 апреля, в 1954 г. – 2 мая, в 1955 г. – 21 апреля, в 1956 г. – 27 апреля, в 1957 г. – 30 апреля, в 1958 г. – 23 апреля. Судя по нахождению золотистых щурок в высокогорной зоне, весенний пролет продолжается до конца мая. Так, в долине р. Ирик, в 3 км от кромки ледника Эльбрус, я видел стаю этих птиц из 20 особей 24 мая 1959 г., а 25 мая того же года

* Даются размеры левых семенников.

в сосновом лесу, в долине р. Адыл-Су, на высоте 2000 м н.у.м. добыл двух золотистых щурок из стаи примерно в 100 особей. В том же районе с 20 по 24 мая 1960 г. я ежедневно наблюдал стаи этих птиц от 30 до 50 особей.

В гнездовое время золотистые щурки заселяют равнинную и предгорную зоны республики, не поднимаясь выше 600-700 м н.у.м. Однако в период размножения их можно наблюдать и в районе субальпийского пояса, куда они попадают, следуя за кормом, в основном за пчелами.

К гнездостроению эти птицы приступают в разные сроки, но не раньше 2-й половины мая. Так, в одной из колоний начало гнездования я наблюдал 20 мая 1958 г., а 23 мая в четырех местах уже были вырыты норы глубиной 20-25 см, куда они 28 мая отложили первые яйца. 12 июня 1960 г. в долине р. Аргудан на протяжении 4 км я нашел 24 гнезда. Одни были только что начаты, другие вырыты до глубины 15-20 см, а третьи даже до глубины 50 см. Но ни в одном гнезде не было яиц. К откладке яиц в эти гнезда птицы приступили 17 июня, а 24 июня во всех гнездах уже были полные кладки. В 10 гнездах было по пять яиц, в пяти – по четыре, в девяти – по шесть яиц. Л.Б. Беме (1926) на северном отроге Сунженского хребта 15 июня 1915 г. нашел 10 гнезд со слабо насиженными яйцами.

Осенний пролет начинается с 2-й половины августа и продолжается до конца 1-й половины октября. Последний раз в 1960 г. я наблюдал золотистых щурок 15 октября. Основная масса птиц улетает с 1 по 20 сентября.

В Кабардино-Балкарии золотистые щурки приносят большой вред пчеловодству. Особенно это стало заметно в последние десятилетия, когда каждый колхоз или совхоз стал владеть сотнями ульев. Кроме того, многие жители Кабардино-Балкарии имеют собственные ульи. Золотистые щурки большими стаями налетают на пасеки и уничтожают пчел. Особенно страдают пчелы в пасмурные дни, а также в утренние и вечерние часы, когда бывают менее активными. За пчелами щурки летают за 10-20 км и более от места гнездования. Как уже упоминалось, по этой причине их можно наблюдать в гнездовое время и в горной зоне, вплоть до верхней границы субальпийского пояса.

Время активного сбора нектара пчелами совпадает с весенним пролетом золотистых щурок (с 3-й декады апреля до конца мая), во время которого в Кабардино-Балкарии встречается, кроме местных, огромное количество пролетных птиц. Так, 4-8 мая 1958 г. и 6-7 мая 1959 г. в районе Голубого озера (Черекское ущелье) на двух пасеках (по 8-10 ульев в каждой) щурки, по словам пчеловодов, уничтожили около 60% рабочих пчел из шести ульев, а 10-12 мая 1959 г. около с. Аргудан съели

около 80% рабочих пчел из шести ульев. У добытых 12 мая 1959 г. 10 золотистых щурок в желудке оказалось от 20 до 30 пчелиных жал. Такую картину я наблюдал и в 1953 г., когда у 3 экз. этих птиц, добытых в 8 часов утра, в желудках оказалось от 17 до 25 пчелиных жал.

В районе с. Вакадзухо 15-16 августа 1955 г. пчеловоды и лесники отстреляли 400 золотистых щурок в районе пасеки*. Желудки всех птиц были заполнены пчелами. В этом же районе 18 августа на пасеку налетела огромная стая щурок и за несколько часов уничтожила около 40% рабочих пчел в восьми ульях, стоявших отдельно от основной пасеки на поляне. Золотистые щурки ловят пчел, не только улетевших далеко от ульев, но и у самих входов в ульи, скапливаясь по несколько штук и не пропуская ни одной пчелы. Наблюдения и сообщения пчеловодов показывают, что золотистые щурки в Кабардино-Балкарии приносят существенный вред пчеловодству.

162. Зеленая щурка *Merops persicus persicus* L.

В Кабардино-Балкарии я ни разу не встречал зеленых щурок. Л.Б. Беме (1926) указывает на то, что их добывали во время осеннего пролета в Северной Осетии в районе г. Владикавказа.

163. Зимородок *Alcedo atthis atthis* L.

В Кабардино-Балкарии зимородок заселяет речные долины равнинной и предгорной зон. Проникновению этих птиц в горную зону препятствуют в основном каменистые берега речных долин, где зимородкам трудно выкапывать норы. Отдельные особи иногда попадаются и в горной зоне, до высоты 900 м, но это очень редкое явление. Так, с 1951 по 1960 гг. на высоте от 600 до 900 м я видел их всего 2 раза (в районе Голубого озера). Основная масса зимородков как в период гнездования, так и зимой встречается в равнинной зоне в пределах 200-300 м н.у.м. Зимой они совершают небольшие кочевки в поисках незамерзающих рек, а затем скапливаются в долинах незамерзающих рек (например, в районе с. Александровское).

В целом по республике зимородок – малочисленный вид. По биологии этой птица у меня имеются очень скудные данные. Я нашел всего одно гнездо с неполной кладкой 5 мая 1953 г. в долине р. Баксан (в районе с. Черная Речка). В гнезде было 4 свежих яйца. Л.Б. Беме (1926) упоминает о нахождении в Северной Осетии 13 мая 1915 г. и 17 мая 1918 г. полных кладок по 7-9 яиц. О питании зимородков я могу судить только по 2 экз., добытым мной 10-13 июля 1956 г. В желудках этих птиц оказались остатки каких-то мелких рыб (усачей?) и стрекоз.

---

* Это сообщил мне пчеловод Я.И. Черевашенко из с. Аргудан.

164. Удод *Upupa epops epops* L.

В Кабардино-Балкарии это широко распространенная птица. Появление первых удодов в республике я отмечал: в 1951 г. – 2 апреля, в 1952 г. – 8 апреля, в 1953 г. – 28 марта, в 1954 г. – 25 марта, в 1955 г. – 10 апреля, в 1956 г. – 21 марта, в 1957 г. – 4 апреля, в 1958 г. – 26 марта, в 1959 г. – 20 марта, в 1960 г. – 5 апреля.

В гнездовое время удод, заселяя соответствующие биотопы, распространен очень широко – от равнинной зоны до альпийских лугов. Так, я наблюдал неоднократно удодов в мае, июне, июле и августе 1959-1960 гг. в районах ледников Эльбрус, Бечо, Безенги и Шхельда, но гнезд этой птицы в горной зоне, выше верхней границы соснового леса, мне не приходилось наблюдать. Численность его в равнинной и предгорной зонах значительно выше, чем в горах.

Полные свежие кладки удода в республике можно находить с 3-й декады апреля до 1-й декады июня. В разной степени насиженные яйца я находил до конца июня. Молодых удодов, только что покинувших гнезд, можно встретить с 3-й декады мая до 3-й декады июля (14, 15, 20 июля 1960 г.). Всего я нашел 27 гнезд со свежими яйцами. Из них 2 гнезда найдены в апреле (20 и 24 апреля 1960 г.), 15 гнезд – в мае (8 мая 1952 г., 10 мая 1953 г., 4, 6, 7, 8 мая 1954 г., 1, 2-5 мая 1955 г., 15 мая 1956 г., 12 и 20 мая 1957 г., 16 мая 1958 г, 10 и 17 мая 1959 г.), 10 гнезд – в июне (4 июня 1954 г., 1, 2, 3 июня 1956 г., 5 июня 1957 г., 1, 2 июня 1958 г., 2 июня 1959 г., 4-6 июня 1960 г.). В найденных гнездах было по четыре (7 гнезд) или по пять (20 гнезд) яиц. Удоды устраивают свои гнезда в очень различных местах: в глинистых обрывах, дуплах деревьев, карнизах жилых домов, сараях, под прикрытием всевозможных ящиков, досок, дров и т.п.

О питании этой птицы можно судить только по 6 экз., добытым мною в мае, июне и июле. В желудках этих птиц оказались остатки дождевых червей, надкрылья навозных жуков, гусеницы бабочек (крапивницы). Два раза я видел, как удоды носили птенцам медведок – 17 июня и 22 июля 1960 г.

Осенний пролет удодов начинается с конца августа и заканчивается в 1-й половине октября. Последний раз в 1960 г. я видел их 12 октября. Основная масса птиц покидает пределы республики с 25 августа по 20 сентября.

Вес старого самца, добытого 22 июля 1960 г., равен 62,2 г. вес слётка, добытого 23 июля 1960 г. – 59, 5 г.

165. Желна *Dryocopus martius martius* L.

Черный дятел в Кабардино-Балкарии самый малочисленный из всех видов дятлов, в гнездовое время он в основном встречается в лесах

предгорной и горной зон. В равнинной зоне я наблюдал его всего 2 раза – 10 мая 1953 г. в районе с. Черная Речка и 15 мая 1959 г. в районе с. Александровское. Зимой чаще всего этих дятлов можно встретить в лесах предгорной зоны, но летом численность их в гнездовое время в горной зоне выше, чем в предгорной.

По биологии черного дятла у меня очень мало данных. Я нашел всего одно гнездо 2 июня 1960 г. в буковом лесу, в 10 км к югу от с. Аргудан. Гнездо было построено в дупле огромного старого бука, лоток был на высоте, примерно, 18-20 м от земли. При мне из гнезда вылетело четыре птенца. Остались ли еще птенцы в гнезде, нельзя было сказать: дупло было настолько глубоким и узким, что до его дна достать было невозможно.

У 2 экз., добытых мною 12 января 1958 г. в буковом лесу предгорной зоны, в желудках оказалось 115 каких-то мелких насекомых (златогузок?), 40 лесных мух, 12 пауков, 15 божьих коровок, 10 куколок жуков-короедов и 15 лесных муравьев.

166. Зеленый дятел *Picus viridis karelini* Brandt

Зеленый дятел в Кабардино-Балкарии в гнездовое время заселяет преимущественно лиственные леса предгорной и равнинной зон. В горной зоне распространение этого вида ограничено лиственным лесом. В сосновом лесу мне не приходилось наблюдать зеленых дятлов, хотя в течение мая, июня и июля 1959-1960 гг. я работал в районе Эльбруса. В предыдущие годы (1951-1958) во время кратковременных выездов я также не видел их выше 1000 м н.у.м. Основная масса зеленых дятлов, как в период гнездования, так и в зимнее время встречается ниже 800 м н.у.м.

Зимой часто можно наблюдать их в садах и парках равнинной и предгорной зон. По биологии этого дятла у меня мало данных. Я нашел всего одно гнездо в дупле тополя 5 июня 1960 г., в котором было пять вполне оперившихся птенцов, которые 7 июня покинули гнездо. Вылетевшие птенцы держались в течение четырех дней поблизости от гнезда, и самка кормила их исключительно муравьями. У двух птенцов, добытых 8-9 июня, желудки были заполнены муравьями. Вес их был 136,3 и 140 г.

167. Большой пестрый дятел *Dendrocopos major tenuirostris* But.

Большой пестрый дятел в Кабардино-Балкарии встречается во всех типах лесов равнинной, предгорной и горной зон. Зимой он совершает небольшие кочевки, во время которых посещает кукурузные поля расположенные вблизи леса. Отдельные особи остаются зимой в пределах мест гнездования. Так, в январе 1960 г. я неоднократно наблюдал большого пестрого дятла у самой верхней границы соснового леса в

районе Эльбруса, в долинах рек Ирик, Бечо и Адыл-Су. В целом по республике этот дятел довольно обычная птица. Зимой большие пестрые дятлы собираются небольшими стайками – до 10-15 особей. Чаще всего такие стайки я наблюдал на кукурузных полях.

Полные свежие кладки можно найти, начиная с 1-й декады мая. 5 мая 1957 г. я обнаружил гнездо с 4 свежими яйцами в дупле старого бука в лесу около с. Верхний Аргудан, а 17 мая 1958 г. нашел гнездо с 5 сильно насиженными яйцами в лесу в районе с. Александровское. Более поздние свежие кладки я встречал 28 мая 1959 г. и 1 июня 1960 г. В кладках было по 5 яиц. Молодых птиц, только что покинувших гнездо, я добыл 18 июля 1960 г. в районе с. Приближное.

Пища кавказского большого пестрого дятла, как и номинального [под]вида, довольно разнообразная, но преимущественно он питается животной пищей (различные насекомые). Растительная пища преобладает в питании дятла в зимний, а также в ранний весенний период. В условиях Северного Кавказа растительную пищу составляют в основном желуди, а в высокогорной зоне, где растут хвойные леса, – семена сосны и ели. В работе В.А. Аверина и А.А. Насимовича (1938) указано изменение численности кавказских больших пестрых дятлов в зависимости от урожая или неурожая желудей.

В предгорной зоне Кабардино-Балкарии в зимний период часто можно наблюдать больших пестрых дятлов на кукурузных полях, расположенных по опушкам лесов. У 6 экз., добытых мною зимой 1959-1960 гг., я обнаружил остатки семян шиповника, кусочки стеблей кукурузы, остатки желудей и два зерна подсолнуха (у 1 экз.). Известен случай поедания этим дятлом птенцов малой мухоловки и яиц зяблика (Справочник «Птицы Советского Союза», т.1, стр.583).

168. Кавказский средний дятел *Dendrocopos medius caucasicus Bianchi*

Кавказский средний дятел встречается в тех же лесах Кабардино-Балкарии, где и большой пестрый дятел, но численность его заметно меньше (фото 32). Зимой он совершает небольшие кочевки, во время которых его, так же как и большого пестрого дятла, можно наблюдать на кукурузных полях, в садах, парках и по долинам рек среди зарослей кустарников с редкими и старыми деревьями. Однако отдельных особей я наблюдал и высоко в горах – на верхней границе соснового леса в районе Эльбруса в январе 1960 г.

Срок размножения кавказского среднего дятла почти совпадает со сроками размножения большого пестрого дятла. Так, я нашел гнездо с 5 свежими яйцами 10 мая 1957 г., а слабо насиженные кладки встречал 15 мая 1958 г. и 17 мая 1959 г. В кладках было по 5 яиц. 22 мая 1959 г. я

обнаружил гнездо с 5 однодневными птенцами, а 8 июня 1960 г. в Гедукском лесу нашел гнездо с 5 вполне оперившимися птенцами, которые на следующий день покинули гнездо. Все найденные мною гнезда находились в дуплах деревьев (бука, сосны, ивы и тополя).

В отличие от большого пестрого дятла, у среднего дятла я не обнаружил остатков растительной пищи. В желудках 5 экз., добытых в зимний и летний период, оказались лишь остатки насекомых.

169. Кавказский малый пестрый дятел *Dendrocopos minor colchicus* But.

В Кабардино-Балкарии кавказский малый пестрый дятел встречается в лиственных лесах равнинной, предгорной и горной зон. В сосновом лесу этого дятла мне ни разу не приходилось наблюдать за период 1951-1960 гг. Численность его в целом по республике невелика и, несомненно, меньше, чем других пестрых дятлов. Чаще всего я встречал малого пестрого дятла в лесах равнинной и предгорной зон на высоте 200-700 м н.у.м.

По биологии этого вида у меня мало данных: я нашел всего 1 гнездо в равнинной зоне, в Гедукском лесу, в дупле старой ивы 6 июня 1960 г. В нем было 5 вполне оперившихся птенцов, которые 8 июня покинули гнездо. Зимой чаще всего малого дятла можно видеть по опушкам леса, на лесных полянах среди зарослей сорняков и кустарников, а также на кукурузных полях, куда он вылетает в поисках насекомых, зимующих в пазухах листьев кукурузы.

170. Вертишейка *Jynx torquilla torquilla* L.

Вертишейка в Кабардино-Балкарии является довольно обычной птицей в лиственном лесу предгорной зовы. В лесах горной и равнинной зон численность ее значительно меньше, а в сосновом лесу эту птицу можно наблюдать только на пролетах.

Появление первых вертишеек в республике я отмечал: в 1952 г. – 25 апреля, в 1953 г. – 2 апреля, в 1954 г. – 18 апреля, в 1955 г. – 24 марта, в 1956 г. – 10 апреля, в 1957 и в 1958 гг. – 28 марта, в 1959 г. – 7 апреля, в 1960 г. – 19 апреля. До начала усиленного токования вертишейки держатся очень скрыто среди зарослей кустарников, и заметить их трудно. В период токования присутствие птиц легко определить даже издали по характерному крику. Активное токование начинается с 3-й декады апреля и продолжается до 2-й декады мая.

Гнезда с яйцами я обычно находил с 3-й декады мая. Гнездо с 6 свежими яйцами я обнаружил 25 мая 1956 в лесу около с. Аргудан. В том же районе кладки были отмечены мною: в 1957 г. – 28 мая, в 1958 г. – 29 мая и 4 июня, в 1959 г. – 31 мая, в 1960 г. – 2 и 4 июня. Более поздние

свежие кладки (по 5 яиц) я встречал 8 и 10 июня 1960 г. в Гедукском лесу в районе с. Баксаненок. Все найденные гнезда находились в дуплах деревьев.

У добытых мною 6 вертишеек в желудках оказались исключительно муравьи и их куколки.

Осенний пролет этих птиц в республике проходит с конца августа по сентябрь включительно, отдельные особи встречаются и в первых числах октября. Последний раз в 1960 г. я наблюдал вертишейку 8 октября.

171. Черный стриж *Apus apus apus* L.

Этот стриж в Кабардино-Балкарии довольно обычная и широко распространенная птица. Появление первых черных стрижей в республике я отмечал: в 1951 г. – 28 апреля, в 1952 г. – 4 мая, в 1953 г. – 25 апреля, в 1954 г. – 26 апреля, в 1955 г. – 22 апреля, в 1956 г. – 2 мая, в 1957 г. – 23 апреля, в 1959 г. – 3 мая, в 1960 г. – 28 апреля.

В гнездовое время черных стрижей можно наблюдать как в равнинной, так и в горной зоне. Численность их значительно выше в городах, где они гнездятся под карнизами высоких зданий. В горах местами гнездования служат сторожевые башни или щели отвесных скал. Гнезда стрижи делают из глины, причем обычно шарообразной формы с боковым входом*.

К кладке эти птицы приступают в 3-й декаде мая. Самая ранняя свежая кладка найдена иною 25 мая 1954 г. в г. Нальчике. В кладке было два яйца. В этом же районе 26 мая 1955 г. я обнаружил шесть гнезд. В них было по два яйца. Наиболее поздние кладки я встречал 6, 10, и 12 июня 1959 г. в г. Тырныаузе на высоте 1000 м. В этих трех гнездах также было по два свежих яйца. Массовый вылет птенцов обычно происходит с 2-й декады июля. Отдельные запоздалые вылеты я наблюдал в 1-й декаде августа 1960 г. Так, 4-6 августа того же года я добыл двух слётков в районе г. Прохладного. По данным Н.Я. Динника (1886), стрижи покидают Северный Кавказ с начала августа.

В Кабардино-Балкарии осенний пролет этих птиц начинается обычно с 2-й половины августа и заканчивается в сентябре. Огромные пролетные стаи черных стрижей я наблюдал ежедневно с 15 по 29 августа 1960 г. в долинах рек Хулам и Черек.

172. Белобрюхий стриж *Apus melba melba* L.

Численность белобрюхого стрижа в Кабардино-Балкарии значительно меньше, чем черного. В гнездовое время его можно наблюдать в

---

* Стрижи строят свои гнезда в щелях скал и построек, но никогда не лепят их из глины. Подобные гнезда характерны для ласточек (прим. ред.).

горной зоне, по речным долинам рек Черек, Хулам, Баксан, Малка и Чегем. Во время осенних и весенних миграций он часто встречается в равнинной и предгорной зонах. По времени его пролеты в основном совпадают с пролетами черного стрижа. Один раз я наблюдал белобрюхого стрижа в Кабардино-Балкарии раньше, чем черного, – 15 апреля 1957 г. Численность этого вида на осеннем пролете возрастает. По всей вероятности, кроме местных особей, в пределы Кабардино-Балкарии залетают стрижи и из других мест.

Так, в Хуламском ущелье численность белобрюхих стрижей, начиная с 1-й декады августа, резко возросла, а с 25 августа начался непосредственный перелет их через горный хребет, который продолжался до 15 сентября. Во время осенних и весенних миграций этих стрижей можно наблюдать в равнинной и предгорной зонах, но в гнездовое время я их не встречал ниже 900-1000 м н.у.м.

15 мая 1959 г. в долине р. Ирик, около с. Эльбрус, я наблюдал белобрюхих стрижей, носивших материал для постройки гнезда. Птицы с соломинками и перьями залетали в щели отвесной стены долины р. Ирик. К сожалению, мне не удалось добраться до гнезд и более подробно рассмотреть состав гнездостроительных материалов. В этом районе вылет молодых белобрюхих стрижей я отмечал в 1959 г. – 10 июля, а в 1960 г. – 9 июля. Р.Л. Беме (1958) вылет молодых стрижей в Северной Осетии наблюдал 14 июля 1951 г.

173. Ворон *Corvus corax corax* L.

В гнездовой период в Кабардино-Балкарии ворон наблюдается исключительно в горной зоне, на высоте 700 м н.у.м. и выше. В осенне-зимний период, а также ранней весной он встречается в предгорной и равнинной зонах. Зимой ворона часто можно видеть вместе с грачами, серыми воронами и галками. В целом численность его по республике невелика.

К размножению ворон приступает довольно рано. Я нашел гнездо с 4 слабо насиженными яйцами 30 марта 1957 г. в районе Голубого озера. Гнездо было построено на скале, у самой дороги. Выводок, состоявший из 6 птиц (4 молодых и 2 старых), я встретил 15 мая 1959 г. в долине р. Аргудан на высоте 800 м н.у.м.

Основной пищей воронов является падаль. Поэтому их чаще всего можно наблюдать как зимой, так и летом, вблизи молочных и овцеводческих ферм, а также в тех районах, где сосредоточена основная масса туров (район Безенги).

Литература к диссертации

Аверин Ю.В., 1938. Кавказский тетерев // Труды Кавказского зап-ка, вып.1.- С.57-84.

Аверин Ю.В., Насимович А.А., 1938. Птицы горной части Северо-Западного Кавказа // Труды Кавказск. госзаповедника, вып.1.- С.5-56.

Беме Л.Б., 1925. К биологии кавказского тетерева // Украинск. охотник и рыболов, № 4.- С.18-19.

Беме Л.Б., 1925. Результаты орнитологических экскурсий в Кизлярский округ ДагССР в 1921-22 гг.- Владикавказ.- 25 с.

Беме Л.Б., 1926. Птицы Северной Осетии и Ингушии (с прилежащими районами) // Уч. зап. Северо-Кавк. ин-та краеведения, т.1.- С.175-274.

Бёме Л.Б., 1935. Птицы северо-кавказского края.- Пятигорск: Севкавгиз.- 141 с.

Беме Р.Л., 1958. Птицы Центрального Кавказа // Уч. зап. Сев.-Осетинск. гос. пед. ин-та.- Орджоникидзе, т.23, вып.1. - С.111-183.

Богданов М., 1879. Птицы Кавказа // Труды О-ва естествоиспытателей при Казанск. ун-те, т.8, вып.4.- С.1-188.

Вильконский Ф.В., 1897. Орнитологическая фауна Аджарии, Гурии и северо-восточного Лазистана // Мат-лы к познанию фауны и флоры Росс. империи, Отд. зоол.- М.- С.1-121.

Виноградов А., 1870. Охота в уреме Малого Зеленчука // Журн. охоты и конно-завод.- С.101-145.

Волчанецкий И.Б., 1959. Очерк орнитофауны Восточного Предкавказья // Учен. зап. Харьк. ун-та, т.106: Труды науч.-исслед. ин-та Биол. и Биол. фак., т.28. - С.7-38.

Гептнер В.Г., 1926. Материалы по птицам Горной Балкарии (Некоторые соображения по фауне горной степи массива Эльбрус) // Учен. зап. Сев.-Кавк. института краеведения, т.1. - С.91-118.

Гладков Н.А., 1951. Отряд кулики – Limicolae или Charadriiformes // Птицы Сов. Союза, т.3.- М.: Сов. наука. - С.3-372.

Динник Н., 1886. Орнитологические наблюдения на Кавказе // Тр. СПб. О-ва естествоисп., т.17, вып.1.- С.260-378.

Ефимцева А.С., Яценко Е.Н., 1935. Хищные птицы Кабарды и Балкарии // Изв. Сев.-Кавк. пед. ин-та, т.12.- С.265-278.

Жарков В.И., 1938. Материалы к изучению роли хищных птиц в Кавказском заповеднике // Труды Кавказского зап-ка, вып.1.- С.87-102.

Иванов В.Г., Чунихин С.П., 1959. Зимняя авифауна Кабардино-Балкарии // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.5.- С.183-197.

Иванов В.Г., Чунихин С.П., 1959. К экологии луней (род *Circus*) в условиях Кабардино-Балкарии // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.5.- С.177-181.

Кесслер К.Ф., 1878. Путешествие по Закавказскому краю в 1875 г. с зоологической целью // Тр. СПб. о-ва естествоиспыт., т.8. Приложение.- С.1-200.

Кутубидзе М.Е., 1957. О размножении кавказского кеклика (*Alectoris graeca caucasica* Suschkin) // Сообщ. АН ГССР, т.18, № 5.- С.611-618.

Лоренц Ф., 1884. Кавказский тетерев // Природа и охота, август.- С.1-10.
Мальчевский А.С., 1958. О биологических расах обыкновенной кукушки (*Cuculus canorus* L.) на территории европейской части СССР // Зоол. журнал, т.37, вып.1.- С.87-95.
Мальчевский А.С., 1961. К биологии и охране перепела (*Coturnix coturnix* L.) // Вестн. ЛГУ, № 15.- С.148-152.
Мальчевский А.С., Кадочников Н.П., 1953. Методика прижизненного изучения питания гнездовых птенцов насекомоядных птиц // Зоол. журнал, т.32, вып.2.- С.277-282.
Мекленбурцев Р.Н., 1951. Отряд голуби // Птицы Советского Союза, т.2.- М.: Сов. наука.- С.3-70.
Мензбир М.А., 1895. Птицы России, т.2.- М.- 1120 с.
Млокосевич Л.Ф., 1879. Кавказский тетерев (*Tetrao mlokosiewitschi* Tacz.) // Изв. Кавказск. о-ва любителей естествозн. и альпийского клуба, вып.1.- С.17-23.
Моламусов Х.Т., 1959. О некоторых закономерностях в зонально-поясном распространении птиц и других представителей животного мира в Кабардино-Балкарской республике // Учён. зап. Кабард.-Балкарск. науч.-исслед. ин-та, т.14.- Нальчик.- С.267-314.
Насимович А.А., 1947. Горная индейка в горах Кавказского заповедника // Природа, № 3.- С.68-69.
Насимович А.А., 1955. Осенний пролет птиц в горах центрального Кавказа // Учен. зап. Кабардинск. пед. ин-та, вып.8.- С.169-170.
Нестеров П.В., 1911. Материалы по орнитофауне юго-западного Закавказья и северо-восточной части Малой Азии // Ежегодник Зоол. музея Акад. наук, т.16, № 3.- С.311-408.
Портенко Л.А., 1958. Кавказ: Птицы – Aves // Животный мир СССР, т.5.- М.-Л.- С.220-260.
Радде Г.И., 1873. Предварительный отчет о путешествии д-ра Г. Радде по Кавказу летом 1867 года // Зап. Кавказск. отделения РГО, кн.8.
Радде Г.И., 1885. Орнитологическая фауна Кавказа. Ornis Caucasica. Систематическое и биолого-географическое описание кавказских птиц.- Тифлис.- 451 с.
Россиков К.Н., 1884. Обзор зимней фауны птиц восточной части долины р. Малки // Записки Академии Наук. Т. 49. Приложение № 4.- С.1-48.
Сатунин К.А., 1907. Материалы к познанию птиц Кавказского края //Зап. Кавказ. отделения РГО, кн. 26, вып.3. - С.1-144.
Сатунин К.А., 1911, 1912. Систематический каталог птиц Кавказского края // Зап. Кавказск. отд. РГО, кн.28, вып.1.- С.1-86; вып.12.- С.87-195.
Селегененко Н.В., 1949. Случай залета черноголового хохотуна в предгорную часть Северной Осетии // Охрана природы, сб.9.- С.118.
Сомов Н.Н., 1897. Орнитологическая фауна Харьковской губернии.- Харьков.- 680 с.
Спангенберг Е.П., 1952. Отряд пастушки // Птицы Сов. Союза, т.3.- М.: Сов. наука. - С.604-677.
Спангенберг Е.П., Туров С.С., 1950. Зимовка птиц в Азербайджане // Охрана природы, сб.10.- С.88-114.
Спангенберг Е.П., Фейгин Г.А., 1936. Птицы нижней Сыр-Дарьи и прилегаю-

щих районов // Сб. трудов Зоол. музея Моск. ун-та, т.3.- С.41-184.
Сушкин П.П., 1908. Птицы Средней Киргизской степи (Тургайская область и восточная часть Уральской) // Мат-лы к познанию фауны и флоры Рос. Империи, отд. зоол., вып.8. - М. - С. 1-803.
Туров С.С., 1928. Материалы к изучению фауны Кавказского государственного заповедника // Труды Сев.-Кавказск. ассоциации науч.-исслед. ин-тов, вып.2.- Ростов-н/Д.- С.15.
Туров С.С., 1941. Фазаны в низовьях Терека // Сов. охотник, вып.1.- С.22.
Чхиквишвили И.Д., 1930. Материалы по орнитофауне Кахетии (Телавский уезд) // Закавказский краеведческий сборник. Сер. А: Естествознание, т.1.- Тифлис.- С.105-128.
Чхиквишвили И.Д., 1933. Материалы по орнитофауне Джавахетии // Джавахетия: Материалы по изучению природных ресурсов Ахалкалакского нагорья.- Тифлис: ЗакГИЗ.- С.303-328.
Шелковников А.Б., 1934. Материалы к орнитофауне озера Севан // Труды Зоол. сектора Грузин. отд. Закавказск. филиала АН СССР, т.1.- С.144-160.

Gmelin S.G., 1774. Reize durch Russland zur Erforschung der drei Naturreiche.- SPb., Bd. III.
Hohenacker R.Fr., 1837. Enumeratio animalium quae in provinciis transcaucasicis Karabach, Schirwan et Talysch, nec non in territorio Elisabethpolensi observavit // Bull. de la Soc. des natur. de Moscou, T.10, № 7.- P.136-147.
Kaleniczenko J., 1839. Series animalium, a defuncto Professore Joan. Krynicki, in itinere annis 1836-1838, ad Caucasum et Tauridem suscepto, etc. // Bull. Soc. Imper. Naturalistes de Moscou, № 2. - P.203-297.
Lorenz Th., 1887. Beitrag zur Kenntniss der ornithologischen Fauna an der Nordseite des Kaukasus.- Moskau.- XII+62 S.
Ménétries E., 1832. Catalogue raisonné des objects de zoologie recueillis dans un voyage an Caucase et jusqu'aux frontiéres actuelis de la Perse. - SPb.- 271 p.
Nordmann A., 1840. Catalogue raisonne des oiseaux de la faune Pontique // Voyage dans la Russie meridionale et la Crimee par Mr.A.Demidoff, V.3.- Paris. - P.67-306.

Библиография публикаций Х.Т. Моламусова

Моламусов Х.Т., 1955. Материалы к фауне птиц Кабарды // Учен. зап. Кабардинского пед. ин-та, вып.8.- С.171-202.

Моламусов Х.Т., 1959. О некоторых закономерностях в зонально-поясном распространении птиц и других представителей животного мира в Кабардино-Балкарской республике // Учён. зап. Кабардино-Балкарского науч.-исслед. ин-та, т.14.- Нальчик.- С.267-314.

Моламусов Х.Т., 1961. К биологии куриных птиц Кабардино-Балкарии // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.12. - С.221-239.

Моламусов Х.Т., 1961. Птицы Кабардино-Балкарии.- Диссертация … канд. биол. наук.- Ленинград.- 586 с.

Моламусов Х.Т., 1961. Птицы Кабардино-Балкарии.- Автореферат дисс. … канд. биол. наук.- Ленинград.- 16 с.

Моламусов Х.Т., 1962. К биологии *Phoenicurus ochruros ochruros* // Учён. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.14.- С.120-123.

Моламусов Х.Т., 1962. Роль речных долин в распространении птиц на территории Кабардино-Балкарской АССР // Вестник ЛГУ. Серия биол., № 15, вып.3.- С.46-57.

Моламусов Х.Т., 1963. Охрана и восстановление численности охотничье-промысловых птиц Кабардино-Балкарской АССР // Вторая Межвуз. науч.-отчетн. конф. «Университеты – сельскому хозяйству»: Тез. докл..- Л.- С.229-231.

Моламусов Х.Т., 1964. К биологии вальдшнепа на Северном Кавказе // Учен. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.21: Сер. с.-х. и биол.- С.145-148.

Моламусов Х.Т., 1964. К биологии камышницы на Северном Кавказе // Уч. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.21: Серия с/х и биол.- С.121-124.

Моламусов Х.Т., 1964. Кавказская лесная завирушка // Учён. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.20.- С.130-135.

Моламусов Х.Т., 1964. Кавказский жулан // Учён. зап. Кабардино-Балкарского ун-та, вып.20.- С.125-130.

Моламусов Х.Т., 1966. Охотничье-промысловые птицы Кабардино-Балкарии // Природа Кабардино-Балкарии и её охрана: Сб. статей.- Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во.- С.87-102.

Моламусов Х.Т., 1966. Охрана и восстановление численности фазана на Северном Кавказе // Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана: Сб. статей.- Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во.- С. 125-126.

Моламусов Х.Т., 1966. Птицы парка гор. Нальчика // Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана: Сб. статей.- Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во.- С.103-117.

Моламусов Х.Т., 1966. Уходящее богатство // Природа Кабардино-Балкарии и ее охрана: Сб. статей.- Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во.- С.118-124.

Моламусов Х.Т., 1967. Судьба северокавказского фазана // Мат-лы III Зоол. конф. пед. ин-тов РСФСР.- Волгоград.- С.434-435.

Моламусов Х.Т., 1967. Птицы центральной части Северного Кавказа. - Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во.- 100 с.

Рудич П.К., Моламусов Х.Т., 1967. Птицы нашего края: Альбом.- Нальчик: Кабардино-Балкарское кн. изд-во.- 12 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление 6
Предисловие 7
Введение автора 14
Систематический обзор птиц Кабардино-Балкарии 18
Курообразные – *Galliformes* 18
Голубеобразные – *Columbiformes* 35
Рябкообразные – *Pterocletiformes* 38
Журавлеобразные – *Gruiformes* 39
Ржанкообразные – *Charadriiformes* 45
Гагарообразные – *Gaviiformes* 63
Поганкообразные – *Podicipediformes* 63
Гусеобразные – *Anseriformes* 65
Аистообразные – *Ciconiiformes* 71
Фламингообразные – *Phoenicopteriformes* 76
Соколообразные – *Falconiformes* 76
Совообразные – *Strigiformes* 100
Кукушкообразные – *Cuculiformes* 104
Козодоеобразные – *Caprimulgiformes* 106
Ракшеообразные – *Coraciiformes* 106
Удодообразные – *Upupiformes* 110
Дятлообразные – *Piciformes* 110
Стрижеобразные – *Apodiformes* 114
Воробьинообразные – *Passeriformes* 115
Литература к диссертации 116
Библиография публикаций Х.Т. Моламусова 119

Научное издание

МОЛАМУСОВ Хажмурат Титуевич

ПТИЦЫ Кабардино-Балкарии Неворобьиные

Фрагменты диссертации
на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Научный редактор
доктор биологических наук, профессор В. П. Белик
(Южный федеральный университет)

Фото на обложке:
белоголовый сип; птенец серой куропатки;
слётки желтобрюхой пеночки; слёток московки;
белозобый дрозд; большая чечевица; краснобрюхая горихвостка

Подписано в печать 10.08.2017 г. Заказ № 5898.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Формат 60×84 1/ 16.
Усл. печ. лист. 6,98. Уч. изд. л. 7,0. Тираж 300 экз.

Отпечатано в отделе полиграфической, корпоративной и сувенирной продукции
Издательско-полиграфического комплекса КИБИ МЕДИА ЦЕНТРА ЮФУ.
344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 200/1, тел (863) 243-41-66.