

районе станции Аннау (15 км восточнее Ашгабата) кольчатые горлицы наблюдались 26 августа и 10 ноября 1993. В Фарюзинском ущелье (25 км западнее Ашгабата) живут три пары этих птиц. Они наблюдались нами 20 и 22 мая, 31 июля 1994. По свидетельству местных жителей, горлицы всё время держатся в одном месте – лесопосадке рядом с населённым пунктом и живут там уже два года.

Таким образом, кольчатая горлица в Туркменистане начинает расселяться не только на отмеченных ранее местах – по долинам Мургаба и Теджена, но и в предгорьях Центрального Копетдага. Дальнейшее расселение этого вида, по нашему мнению, произойдёт по населённым пунктам долин вышеуказанных рек и по посёлкам сопредельных территорий. Общее направление расселения – с юга на север. В предгорьях Копетдага птицы перемещаются, по-видимому, в западном направлении, спорадически появляясь всё в новых населённых пунктах. Расселение кольчатых горлиц может происходить вдоль железной дороги и Каракумского канала.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1378: 4866-4868

К биологии серого гуся *Anser anser* на Тургайских озёрах (Северный Казахстан)

Э.М.Ауэзов, К.Ф.Ёлкин

Издание второе. Первая публикация в 1966*

Нами обобщены имеющиеся в литературе сведения по биологии серого гуся *Anser anser* на Тургайских озёрах, а также наши собственные наблюдения в 1963-1965 годах.

Передовые птицы появляются в Наурзуме в конце марта – начале апреля. Они отмечались здесь 22 марта 1961, 26 марта 1962, 4 апреля 1963, 2 апреля 1964 и 30 марта 1965. Массовый пролёт длится в течение нескольких дней от 2 апреля (1961) до 17 апреля (1963). На сроки массового пролёта серого гуся погодные условия весны сказываются в большей степени, нежели на сроках пролёта других пластинчатоклювых птиц.

Гнездование серого гуся происходит также в наиболее ранние и сжатые сроки. Кладка яиц начинается в конце апреля, а заканчивается в первой декаде мая. Самые ранние полные кладки были найдены

* Ауэзов Э.М., Ёлкин К.Ф. 1966. К биологии серого гуся на Тургайских озёрах // *Охрана и рациональное использование ресурсов живой природы. Материалы науч.-метод. конф.* Алма-Ата: 84-85.

3 мая 1963 на озёрах Сары-Муин и Жаркуль. Всего найдено 16 полных кладок, число яиц в них колебалось от 4 до 6 (в среднем 4.8). Средний вес яиц на разных стадиях насиживания был от 140.7 до 178.2 г. Наиболее крупное яйцо имело размеры 90×62 мм, а самое мелкое – 87×57 мм.

Основной гнездовой биотоп – тростниковые заросли вблизи чистых плёсов. Часто встречаются плавучие гнёзда. Гнёзда находили также на островах; несколько гнёзд были в смешанных гнездовых колониях чаек и уток (хохотуньи *Larus cachinnans* и озёрные чайки *Larus ridibundus*, шилохвость *Anas acuta*, серая утка *Anas strepera* и красноголовый нырок *Aythya ferina*). Измеренное 20 мая 1965 гнездо на острове озера Жаркуль имело размеры, см: внешний диаметр 44×39, диаметр лотка 32.5×29.5, глубина лотка 8.5, высота гнезда над землёй 6.8, ширина валика 7. Из 16 гнёзд 3 погибло из-за затопления водой, нагоняемой сильными ветрами.

Самый ранний срок появления гусят – 25 мая 1963, самый поздний – 9 июля 1964. Массовое появление пуховичков в Наурзуме относится к последним числам первой декады июня. Первая дата встречи оперившихся, начинающих подлетать гусят 2 июля 1964 (озеро Сары-Копа), а последняя дата – 28 июля 1964 (озеро Сары-Камыш). Основная масса молодняка поднимается на крыло во второй декаде июля. Среднее число пуховых гусят в выводках – 4.68 (28 выводков), полуоперившихся – 3.55 (13 выводков).

В Наурзуме с конца мая – начала июня наблюдается пролёт серых гусей на южные озёра на летнюю линьку. У взрослых гусей она продолжается с последней декады июня до конца второй декады июля. Последние нелётные взрослые серые гуси наблюдались на озере Сары-Суин 23 июля 1963 (самая поздняя дата за несколько лет). Массовых скоплений серых гусей на Тургайских озёрах в 1964-1965 годах обнаружено не было. В 1964 году на озере Сары-Муин был найден линный «ток», по следам которого можно было предположить, что здесь линяло приблизительно 100-120 птиц. Сравнительно значительные линьки серых гусей отмечены в 1964 году на Сары-Муине и на солоноватых мелководных и заросших тростником озёрах в верховьях реки Уль-каяк.

Летающие на кормёжку стаи серых гусей становятся обычными с середины июля. К концу второй декады июля к взрослым птицам присоединяется молодняк, поэтому число птиц в стаях заметно увеличивается. В августе стаи серых гусей объединяются в крупные табуны и некоторое время придерживаются избранных водоёмов. Отлёт серых гусей начинается в сентябре. На больших озёрах (Наурзумские и Сары-Копа) птицы останавливаются, образуя большие крупные скопления. В отдельные дни в сентябре 1964 года на Большом Аксуате на-

считывалось до 700 гусей. Валовой пролёт идёт в конце сентября – середине октября. Последние особи исчезают с замерзанием водной поверхности на озёрах. Самые поздние даты встреч в Наурзуме 10 ноября 1961 и 12 ноября 1964.

Численность серых гусей на Тургайских озёрах, особенно гнездящихся, за последние годы быстро сокращается. На северных озёрах гнездование серого гуся становится редким. По наблюдениям 1964 года, на Сары-Камыше гнезилось не больше 6 пар, в северной части Тениза и на Кара-Камыше по долине Убагана – 2 пары, на Шушкалах – 4-5 пар, на Шийли – 2 пары. На Наурзумских озёрах ежегодно гнездятся несколько десятков серых гусей и пока ещё сравнительно много серых гусей гнездится на Сары-Копе и озёрах низовий Тургая. Основная причина убывания численности серых гусей на Тургайских озёрах – чрезмерный отстрел, поэтому целесообразно уменьшить сроки и нормы добычи серых гусей в период осенней охоты.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1378: 4868-4871

Находка кулика-сороки *Haematopus ostralegus* на гнездовании в Хабаровском крае

В.В.Пронкевич, В.И.Росляков, Б.А.Воронов

Второе издание. Первая публикация в 2011*

Гнездовой ареал кулика-сороки *Haematopus ostralegus* на Дальнем Востоке России выяснен недостаточно. Так, по данным одних авторов (Андреев и др. 2006; Нечаев, Гамова 2009), он охватывает северное побережье Охотского моря – залив Шелихова, Пенжинскую губу и западное и восточное побережье Камчатки, по сведениям других (Лобков 2001; Степанян 2003) – в него также может входить бассейн реки Амур к западу до устья Буреи, бассейн Уссури и Приморский край.

Дальневосточный подвид кулика-сороки *Haematopus ostralegus osculans* Swinhoe 1871 занесён в Красную книгу России, Приложения двусторонних соглашений об охране мигрирующих птиц, заключённых Россией с Японией, Республикой Корея и КНДР.

До настоящего времени для Хабаровского края, как, впрочем, и для сопредельных регионов – Приморского края, Сахалинской, Еврейской автономной и Амурской областей, вид был отмечен только в качестве

* Пронкевич В.В., Росляков В.И., Воронов Б.А. 2011. Находка кулика-сороки (*Haematopus ostralegus* Linnaeus, 1758) на гнездовании в Хабаровском крае // *Амур. зоол. журн.* 3, 3: 289-290.