Железняков Д.Ф., Колесников И.И. 1958. Фауна позвоночных Горно-лесного заповедника // *Тр. Горно-лесного заповедника* **1**: 110-112.

Корелов М.Н. 1956. Фауна позвоночных Бостандыкского района // *Природа и хозяйственные условия горной части Бостандыка*. Алма-Ата: 80-120.

Митропольский О.В. 2002. Обзор птиц семейства дроздовых (Aves, Passeriformes, Turdidae) Западного Тянь-Шаня как возможных биоиндикаторов состояния экосистемы // *Биоразнообразие Западного Тянь-Шаня: охрана и рациональное использование*. Ташкент: 158-170.

Митропольский О.В. 2005. *Материалы к изучению птиц и млекопитающих в бассейнах рек Чирчик и Ахангаран (Узбекистан, Казахстан)*. Бишкек.

Фундукчиев С.Э., Белялова Л.Э., Митропольский М.Г. 2004. Территориальное распределение и современная численность дроздовых птиц Чаткальского заповедника // *Тр. Чаткальского заповедника* **5**: 184-193.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1890**: 1201-1202*

Роль свиристеля *Bombycilla garrulus* в распространении омелы белой *Viscum album*

Л.А.Бабенко

*Второе издание. Первая публикация в 1965**

Среди вредителей древесных растений на Украине заметное место занимает омела белая *Viscum album*. Во многих населённых пунктах и лесах «шарами» омелы нередко сплошь поражены лиственные породы деревьев. Иногда в кроне можно насчитать до 30-40 кустов омелы. Такая крона постепенно усыхает, ветви её обламываются, и дерево частично гибнет. Когда омела поселяется на плодовых деревьях (яблоне или груше), они перестают плодоносить. О численности омелы в некоторых местах на Украине можно судить по тому, что в Киеве насчитывают свыше двух тысяч сильно поражённых деревьев.

Омела распространяется птицами – дроздами *Turdus* spp., свиристелями *Bombycilla garrulus* и др. На Украине роль дроздов в распространении омелы невелика. Основное значение имеют свиристели, которые пропускают через пищевод клейкие семена омелы, приклеивающиеся к коре ветвей деревьев.

В местах распространения омелы в СССР свиристели являются пролётными или отчасти зимующими птицами. Осенью они появляются на севере Украины не ранее середины ноября, а чаще ещё позже. К этому времени местные гнездящиеся и пролётные птицы уничтожают в лесах все плоды рябины, бузины, бересклета. Чрезвычайно прожор-

* Бабенко Л.А. 1965. Роль свиристеля в распространении омелы // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 20-21.

ливые свиристели в короткое время освобождают окрестности от последних плодов рябины, бузины, калины и переходят на питание омелой. Перелетая с дерева на дерево, свиристели распространяют её семена, ростки которых весной вклиниваются в кору деревьев.

В настоящее время единственным способом борьбы с омелой является уничтожение её кустов вместе с ветвью дерева, на котором поселился этот полупаразит. Ветви деревьев нужно отпиливать на расстоянии 5-10 см от ствола омелы. Учитывая особенности распространения омелы, следует отказаться от широко проводимой практики весенней очистки деревьев. Необходимо очищать от омелы деревья до появления свиристелей, вскоре после опадания листьев, приблизительно в конце октября – начале ноября.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1899**: 1202-1204*

О возможных причинах отсутствия подвидов у полярной крачки *Sterna paradisaea*

В.В.Бианки

*Второе издание. Первая публикация в 1965**

Полярная крачка *Sterna paradisaea* – высокоспециализированный вид, питающийся мелкой рыбой и ракообразными, которых она ловит у поверхности воды (другие корма имеют подчинённое значение). Малочисленность или отсутствие основного корма, а также трудности в его добыче, связанные то значительными волнениями на море, резко увеличивают эмбриональную и постэмбриональную смертность у этого вида. В Кандалакшском заливе Белого моря единственным видом корма для полярной крачки, обеспечивающим её размножение, служит трёхиглая колюшка *Gasterosteus aculeatus*. В Онежском заливе и на Мурмане она не является столь массовым видом, но есть скопления других рыб подходящей величины, которыми питается крачка.

Несмотря на значительный гнездовой ареал, большое разнообразие условий существования в нём и нередко обособленные места гнездования, полярная крачка не образует подвидов. Это, по-видимому, определяется сравнительно интенсивным перемешиванием особей различных популяций, чему способствует достаточно лёгкий переход с одного доступного корма на другой (при их сходном физиологическом значе-

* Бианки В.В. 1965. О возможных причинах отсутствия подвидов у полярной крачки // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 32-34.