

Parus cyanus. Белая лазоревка встречена 18 марта 1982 в ерниках по северному берегу озера Бусани.

Coccothraustes coccothraustes. Дубонос встречен 22 мая 1982 в долине реки Уакит.

Emberiza schoeniclus. Камышовая овсянка – редкий пролётный и, возможно, гнездящийся вид. Поющие самцы встречены на реке Ципе 30 апреля и 1 мая. Стайка из 3 птиц встречена 2 мая и 2 птицы 31 мая на реке Могой.

Значительная часть видов, не отмеченных в прошлом, проникла в котловину из южных и западных районов. Распространение ряда видов (скалистый голубь, городская ласточка, сорока) связано с хозяйственным освоением территории котловины. Местные популяции редких видов птиц ввиду низкого антропогенного воздействия в настоящий момент не находятся под угрозой исчезновения. Учитывая неизбежность освоения района в будущем (котловина входит в зону БАМа), необходимо уже сейчас принять меры для охраны природных комплексов Баунтовской котловины.

Л и т е р а т у р а

Измайлов И.В. 1967. *Птицы Витимского плоскогорья*. Улан-Удэ: 1-305.

Поляков И.В. 1873. Зоологические наблюдения. Географическое распространение животных в юго-восточной части Лецского бассейна // *Отчёт об Олёкминско-Витимской экспедиции: Зап. РГО по общ. геогр.* 3, 2: 1-175.

Шкатулова А.П. 1980. Голенастые, веслоногие и чайковые птицы Бурятской АССР // *Фауна и ресурсы позвоночных бассейна озера Байкал*. Улан-Удэ: 144-147.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1160: 2322-2324

Осенний пролёт водоплавающих птиц через Белое море

В.В.Бианки

*Второе издание. Первая публикация в 1965**

Кандалакшский заповедник на протяжении 9 лет изучает осенний пролёт птиц на Белом море. Собран большой материал по 14 пунктам побережья, преимущественно путём утренних 4-часовых наблюдений на стационарном пункте и 4-часовых вечерних учётов на маршрутах. Приведённые ниже цифры, полученные по этой методике, относятся к

* Бианки В.В. 1965. Осенний пролёт водоплавающих птиц через Белое море // *География ресурсов водоплавающих птиц в СССР*. М., 1: 53-55.

периоду с конца сентября до середины октября и показывают индексы количества птиц, отмеченных в среднем за один день наблюдений.

Через Белое море проходит мощный Беломорско-Балтийский пролётный путь водоплавающих птиц. Он охватывает не всё Белое море, а преимущественно его юго-восточные части: Онежский, Двинский и Мезенский заливы, по которым пролетает 0.8-5.5 тыс. птиц в день. Через Кандалакшский залив, западную часть бассейна и Воронку мигрирует сравнительно мало птиц – 0.1-0.3 тыс. в день.

Наиболее массовая группа пролётных птиц – утки. На путях массового пролёта их отмечали до 1.5-5.0 тыс. особей в день. В действительности же их пролетает гораздо больше, так как утки летят в течение круглых суток. В Онежском заливе русло их пролёта проходит полосой от острова Жижгин и Унской губы к городу Беломорску и Вирандозеру. По мере удаления от устья Онежского залива количество пролетающих птиц убывает и у города Онеги пролёт совсем не выражен. Наиболее массовым видом на море в это время бывает морянка *Clangula hyemalis*, много летит синьги *Melanitta nigra* и морской чернети *Aythya marila*, заметно меньше – свиязи *Anas penelope*, гоголя *Bucephala clangula* и турпана *Melanitta fusca*. Остальные виды сравнительно малочисленны. В основных местах осеннего откорма уток: в Кандалакшских шхерах, у островов Жужмиев и Малой Муксалмы, и менее значительных у Кемь-луд, острова Жижгин и Пертоминска с берега отмечали по 100-450 обыкновенных гаг *Somateria mollissima*, а у деревни Сосновка на Терском берегу – по 30 малых гаг *Polysticta stelleri*. Крохали, преимущественно длинноносый *Mergus serrator*, по 25-70 экз. летят к югу вдоль Поморского берега, пересекают Онежский залив у Соловецких островов, а Онежский полуостров – через Унскую губу.

Гуси летят через Белое море довольно широким фронтом, придерживаясь осенью юго-западного направления. Однако если двигаться вдоль западного побережья от Кандалакши к Онеге, то максимум пролётных гусей можно наблюдать в районе между Вирмой и Кушерекой – по 190-300 экз. за 1 день. Севернее Беломорска летят почти исключительно гуменники *Anser fabalis*, а южнее его обычен белолобый *Anser albifrons* и меньше серый *A. anser* гуси. Белощёкая казарка *Branta leucopsis* пролетает узкой полосой с севера Мезенского залива через Горло Белого моря, районы Пертоминска и Унежмы, направляясь дальше к Балтийскому морю.

Лебеди немногочисленны на пролёте и летят широким фронтом от острова Великий до Архангельска. В основном это кликуны *Cygnus cygnus*, в меньшем числе тундровые *C. bewickii*. Они концентрируются на кормёжку и отдых в мелководных губах, где их мало тревожат люди.

Массовый пролёт гагар (чернозобой *Gavia arctica* и краснозобой *G. stellata*) идёт по той же полосе, что и у нырковых уток. Их регистриру-

ется за день по 180-330 экз. По-видимому, вся масса пролётных водоплавающих птиц отдыхает во время миграций на Белом море, останавливаясь в местах, богатых кормами. Регулярного промысла водоплавающей птицы на Белом море нет. Небольшое количество уток и гусей добывают охотники-любители. Зато обыкновенных гаг, охота на которых запрещена с 1931 года, гибнет под выстрелами сравнительно много.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1160: 2324-2325

О прерывистой линьке первостепенных маховых у морского зуйка *Charadrius alexandrinus*

А.Э.Гаврилов, Э.И.Гаврилов

*Второе издание. Первая публикация в 1990**

Взрослые морские зуйки *Charadrius alexandrinus* до отлёта на зимовку проходят полную послебрачную линьку (Козлова 1957), причём первостепенные маховые сменяются у них достаточно интенсивно, как правило одновременно растут 3-4 пера. Бурно проходит обновление второстепенных маховых, в разгар линьки большинство их находится на различных стадиях роста. Благодаря значительному ухудшению лётных качеств в этот период взрослые птицы концентрируются на отдельных водоёмах, где большую часть дня проводят тесной стаей на берегу и отмели, а вечером рассредоточиваются на кормёжку.

В июле-августе 1986 года на разливе артезианской скважины в районе Телекульских озёр (Кзыл-Ординская область) нами осмотрено более 250 взрослых морских зуйков; большинство их было на разных стадиях послебрачной линьки. 23 и 27 июля отловлены две особи, у которых 1-е первостепенное маховое доросло, 30 июля пойман зуюк с новыми 1-4-м первостепенными маховыми, причём очередные по ходу линьки перья у них не выпали. У птицы от 23 июля 1-3-е первостепенные маховые перья новые, а 4-е – немного не доросло. Поскольку на обоих крыльях состояние оперения было одинаковым, эти случаи показывают, что у перечисленных особей смена первостепенных маховых перьев прервалась. Задержка линьки у них, безусловно, кратковременна. У зуйка, отловленного 26 июля, 1-5-е первостепенные маховые

* Гаврилов А.Э., Гаврилов Э.И. 1990. О прерывистой линьке первостепенных маховых у морского зуйка // *Орнитология* 24: 170-171.