ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2008, Том 17, Экспресс-выпуск **401**: 266-267*

Гнездование египетской цапли *Bubulcus ibis* в дельте Волги

Д.Г.Бондарев, Н.Н.Гаврилов

*Второе издание. Первая публикация в 1991**

Орнитологи, изучавшие в разные годы колонии цаплевых в дельте Волги, относили египетскую цаплю *Bubulcus ibis* к случайным залётным видам (Хлебников 1930) или вообще не упоминали её в сводках о птицах (Воробьёв 1936). Первое и единственное сообщение о гнездовании этого вида на Дамчинском участке Астраханского заповедника относится к 1950 году, когда было найдено 2 гнезда, а в 1951 – 3 гнезда (Кудрявцев и др. 1957).

На протяжении последних двух десятилетий неоднократно приходилось встречать египетских цапель в этом регионе в весеннее и летнее время. Известен факт добычи 1 экз. 20 апреля 1959 неподалёку от Астрахани. Единичные встречи датированы 8 и 17 мая 1964. С 1970 года встречи единичных особей участились, причём египетских цапель видели в районах расположения смешанных колоний голенастых птиц в мае-июле. С тех пор встречи *B. ibis* стали ежегодными.

4 июня 1979 были обнаружены 4 гнезда египетских цапель в смешанной колонии Трёхизбинского участка Астраханского заповедника. В 2 гнёздах было по 4 яйца, в 2 – по 3 яйца. 23 июня при повторном посещении колонии были найдены ещё 2 гнезда. В первых 4 гнёздах были птенцы 2-3-сут возраста, а во вновь обнаруженных шло вылупление. В конце июля птенцы начали летать и к началу августа покинули гнёзда. В 1980 г. в этой же колонии было найдено 3 гнезда, в 1986 г. – 4, в 1989 г. – 4, а в 1990 г. – 16 гнёзд. В среднем на каждое гнездо приходилось 3 птенца. В начале июля они начали летать. Египетских цапель встречали и в других частях дельты Волги, где их поведение указывало на возможность гнездования.

Указанные выше находки позволяют считать египетскую цаплю редким гнездящимся видом дельты Волги. В европейской части СССР это самая северная точка её гнездового ареала.

Литература

Воробьёв К.А. 1936. Материалы к орнитологической фауне дельты Волги и прилежащих степей // *Тр. Астраханского заповедника* **1**: 3-52.

---

* Бондарев Д.Г., Гаврилов Н.Н. 1991. Гнездование египетской цапли в дельте Волги // *Материалы 10-й Всесоюз. орнитол. конф.* Минск, **2**: 69-70.

Кудрявцев С.М., Марков В.И., Поярков Д.В. 1957. Новые виды птиц дельты Волги // *Зоол. журн.* **36**, 9: 1423-1424.
Хлебников ВА. 1930. *Птицы Астраханского края*. Астрахань: 1-51.

ISSN 0869-4362
*Русский орнитологический журнал 2008, Том 17, Экспресс-выпуск **401**: 267*

Гнездование лебедя-шипуна *Cygnus olor* на Среднем Урале

А.В.Лугаськов, Л.Н.Степанов

*Второе издание. Первая публикация в 1997**

Установлено гнездование лебедя-шипуна *Cygnus olor* на озере Шитовское в окрестностях г. Среднеуральска (Свердловская обл.). С 1989 г. ежегодно отмечали на озере пару лебедей. В 1996 г. было 7 взрослых птиц, из них две особи – полувзрослые. По словам постоянно живущего на озере егеря В.М.Спицкого, в середине июля с парой было 7 птенцов размером с крякву, взрослые птицы демонстрировали при этом активную защиту, нападая на человека в лодке. В тихую безветренную погоду птицы появлялись на плёсе озера очень рано утром, на рассвете, и поздно вечером. По всей вероятности, место гнездования расположено в практически недоступных заболоченных участках на западном берегу озера.

* Лугаськов А.В., Степанов Л.Н. 1997. Гнездование лебедя-шипуна на Среднем Урале // *Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири*. Екатеринбург: 102.