рый, с частыми взмахами крыльев, с синхронизацией движений в плотных стаях, прямой или со сменой направления и высоты; стаи скученные (рыхлые или плотные), оформленные в виде заполненных углов, клина, дуг, шара и т.д., переходящих часто друг в друга (Молодовский 1997).

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1902**: 1348-1349*

К зимней жизни даурской куропатки *Perdix dauurica*

Г.К.Боровицкая

Второе издание. Первая публикация в 1965[*]

Даурская куропатка *Perdix dauurica* широко распространена в горном лесостепье Забайкалья. Она имеет определённое охотничье-промысловое значение, составляя основу заготовок пернатой дичи.

Местообитание зимой: открытые каменистые склоны гор, покрытые кустами караганы и спиреи (укрытие от резких холодных ветров в небольших распадках, овражках, зарослях кустарников); острова на реках, поросшие ивняками, дёреном, дикой яблоней, черёмухой; открытые луга в речных долинах; сухие степи с кустиками той же караганы; поля.

Зимой куропатки, как известно, держатся стайками. Число птиц в стайке различно, чаще 10-20 особей. Состав стайки смешанный как в половом, так и в возрастном отношении. Зимние стайки формируются ещё в сентябре-октябре из оставшихся в живых особей нескольких выводков.

Стайки даурских куропаток в течение всей зимы кочуют в районе своих гнездовых участков, подолгу задерживаясь в местах, богатых кормом. Они часто держатся на полях, где стерня и неубранные кучи соломы служат им не только кормом, но и укрытием от ветра, врагов. Долины рек с ивняками привлекают птиц травянистыми растениями с сохранившимися семенами (горец вьюнковый, марь белая, гречиха вьюнковая) и защищённостью от ветра. Отыскивая корм, куропатки разгребают снег, оставляя после себя след, который даёт возможность понять многие стороны их зимней жизни. В частности, по этим следам можно судить о размерах кормового участка данной стайки.

[*] Боровицкая Г.К. 1965. К зимней жизни даурской куропатки // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 43-45.

На кормёжку даурские куропатки вылетают, очевидно, два раза в день: утром (от утренней зари до 10-11 ч) и перед вечером (до наступления темноты).

Места отдыха, ночёвок даурских куропаток обычно связаны с каким-либо укрытием от ветра, хищников. Они устраиваются под кучами соломы в полях, под нижними ветками молодых сосенок на опушке леса, в кустах ильма, караганы, спиреи в степных распадках и овражках.

Место ночёвки представляет небольшую площадку, очищенную от снега, размером в четверть квадратного метра, покрытую сплошным слоем помёта птиц. Каждая стайка на участке кормёжки устраивает 2-3 такие «ночёвки».

Для изучения зимнего питания использованы 50 зобов куропаток, добытых в феврале 1962 года в Кяхтинском районе республики.

Примерно половину зимних кормов составляют семена культурных растений: пшеницы (24%), овса (16%), ячменя (5%), ржи (около 2%) и др. Другая половина зимних кормов представлена семенами травянистых растений, в первую очередь гречихи вьюнковой (12%), щирицы колосистой (7%), горца вьюнкового (6%), мари белой (6%), солянки русской (3.8%), тмина полевого (1,5%) и щетинника зелёного (1.5%). Насекомые и их куколки, полóва (мякина) и кусочки соломы составляют незначительную примесь в питании куропаток (3%). У 5 птиц в зобах обнаружены насекомые, которых они, очевидно, склёвывали мёртвыми, при разгребании снега.

Численность даурских куропаток сильно колеблется. В 1954, 1959, 1960 годах в южной Бурятии отмечалось массовое размножение птиц. Наоборот, 1955, 1956, 1962, 1963 годы характеризовались резким падением численности куропаток, порой – почти полным их исчезновением. В 1964 году, по нашему мнению, началось очередное нарастание численности птиц. Например, в декабре 1964 года на учётном маршруте в 70 км в Гусиноозерской котловине мы зарегистрировали 3 стайки куропаток общей численностью в 40-45 особей.

В отношении причин колебаний численности даурской куропатки существуют самые разные объяснения, часто противоречивые. Дело в том, что экологию даурской куропатки никто по-настоящему не изучал, и мы не располагаем ни научно обоснованным объяснением колебаний численности, ни причинами её периодических миграций.

Мы глубоко убеждены в том, что рациональное использование запасов даурской куропатки заключается не только в хорошей организации промысла. Выполнение этой задачи в большой степени зависит от научного решения ряда вопросов экологии даурской куропатки.