

С. К. Даль

Данные о распространении черноголового чеккана (*Saxicola torquata* L.) в Армянской ССР

(Представлено В. О. Гулканяном 11 IV 1946)

По орнитологической сводке проф. А. Ф. Ляйстера и Г. В. Соснина⁽²⁾ для Армянской ССР известны: закавказский черноголовый чеккан (*Saxicola torquata variegata* Gm.) и северокавказский черноголовый чеккан (*Saxicola torquata amaliae* But.).

Как показал критический пересмотр материала по географической изменчивости в Палеарктике этого вида, произведенный Б. К. Штегманом⁽³⁾, описанный Бутурлиным северокавказский подвид оказался синонимом европейской расы (*Saxicola torquata rubicola* L.). В той же работе Б. К. Штегман⁽³⁾ описал новый подвид армянского черноголового чеккана (*Saxicola torquata armenica* Stegm). Эти птицы от прочих подвидов хорошо отличаются окраской и размерами. Описание их составлено по 19 экземплярам. Ареал этого нового подвида не вполне ясен, по Штегману *S. t. armenica* „населяет нагорье Армении (Курдистан, Урмия) до границы Месопотамии, кроме того, повидимому, части восточного Закавказья, где наблюдаются также переходы к *variegata*“. Далее, 1 экземпляр этого подвида в мае 1896 г. был добыт в окрестностях Шемахи, некоторые—в негнездовой период (март) около Тбилиси и Закатал.

При проверке определений коллекции черноголовых чекканов, собранных на территории Армянской ССР, хранящихся в Зоологическом Институте Академии Наук Арм. ССР, выяснилось, что *Saxicola torquata armenica*, как и следовало ожидать, встречается и у нас. Таким образом в Армянской ССР зарегистрировано три подвида черноголовых чекканов. Между тем, одновременное, совместное распространение нескольких подвидов одного вида противоречит установленным правилам систематики и зоогеографии. Подразделение же ареалов их у нас, приведенное в материалах по орнитофауне Арм. ССР⁽²⁾, недостаточно полно и не вполне ясно. Цель настоящей заметки—внести соответствующие коррективы, уточняющие данные вышеприведенной сводки.

1. Армянский черноголовый чеккан
(*Saxicola torquata armenica* Stegm)

Материал: № 68 ♂ Шагаплу, Карабахларский р-н 5 V 1939; № 434 ♂ Эйлар, Котайкский р-н 21 VI 1939; № 1182 ♂ окр. Еревана 8 IV 1928; № 1832 ♀ окр. Еревана 21 III 1930.

Длина крыла у самцов 70,5—74,8 мм, хвост 49,5—54,4 мм, длина белого цвета в основании хвоста 11,2—23 мм. Распространение белого цвета основания в ‰ к общей длине хвоста в среднем 27 (по Штегману до 25). Те же цифры для самки 69,4; 49,5; 11,6 и 23%.

2. Закавказский черноголовый чеккан
(*Saxicola torquata variegata* Gm.)

Материал: № 1002 ♀ окрестности Еревана 28 III 1930; № 1004 ♀ Шорджа, Красносельский р-н 25 IX 1932; № 1146 ♂ окр. селения Кешикенд (Микоян) 24 VII 1933; № 1825 ♂ окрестности Еревана 21 III 1933; № 1830 ♂ гора Султан-бек, окр. Барцруни, Азизбековский р-н 29 VI 1931.

Длина крыла у самцов 68,2—70,8 мм; хвост 48,5—54 мм; длина белого цвета в основании хвоста 25,8—33 мм. Распространение белого цвета основания в ‰ к общей длине хвоста в среднем 55. Те же цифры у самок: 67,5—69,1; 47,8—52; 17—34,8 и в среднем 51‰.

3. Европейский черноголовый чеккан
(*Saxicola torquata rubicola* L.)

Материал: № 16 ♂ Ардви, Алавердский р-н 3 VIII 1937; № 31 ♂ там же 3 VIII 1937; № 33 ♂ там же 7 VIII 1937; № 66 ♂ Покровка, Степанаванский р-н 7 IX 1939; № 95 ♀ Привольное, Калининский р-н 20 IX 1939; № 96 ♂ там же 21 IX 1939; № 97 ♂ Мосесгех, Шамшадинский р-н 4 VII 1938; № 217 ♀ Велигех, Шамшадинский р-н 28 VIII 1938; № 218 ♀ там же 28 VIII 1938; № 218. В. ♂ Паракар, Эчмиадзинский р-н 16 IX 1924; № 322 ♀ Ахтала, Алавердский р-н 30 VIII 1925; № 867 ♂ окрестности Еревана 27 X 1927; № 1006 ♀ Алаверди 7 VIII 1932; № 1065 ♀ там же 7 VIII 1932; № 1095 ♀ Личкадзор, Ноемберянский р-н 22 VIII 1932; № 1418 ♂ окрестности Еревана 25 III 1929; № 1981 ♂ Марц, Алавердский р-н 1 IX 1932.

Длина крыла у самцов 61,6—53,2 мм, хвост сплошь черный, длина его 44,8—53,2 мм. Длина крыла самок 62,0—65,0 мм.

Кроме этого имеются два экземпляра, которые являются по своей окраске и размерам переходными между *S. t. armenica* и *S. t. variegata*; № 162 ♂ Навур, Шамшадинский р-н 17 VIII 1938 и № 1775 ♂ Ордубад (Нах. АССР) 11 VIII 1935.

Основываясь на приведенном материале (совершенно исключая из обобщения полевые регистрации черноголовых чекканов, произведенные без документального подтверждения их подвиговой принадлежности), в отношении распространения всех трех упомянутых подвидов в Армянской ССР получены следующие результаты:

Армянский черноголовый чеккан (*Saxicola torquata armenica* Stegm.) населяет у нас полупустыни и зону фриганоидной растительности юга Арм. ССР. В вертикальном отношении этот подвид зарегистрирован от 825 до 1400 метров над уровнем моря.

Европейский черноголовый чеккан (*Saxicola torquata rubicola* L.) широко распространен на открытых пониженных площадях во всех северных районах Арм. ССР. В вертикальном направлении отмечен от 850 до 1585 м над уровнем моря.

Закавказский черноголовый чеккан (*Saxicola torquata variegata* Gm.) встречается реже предыдущих подвидов и населяет горно-степную, субальпийскую и альпийскую зоны Арм. ССР. В вертикальном отношении зарегистрирован от 1240 до 1920 м над уровнем моря.

Вне гнездового периода, на пролете, европейский и закавказский черноголовые чекканы встречены в долине Аракса (окр. Еревана).

Изложенные данные о распространении подвидов черноголовых чекканов в Армянской ССР, лишней раз доказывают полную возможность совместных фито- и зоогеографических обобщений.

Зоологический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1946, март.

Ս. Կ. ԴԱԼ

Հայկական ՍՍՌ-ում *Saxicola torquata* L. բույսերի տարածման մասին

Գրականության տվյալների համաձայն՝ Հայկական ՍՍՌ-ի տերիտորիայում հայտնի էր *Saxicola torquata* (черноголовый чеккан)-ի երկու ենթատեսակ՝ *Saxicola torquata rubicola* L. և *S. t. variegata* Gm.

Հայաստանում հավաքված և Հայկական ՍՍՌ-ի Գիտությունների Ակադեմիայի Կենդանաբանական Ինստիտուտի կոլեկցիաներում պահված թռչունների այդ տեսակի որոշումը վերանայելու ժամանակ հաստատված է նաև երրորդ ենթատեսակի՝ *Saxicola torquata armenica* Stegm. առկայությունը մեզ մոտ. վերջինս նկարագրված է 1935 թ., բայց Հայկական ՍՍՌ-ի համար չէր նշված:

Saxicola torquata L. բոլոր երեք ենթատեսակները տարածված են Հայկական ՍՍՌ-ում որոշ զոոգեոգրաֆիական տերիտորիաներում, իսկ եթե մի զոոգեոգրաֆիական պրովինցիայում հանդիպում են երկու ենթատեսակներ միաժամանակ, ապա նրանք բնակվում են տարբեր բնակավայրերում:

S. t. armenica Stegm. տարածված է Հայկական ՍՍՌ-ի հարավի կիսաանապատում և ֆրիգանոիդ բուսականության գոտայում (Իրանական պրովինցիա, Արաքսի հովիտ, Այրարատ և Դարալագյազ վայրերը):

S. t. rubicola L. տարածված է Հայկական ՍՍՌ-ի հյուսիսային շրջանների բաց տարածություններում (Արևելյան-Միջերկրածովային պրովինցիա, Կովկասյան շրջան, Փոքր Կովկասի անտառային վայրեր):

S. t. variegata Gm. բնակվում է Հայկական բարձրավանդակի և Արաքսի հովտի լեռնատափաստանային, սուբալպյան և ալպյան գոտաներում:

**Data on the Distribution of Black-headed Stonechat (*Saxicola torquata* L.)
in the Armenian SSR**

According to the data existing in literature, two subspecies of black-headed stonechats (*Saxicola torquata rubicola* L. and *Saxicola torquata variegata* Gm.) are known to inhabit the territory of the Armenian SSR.

On revising the definitions given to the birds of this species, which are to be found in the collections of the Zoological Institute of the Academy of Sciences of the Armenian SSR, it is established that here there exists a third subspecies as well—Armenian blackheaded stonechat (*Saxicola torquata armenica* Stegm.). The description of this species was made in 1935, but the latter was not mentioned to occur in Armenia.

The distribution of these three subspecies of black-headed stonechat in Armenia is confined to definite zoogeographical territories, and if in one zoogeographical province there occur simultaneously two subspecies, these are found to inhabit different localities.

The Armenian black-headed stonechat (*S. t. armenica* Stegm.) is distributed in semideserts and in the zone of frigid vegetation of the south Armenian SSR.

The European black-headed stonechat (*S. t. rubicola* L.) is distributed on open lower areals in northern regions of the Armenian SSR.

The Transcaucasian black-headed stonechat (*S. t. variegata* Gm.) inhabits the mountain steppes, subalpine and alpine zones of the Armenian highland and the Arax valley.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Г. П. Дементьев. „Доп. к т. т. I, II, III и IV „Полн. опред. птиц СССР“, 1941.
2. А. Ф. Ляйстер и Г. В. Соснин. „Материалы по орнитофауне Армянской ССР“, 1942.
3. Б. К. Штегман. ДАН СССР, 3 (8), № 1 (61), 1935.