

Материалы по питанию наземных птиц Полярного Урала

Н.Н.Данилов

Второе издание. Первая публикация в 1959*

Для выяснения особенностей существования птиц в суровых условиях Полярного Урала и приспособления к ним требуется внимательное рассмотрение различных сторон их биологии.

В двух районах (хребты Обе и Западные Саледы – 65°32' с.ш. и район реки Соби – 67° с.ш.) 29 июля-24 августа 1958 был собран материал по питанию 35 видов наземных птиц, состоящий из 271 желудка и остатков корма, который мы считаем нужным привести из-за отсутствия подобных сведений в литературе.

Сапсан *Falco peregrinus* и дербник *Falco columbarius* питались только птицами. В 3 желудках и 77 остатках корма мохноногого канюка *Buteo lagopus* были 76 грызунов (33 красных *Clethrionomys rutilus* и красно-серых *Clethrionomys rufocanus* полёвки, 21 пашенная *Microtus agrestis*, 18 узкочерепных *Microtus gregalis*, 3 серых полёвки, не определённых до вида, 1 северная пищуха *Ochotona hyperborea*) и 10 птиц (7 луговых коньков *Anthus pratensis*, 1 белобровик *Turdus iliacus* и 2 не определены).

В желудках двух ястребиных сов *Surnia ulula* были только грызуны.

В желудках и зобах тундровых куропаток *Lagopus mutus* преобладали листья и побеги куропаточьей травы, чины и копеечника тёмного, колоски осоки, ягоды толокнянки, шикши. ягоды голубики, найден один моллюск.

В желудке большого пёстрого дятла *Dendrocopos major* содержались муравьиные «яйца», гусеницы, личинки усачей. В 4 из 6 желудков трёхпалых дятлов *Picoides tridactylus* были 111 личинок усачей, в 3 – короеды и в единичных случаях личинки короедов, 1 мясная муха и измельчённые остатки жуков.

Питание вороновых было очень разнообразно. В желудках 2 серых ворон *Corvus cornix* обнаружены саранчовые, муравьи, коконы бабочек, гусеницы, измельчённые неопределимые остатки насекомых, ягоды морошки, зёрна и пищевые остатки. В желудке кедровки *Nucifraga caryocatactes* нашли красную полёвку, муравьиные «яйца», 2 перепончатокрылых, 5 гусениц, 6 коконов бабочек, 9 личинок жуков, 1 мертво-

* Данилов Н.Н. 1959. Материалы по питанию наземных птиц Полярного Урала
// Материалы по фауне Приобского Севера и её использованию. Тюмень: 387-389.

еда, ягоды морошки и кедровые орехи. В 5 желудках кукуш *Perisoreus infaustus* были 14 гусениц, 13 коконов бабочек, 12 личинок шмелей, 2 взрослых шмеля, 1 перепончатокрылое, 2 мухи, 1 личинка жука, 3 листогрыза, 7 личинок не определённых насекомых, измельчённые остатки жуков, 1 моллюск, 1 живородящая ящерица *Lacerta vivipara*, ягоды морошки и костяники. Гусеницы были в 3 желудках, коконы бабочек и шмели в 2, остальные – по 1.

Во всех желудках 3 снегирей *Pyrrhula pyrrhula* и 11 обыкновенных чечёток *Acanthis flammea* содержались семена травянистых, преимущественно зонтичных, растений и только у одной чечётки обнаружена 1 гусеница и измельчённые остатки насекомых. В 8 из 10 желудков щуров *Pinicola enucleator* имелись семена растений, в 3 – побеги ели, в 2 – ягоды морошки и гусеницы, в единичных – почки растений, семена ели, перепончатокрылые, яйца насекомых, личинки жуков и жуки.

В 6 из 16 желудков юрков *Fringilla montifringilla* были семена растений, в 6 найдено 17 гусениц, в 3 – листогрызы, в 2 – перепончатокрылые и пауки, по 1 разу комары, мухи, слюнявицы, слоники, личинки жуков, ягоды черники и шикши. В 15 из 20 желудков овсянок-крошек *Emberiza pusilla* содержались измельчённые остатки насекомых, в 5 – гусеницы, в 4 – листогрызы, в 2 – мухи, личинки жуков и ягоды черники, по 1 разу обнаружены комары, личинки не определённых насекомых и семена растений.

Белая *Motacilla alba*, горная *M. cinerea* и желтоголовая *M. citreola* трясогузки держались в одинаковых местах и питание их было сходно. В желудках были найдены мухи, комары, перепончатокрылые, остатки жуков и в 1 желудке белой трясогузки – личинки ручейников.

В желудках пятнистых коньков *Anthus hodgsoni* были измельчённые остатки насекомых. В 4 из 5 желудков краснозобых коньков *Anthus cervinus* были измельчённые остатки насекомых, в 2 – гусеницы, листогрызы, мухи, по 1 разу найдены личинки жуков и слоник. В 7 из 19 желудков лугового конька *Anthus pratensis* содержались листогрызы, в 5 – гусеницы (14 экз.), в 3 – слоники, в 2 – мухи, личинки насекомых, в 1 – усач, моллюск, в 15 – измельчённые остатки насекомых.

Питание пухляка *Parus montanus* и сибирской гаички *Parus cinctus* не различалось. Во всех 4 желудках были 19 гусениц, по 1 разу найдены 3 клопа, 1 муха и измельчённые остатки насекомых.

В желудках 3 камышевок-барсучков *Acrocephalus schoenobaenus* обнаружены 4 гусеницы, 3 слоника, листогрызы, 1 перепончатокрылое и измельчённые остатки насекомых.

В 9 из 16 желудков пеночек-таловок *Phylloscopus borealis* были листогрызы, в 5 – гусеницы (14 экз.), в 4 – мухи, в 1 – комары. В желудках 7 пеночек-весничек *Phylloscopus trochilus* содержались листогрызы (в 3), мухи и комары (в 3), измельчённые остатки насекомых.

В желудке рябинника *Turdus pilaris* были 2 саранчи, 3 гусеницы, 4 личинки мух, 1 слоник, в желудках 5 белобровиков *Turdus iliacus* – 7 гусениц, 8 слоников, 2 листогрыза, саранча, 1 паук, личинка не определённого насекомого, измельчённые насекомые и ягоды черники. В желудках 2 певчих дроздов *Turdus philomelos* – 7 листогрызов, личинки листогрызов, 5 гусениц, 1 жужелица, 1 моллюск и измельчённые остатки насекомых. В 11 из 16 желудков темнозобых дроздов *Turdus atrogularis* были обнаружены 214 гусениц, в 7 – листогрызы (9), в 4 – слоники (5), в 2 – усачи (5), личинки листогрызов, муравьи, перепончатокрылые, по разу – личинки насекомых, мухи, комары, личинки мух, шмель, жужелица, дождевой червь, в 3 желудках – ягоды черники и шикши.

В желудках 3 каменок *Oenanthe oenanthe* были 13 гусениц, 2 паука, 1 усач, 3 комара, 1 не определённый жук и измельчённые остатки насекомых. В желудках 3 черноголовых чеканов *Saxicola torquata* найдены 4 листогрыза, 2 усача и измельчённые насекомые. В желудках 2 горихвосток *Phoenicurus phoenicurus* обнаружены 1 гусеница, 1 щелкун и измельчённые остатки насекомых.

В 6 из 11 желудков варакушек *Luscinia svecica* были найдены гусеницы (13), листогрызы, в 2 – слоники (8), перепончатокрылые (2), в 1 – муравьи (12), личинки листогрызов (2), комары, 1 моллюск и в 6 – измельчённые остатки насекомых.

На основании приведённых данных видно, что на Полярном Урале представлены различные по типам питания птицы и многочисленные насекомоядные виды. Питание отдельных видов птиц не отличается склонностью ни к стенофагии, ни к эврифагии и сходно с питанием в более южных районах. Встречаемость отдельных видов корма, в частности разных групп насекомых, обусловлена в значительной мере их обилием.

