



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1104: 455-456

## О распространении серой куропатки *Perdix perdix* в районе Алма-Аты

В.А.Грачёв

Второе издание. Первая публикация в 1953\*

В однотомном определителе птиц СССР (Дементьев и др. 1948) южная граница распространения серой куропатки *Perdix perdix* дана очень неясно: «К югу – до Крыма, Закавказья, Сыр-дарьи, Тарбагатая, Зайсана и Бийска». Входят ли окрестности Алма-Аты в область распространения серой куропатки – понять трудно. В.Н.Шнитников (1949), обобщивший в своей книге «Птицы Семиречья» все материалы по птицам, собранные работавшими до него в этой местности учёными, указывает, что согласно данным И.А.Долгушина, серая куропатка встречается зимой в очень небольшом числе в низовьях реки Или. Кроме этого в коллекции Института зоологии Академии наук Казахской ССР находится два экземпляра серой куропатки: одна из них добыта Бейком 21 декабря 1916 в долине реки Чилик в зоне яблочника, другая – И.А.Долгушиным 15 октября 1934 на реке Каскеленке (окрестности Алма-Аты). Больше о распространении серой куропатки в нашем районе никаких данных нет. Из отрывочных наблюдений, сделанных мной во время охотничьих поездок и экспедиций, совершённых в 1950 году в пределах Алма-Атинской области, о распространении серой куропатки в данном районе можно сказать следующее. Серая куропатка найдена в 5 различных пунктах этой территории.

1). В 12 км севернее станции Алма-Ата-I на берегу реки Малой Алматинки в колхозном саду и бурьянах у села Дмитриевки наблюдалось 5 выводков. 30 июля молодые по величине уже не отличались от взрослых, но в одном из выводков они были ещё размером с перепела *Coturnix coturnix* и могли только перелетать метров до 30, а самка применяла все приёмы «отвода». В сентября большая часть выводков была истреблена местными охотниками, оставшиеся сбились в одну стаю

---

\* Грачёв В.А. 1953. О распространении серой куропатки (*Perdix perdix* L.) в районе Алма-Аты // *Тр. Ин-та зоол. АН КазССР* 2: 172-173.

штук в 30 и держались по кустарникам в окрестностях сада, улетаая не дальше 5-7 км от мест гнездования.

2). На берегу реки Малой Алматинки при её впадении в реку Каскеленку (50 км севернее станции Алма-Ата-I) 12 марта наблюдались две пары, уже занявшие гнездовые участки.

3). В 7 км севернее станции Алма-Ата-I, в окрестностях Приютского пруда и колхоза «Куянкоз» в августе, сентябре и октябре держались 3 выводка.

4). На берегу реки Или в 30 км ниже устья реки Курты (130 км к северо-западу от станции Алма-Ата-I) около базы колхоза «Политотделец» 15 октября наблюдались 3 стайки. Одна стайка жила рядом с базой, где её подкармливали и оберегали от охотников.

5). В зарослях чингила и тростника на берегу речки Иссык в 25 км от Илийска и в 15 км от берега реки Или 5 декабря была встречена одна стайка из 20 птиц и 21 декабря три стайки примерно такой же численности.

Нужно добавить, что во всех выше перечисленных местах нахождения серой куропатки *Perdix perdix* я нигде не видел бородастую куропатку *Perdix dauurica*.

Относительно давности расселения серой куропатки в указанных местах можно судить только по расспросным данным. Местные охотники встречали куропаток в указанных местах в 1949 году и раньше. Стайки куропаток, встреченные мною зимой по берегам рек Или и Иссык, являются местными птицами, так как встречались там и летом. Кочевые стаи, прилетевшие на зиму с севера, не наблюдались.

Кроме этих пунктов, куропатки встречены и во многих других, но утверждать, что это были также серые куропатки, нельзя, так как они добыты не были, а отличить на лету серую куропатку от бородастой невозможно.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что по левобережью реки Или в пределах Алма-Атинской области серая куропатка широко распространена и в некоторых местах встречается даже в большем количестве, чем бородастая куропатка.

#### Л и т е р а т у р а

Дементьев Г.П., Гладков Н.А., Птушенко Е.С., Судиловская А.М. 1948. *Определитель птиц СССР*. М.: 1-450.

Шнитников В.Н. 1949. *Птицы Семиречья*. М.; Л.: 1-665.

