птицы на север связано, безусловно, с окультуриванием ландшафта. Деревня Чурки является пока точно установленным северным пунктом её гнездования.

Малая кукушка *Cuculus poliocephalus*. Поющий самец отмечен в урочище Тигровая падь 21 июня. Хребет Даур является самым северо-западным местом обнаружения малой кукушки.

Широкорот *Eurystomus orientalis*. Добыт в урочище Тигровая падь 21 июня. Птица оказалась самкой, но гнездование её не установлено.

Рыжешейная овсянка *Emberiza yessoensis*. У деревни Чурки 18 июня добыт самец, который пел на гнездовом участке.

Клинохвостый сорокопут *Lanius sphenocercus*. Пара птиц отмечена на полях в окрестностях деревни Самара 24 июня 1963.

Рассматривая ареалы пятнистой трёхперстки, рыжешейной овсянки и клинохвостого сорокопута, приходим к выводу, что проникновение их на территорию ЕАО произошло с юга, скорее всего, по долине реки Сунгари. Следует отметить, что нахождение за короткий период в ЕАО этих видов указывает на плохую изученность орнитофауны региона.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск **1918**: 2002-2003*

Тетеревиные птицы Витимского плоскогорья

И.В.Измайлов

*Второе издание. Первая публикация в 1965**

Тетеревиные птицы Витимского плоскогорья представлены каменным глухарём, тетеревом, рябчиком, белой и тундряной куропатками. Все они (исключая тундряную куропатку *Lagopus mutus)* играют значительную роль в охотничьем хозяйстве севера Бурятии, составляя основу заготовок пернатой дичи.

Каменный глухарь *Tetrao parvirostris*. Населяет лиственничную и сосново-лиственничную тайгу с голубикой и брусникой на водоразделах, горных склонах и в падях с ключами и ерниковыми болотцами. Токование птиц начинается в третьей декаде апреля и продолжается обычно до конца мая. Период насиживания яиц приходится на конец мая – июнь. Птенцы появляются в конце июня – начале июля, в конце июля встречаются уже лётные глухарята. Основу зимнего питания ка-

* Измайлов И.В. 1965. Тетеревиные птицы Витимского плоскогорья // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 143-145.

менного глухаря составляют почки и побеги даурской лиственницы и кустарниковых берёзок. Учёт птиц в тайге южной половины плоскогорья показал следующую плотность глухарей на 1000 га угодий: июль 1956 года – 9 особей (маршрут 200 км), ноябрь 1959 – 8 особей (маршрут 250 км), июнь и июль 1960 – 7 особей (маршрут 600 км). Летом учёт проводился на маршрутной полосе шириной в 30 м, осенью (учёт с собакой) – шириной в 100 м.

Тетерев *Lyrurus tetrix*. Населяет лиственнично-берёзовые колки и перелески вблизи полей, опушки и участки разреженного леса (Еравна), опушки лиственнично-ивовых рощиц (Баунтовская котловина). Токование начинается в конце апреля, достигая максимума в первой декаде мая. В первой половине июля наблюдаются выводки подлётков, а в августе встречаются полностью оперённые молодые птицы. Зимний корм тетерева состоит главным образом из серёжек, веточек и почек берёзы. Численность тетеревов всюду невысокая. В южной части плоскогорья летом 1960 года плотность их населения на 1000 га угодий не превышала 6, осенью – 5 птиц.

Рябчик *Tetrastes bonasia*. Населяет лиственничные и берёзово-лиственничные леса с хорошим подлеском и ягодным кустарничковым ярусом, молодые лиственничники в падях с брусничником и зелёными мхами. Выводки пуховичков появляются во второй половине июня. С середины июля встречаются молодые птицы на крыле. В июле 1960 года на 1000 га угодий приходилось в среднем 4, осенью – 6 птиц (осенью ширина учётной полосы принималась за 75 м), в 1956 году – менее 1 рябчика.

Белая куропатка *Lagopus lagopus*. Распространена преимущественно в северной половине Витимского плоскогорья и на Становом нагорье, где гнездится не только в подгольцовом поясе, но и в долинах горных речек – в заболоченном редколесье с кустарниковыми берёзками и ивами в подлеске. Осенью и зимой стаи белых куропаток спускаются с гор в долинные леса и широко кочуют по тайге.

Промысел белой куропатки (как, впрочем, и других тетеревиных птиц) по существу не организован. На многих участках тайги заготовки её могут быть увеличены во много раз.

Для Витимского плоскогорья характерна низкая плотность населения тетеревиных птиц, что, по-видимому, объясняется в первую очередь резко неблагоприятными условиями погоды в период инкубации кладок и в первые дни жизни птенцов. В снижении численности птиц определённую роль играют также наземные и пернатые хищники, заболевания, лесные пожары и другие факторы смертности.