

Самка от первого гнезда линяла в первый годовой наряд. Эти данные служат подтверждением того, что в Западном Тянь-Шане спорадически гнездятся задержавшиеся на весеннем пролёте отдельные пары северного подвида *A. n. nissus* или *A. n. nissosimilis*.

В конце лета в Западном Тянь-Шане изредка встречаются молодые перепелятники довольно тёмного типа, систематическое положение которых не ясно из-за ограниченности материала (один самец добыт 10 августа 1954 на Угаме, второй – 26 июля 1964 в долине Аксу). Птицы к тому же не однотипны.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1908: 1624-1625

О биологии рябинника *Turdus pilaris* в Красноярском крае

Г.С.Кисленко

Второе издание. Первая публикация в 1965*

Материал собран в 1959-1961 годах в окрестностях села Большой Кемчуг Емельяновского района Красноярского края, где обитает 8 видов дроздов. Самый многочисленный – рябинник *Turdus pilaris*, затем чернозобый *Turdus atrogularis*, певчий *Turdus philomelos*, белобровик *Turdus iliacus*, пёстрый *Zoothera varia*, оливковый *Turdus obscurus*, деряба *Turdus viscivorus*, сибирский *Zoothera sibirica*.

Весной рябинники появляются в середине апреля. В конце апреля держатся ещё стайками, но некоторые уже приступают к гнездованию. Первые кладки из 3 и 4 свежих яиц нашли 24 апреля 1961. К началу второй декады мая гнездятся уже все птицы. 16 мая 1961 из 20 осмотренных гнёзд в 19 были полные свежие и насиженные кладки, в одном – 6 1-2-дневных птенцов.

Рябинники гнездятся обычно большими сообществами. На дереве бывает по одному гнезду и лишь очень редко – 2 или 3. Совместно с рябинниками гнездятся другие дрозды, юрки *Fringilla montifringilla*, серые мухоловки *Muscicapa striata*, серые сорокопуты *Lanius excubitor*.

Гнёзда рябинники строят на высоте от 0.5 до 18 м. Из 179 гнёзд на соснах располагалось 49, на елях – 8, на пихтах – 4, на лиственницах – 4, на кедре – 1, на берёзах – 56, на ивах – 22, на осинах – 5, на черёмухе – 1, на сухостойных деревьях – 7, на поваленных деревьях – 13 и на

* Кисленко Г.С. 1965. О биологии рябинника в Красноярском крае // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 159-160.

пнях – 9. По высоте гнёзда располагаются следующим образом (179): до 1 м – 5; 1-2 м – 20; 2-3 м – 31; 3-4 м – 30; 4-6 м – 46; 6-8 м – 28; 8-10 м – 10; 10-15 м – 6; 15-20 м – 3 гнезда. На боковой ветви у ствола находилось 64 гнезда, на боковой ветви в удалении от ствола – 21 (17 на соснах), в развилках ствола и в «мутовках» у хвойных – 50, на пнях – срезанной части ствола – 12, на поваленных деревьях – 15, на изломах стволов – 3, в полудуплах – 3. Два гнезда располагались на прошлогодних гнёздах. Их высота – 192 и 220 мм. Размеры гнёзд сильно варьируют. Средние размеры 28 гнёзд, мм: диаметр гнезда 140, диаметр лотка 109, высота гнезда 134, глубина лотка 72.

В году – одна кладка, содержащая 3-8, но чаще 6 яиц (89%). Повторные кладки состоят из 3-4 яиц. Из 150 осмотренных кладок 8 яиц было в 1, 7 – в 11, 6 – в 66, 5 – в 66, 4 – в 4, 3 – в 2 кладках.

Вес 11 насиженных яиц 4.45-8.0, в среднем 6.35 г. Размеры 22 яиц, мм: 24.6-32.9×19.1-22.9, в среднем 29.3×20.4. Обычно одно-два последних в кладке яйца более светлого тона, чем остальные.

Насиживание длится 12 сут. Птенцы появляются в течение 1-2 сут и остаются в гнезде 12-14 сут, но иногда покидают его раньше. Птенцов рябинники выкармливают в основном дождевыми червями. Первые слётки отмечены 27 мая 1959, 29 мая 1961, а хорошо летающие слётки – 30 мая 1961 на холмистом правобережье Большого Кемчуга. Массовый вылет птенцов зарегистрирован 28-31 мая 1959, 6-7 июня 1960 и 4-6 июня 1961. Несмотря на очень дружный вылет птенцов, 6 июня 1960 найдены неполные кладки в 3 и 4 яйца, 13 июня 1961 в яйцевом дождевой самки было готовое к откладке яйцо, 29 июня 1961 нашли гнездо с 3-4-дневными птенцами. Молодые достигают размеров взрослых в конце июня – начале июля.

В начале второй декады июля молодые сбиваются в стаи по 20-40 и более птиц, которые посещают покосы, кормятся по опушкам леса, на жимолости и красной смородине.

Во второй декаде июля наблюдаются смешанные стаи из рябинников, чернозобых и певчих дроздов. В конце июля – начале августа значительная часть местной популяции откочёвывает из пределов стационара, уступая место кочующим особям других популяций. Во второй декаде августа основная масса рябинников заканчивает линьку.

По сообщению местного охотника, в годы урожая рябины рябинников можно встретить здесь в декабре и январе.

Гибель кладок и птенцов рябинника очень незначительна. Остатки слётков находили в желудках бородатой *Strix nebulosa* и длиннохвостой *S. uralensis* неясытей и в гнезде перепелятника *Accipiter nisus*.

