

рок. Сорочье гнездо с хорошо сохранившимся верхом было достроено галками. Лоток гнезда был выстлан галками шерстью и лыком. Один из боковых выходов из гнезда галки заделали, заткнув его тряпками. В гнезде находилась кладка из 2 яиц. В этом гнезде галки вырастили одного птенца.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1927: 2351-2352

Изменения условий линьки уток в дельте Волги

Г.А.Кривоносов

*Второе издание. Первая публикация в 1965**

Дельта Волги известна как район массовой линьки уток, гнездящихся на территории европейской части СССР, Казахстана и Западной Сибири. До падения уровня Каспия линька уток проходила на водоёмах всех зон дельты: в ильменах верхней, средней и нижней зон и в култуках (заливах) приморской полосы. С падением уровня моря и исчезновением многих ильменей основным районом линьки уток стала култучная зона и примыкающая к ней верхняя (по течению) часть новообразовавшейся обширной акватории авандельты, а впоследствии — преимущественно авандельта, особенно её островная зона.

В последние годы акватория авандельты стала чрезвычайно интенсивно зарастать надводной и погруженной водной растительностью. Для формирования «тока» линных уток в определённом участке водоёма необходим комплекс условий, в котором наряду с высокой кормностью и защитностью станции большое значение имеет достаточная проточность водоёма. До периода зарастания акватории авандельты этому условию отвечала длинная полоса култучной зоны и верхней части авандельты, на всей протяжённости которой проточность была оптимальной для существования крупных «токов» линяющих уток, а основными факторами, определяющими их образование на том или ином участке акватории, были кормность и защитность станции. В процессе зарастания количество участков, пригодных для образования «токов», постепенно уменьшалось, особенно в култучной зоне, наиболее подверженной зарастаемости, поэтому «тока» стали перемещаться в авандельту в районы южных (точнее морских) мысов островов и в межостровные пространства. Однако в настоящее время комплекс условий, не-

* Кривоносов Г.А. 1965. Изменения условий линьки уток в дельте Волги // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 199-200.

обходимый для существования «токов», встречается в авандельте реки Волги (включая её островную зону) реже, чем он имелся до зарастания взморья. Таким образом, если в период падения уровня Каспия происходило преимущественно смещение «токов» в сторону моря, то в течение последнего десятилетия и в настоящее время имеет место не столько смещение «токов», сколько сокращение общей площади, пригодной для линьки уток. Определяющим фактором этого процесса является уменьшение проточности вследствие зарастания районов линьки.

В современных условиях основные концентрации уток на линьке в низовьях дельты приурочены к районам наибольшего стока Волги, то есть к наиболее проточным участкам взморья: в восточной части – между Блиновской и Тишковской косами, в западной – между Главным и Кировским банками. На эти районы приходится 77% всего стока Волги и более 70% от количества линяющих в низовьях дельты уток.

В случае понижения уровня Каспийского моря авандельта, особенно её островная зона, превратится в систему очень мелководных слабо проточных озеровидных водоёмов и условия линьки уток вследствие сокращения пригодных участков ещё более ухудшатся.

С целью создания лучших условий обитания для линных уток в 1964 году в Астраханском заповеднике в опытным порядке было произведено прокашивание водной растительности на участках островной зоны авандельты, где в результате зарастания «тока» исчезли ещё в предшествующем году. В итоге в местах с возросшей проточностью отмечено формирование «токов». Важнейшим условием сохранения угодий низовьев дельты как резервата линных водоплавающих птиц является проведение в больших масштабах работ по увеличению проточности районов линьки путём прокашивания водной растительности.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1927: 2352-2353

Встреча стерха *Grus leucogeranus* в дельте Волги осенью 2013 года

Г.М.Русанов

Второе издание. Первая публикация в 2014*

13 октября 2013 на Дамчикском участке Астраханского заповедника в западной части дельты Волги (45°43' с.ш., 47°52' в.д.) мною встре-

* Русанов Г.М. 2014. Встреча стерха в дельте Волги осенью 2013 г.
// Информ. бюл. Рабочей группы по журавлям Евразии 13: 45-46.