Некрасов М.К. Опыт одомашнения гаги в Соловецком биосаде // «Живая природа» № 23. 1925. Стр. 308-310.

Опыт одомашнения гаг в Соловецком Биосаде.

Соловецкий Биосад в первый год своего существования был занят, главным образом, строительными работами. В апреле и мае 1925 г. спешно готовились садки. С некоторым опозданием, но все же было приступлено к сбору птенцов и яиц на маленьких островах Белого моря. Так как за время революции на севере занимались хищническим собиранием гагачьего пуха и яиц, то последнее время там, где прежде были целые гагачьи базары, гага появляется в небольшом количестве и старается держать себя вдали от человека. Ценна гага, главным образом, своим пухом, который в настоящее время дошел до 80 и больше рублей за фунт. Яйца ее очень крупные, как обыкновенные гусиные, и очень приятные на вкус, В годы революции гаге пришлось пострадать не только на Белом морс. Ее мирная жизнь была нарушена и на Новой земле, где были большие гагачьи базары. По последним сведениям норвежцы вывозили оттуда миллионами яйца и пух. В этом году в Соловецком Биосаде было решено проделать опыт одомашнения гаг. Были приняты меры к изготовлению инкубатора собственными силами, но постройка его затянулась на продолжительное время, и поэтому надежды на инкубатор были отложены до будущего лета; пришлось прибегнуть к другому, более упрощенному способу. На простой русской печке были поставлены простые ящики с тонким слоем гагачьего пуха на дне каждого ящика, и туда клались в один ряд взятые с гнезд, уже насиженные гагачьи яйца. Необходимая температура поддерживалась без термометра, так как в распоряжении Биосада не было ни одного термометра этим также об'ясняется и то, что сделанный инкубатор не мог быть использован в этом году. Всего гагачьих яиц было собрано 189

шт., из них вывелось птенцов 157 шт., 32 яйца оказались погибшими. Нельзя сказать, чтобы появившиеся в Биосаде птенцы была в отличных условиях, так как постройка летних помещений еще только заканчивалась, и птенцов приходилось переносить с одного места в другое в неприспособленных ящиках. Но тем не менее, покамест уход за ними был хороший, в течение восемнадцати дней не было ни одного смертного случая. Первые дни кормили птенцов вареными яйцами, которые для этого собирались с гнезд крахалей. Мелко порубленное вареное яйцо опускалось в воду, и, птенцы его вылавливали. На четвертый и пятый день добавлялась крапива и в небольшой пропорции пшенная каша. Спустя две недели уже давалась мелконарубленная свежая рыба. Часто менялась вода и песок, помещение держалось в чистоте. Человека, ухаживающего за ними, они хорошо знали и при его появлении бежали навстречу.

Уход за ними был поручен бывшей школьной работнице М. А.Гальчевской. Если птенцы начинали чувствовать приближение опасности, то быстро бросались все к своей воспитательнице. Когда их выпускали из изгороди специально для них изготовленной, они быстро направлялись по дороге, усыпанной песком, и шли за человеком не сходя с дороги в сторону. Такое путешествие совершалось на расстоянии одной версты от Биосада и почти ежедневно в хорошую погоду. По дороге, во время прогулки, птицы находили для себя корм, на который с жадностью набрасывались. Целыми партиями преследовали встречавшуюся муху или комара. Бегали очень быстро, но в тоже время сами старались далеко от своей кормилицы не убегать, и стоило невдалеке появиться вороне, как они сразу все бросались к ногам Гальчевской. Она их приучила к тревожному сигналу, и когда нужно было собрать всех птенцов, достаточно было дать тревожный сигнал, как они немедля собирались. Настолько эти птенцы были интересны в забавны, что посетители приходили в Биосад ежедневно целыми партиями, главным образом для того, чтобы

посмотреть на большую партию милых, дружно живущих питомцев Соловецкого Биосада.

Характерно то, что если пускались к первым выводкам вновь появившиеся гаганята, старшие их охотно принимали в свою среду, и даже проявляли к ним некоторую заботливость, но стоило пустить к ним утенка другой породы, как они начинали его выживать из своей среды и даже совсем заклевывали. В взрослом состоянии это уже не наблюдается. Покамест уход за ними был хороший, пища ежедневно свежая, чистая, они чувствовали себя хорошо и быстро росли. Как уже упоминалось выше, в самый опасный возраст, в течение 18 дней не было случая гибели ни одного птенца. Но насколько важен правильный уход за ними, можно судить потому, что с момента нарушения за ними ухода (резкая перемена в питании, недостаточно чистое помещение) несчастные гаганята начали гибнуть. Случилось так, что в самый опасный для них возраст, главный покровитель животных на Соловецких островах, председатель Соловецкого Отд. Архангельского О-ва Краеведения Федор Иванович Эйхманс был в продолжительной отлучке в Москве, администрация Биосада, по необходимости, находилась в отлучке и ей пришлось возвратиться обратно только спустя три недели. За это время успело перебывать три заведующих Биосадом. Прекратилась доставка свежей пищи. Были случаи, когда вся птица была накормлена мелкой колюшкой, а от этой самой колюшки даже щука погибает, если случайно ее проглотит. Первоначальные условия существования птенцов резко изменились. Птенцы начали гибнуть десятками.

В результате через короткий промежуток времени из партии 157 гаганят осталось всего 13 штук. Были приняты меры, чтобы спасти оставшихся 13 молодых гаг. Уцелевшие молодые гаги в настоящее время на столько выросли и окрепли, что уже не требуют такого внимательного за ними ухода. Они уже немногим отличаются от старых, девяти самок, пойманных на море.

16 сентября при взвешивании старой гаги и молодой оказалось, что старая гага весит 2,92 кг., длина ее 0,64 м., размах крыльев 0.76 м. Молодая гага, выводка 5-го июля, весит 2,65 кг., длина 0,58 м., размах крыльев 0,72 м. Молодые гаги настолько ручные, что их смело можно брать руками. Обыкновенные домашние утята гораздо больше дичатся. Если молодые гаги отдыхают в садках на усыпанной песком дорожке, то проходящей женщине, ухаживающей за ними, сами дорогу не уступают. Их можно брать руками и пересаживать на другое место. Старая самка цвета ржавого с бурыми продольными пятнами на голове и шее, и черными пятнами на остальном теле, нижняя сторона темнобурая. Ноги довольно короткие с большими лапами. Клюв довольно длинный и высокий, он как бы продолжается по обеим сторонам головы на лоб в виде неоперенной полоски. Самка гораздо меньше самца. Сколько будет самцов среди семнадцати молодых, пока еще с уверенностью сказать нельзя, так как птенцы еще находятся в юношеском наряде. Вообще же взрослого самца легко отличить от самки. У самца цвет сверху белый, кроме верхней части головы, нижняя сторона черная, на груди буроватый налет. В странах, где гагу охраняют, пух берут из гнезда по окончании высиживания. У нас на севере добывание пуха производится самым хищническим образом. На островах Белого моря, просто разоряют гнезда, забирая и яйца и пух, результатом чего, конечно, является постепенное падение промысла. В настоящем году председателем Соловецкого Отд. Арх. О-ва Краев, были приняты решительные меры борьбы с браконьерством и уже заметно сократилось число разоренных гнезд. Если в 1924 г. их насчитывали 95%. то в этом 1925 г. не более 60%. На Соловецких островах при правильной постановке дела можно все гагачьи гнезда брать на учет. Самка кладет от 3—8 яиц и в редких случаях до 12 яиц. Одно гнездо дает 1/15 фунта пуху. У нас гага кроме Ледовитого океана и Белого моря, водится в Ботническом и Финском заливах.

К лету 1926 года в Соловецком Биосаде готовят помещение на 1000 гаг, но это, конечно, не является главной

задачей Биосада. В данный момент ведутся наблюдения за уцелевшими гагами и готовится им зимнее помещение, где они могли бы в сносных условиях перезимовать. Несмотря на все неудобства, которые были при первом опыте одомашнения гаг, все же удалось довести до взрослого состояния некоторое количество птиц, и таким образом первые стадии содержания гаг в неволе с целью их одомашнения можно считать удавшимися. Остается предоставить гагам зимой сносные условия существования, чтобы весной добиться спаривания их, гнездования и кладки яиц уже в летних садках. В случае благоприятных результатов содержание гаг и разведение их в неволе можно было бы считать вполне осуществимым.

Зав. Сол. Биосадом М. Некрасов
Остров Соловки.