

5249 (XXV, 2-3)

ИЗВѢСТИЯ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАГО ОТДѢЛА
ИМПЕРАТОРСКАГО Русского
Географического Общества.

подъ редакцію Правителя дѣлъ

Я. П. Прейна.

ТОМЪ XXV.

№ № 2 - 3.

СОДЕРЖАНИЕ:

1948

90

Стр.	
Еленевъ А.	Сообщеніе о Бирю- синскихъ пещерахъ за 1888 г.
Адріановъ Г. В.	Техническій отчетъ объ устройствѣ цемент- наго завода въ Забайкальѣ
Прейнъ Я.	Списокъ растеній, найденныхъ въ окр. с. Маль- тинскаго Иркутскаго округа на р. Бѣлой.

Стр.	
Поповъ И. И.	Открытия на Ор- хонѣ и дешифрированіе древ- нихъ надписей
Смысъ: Свѣдѣнія объ экспеди- ціи Д. А. Клеменца по Монго- ліи, въ 1894 г.	102
Першинъ Д.	Фламинго въ Си- біри
	126
	См. на оборотѣ.

г. Иркутскъ.

Типографія К. І. Витковской.

1894.

Стр.	Ст	
Чистохинъ И., свящ. миссіонеръ. Материалы по народному твор- честву монголовъ	134	
Пихтинъ М. В. Свѣдѣнія о пушнинѣ, кабарговой струѣ и мамонтовой кости на Якутской ярмаркѣ 1894 года	142	Прогрессъ въ Китаѣ съ 1860 г. Les progrès en Chine depuis 1860.
Библіографія: Н. Высоцкій. Ге- ологическая изслѣдованія въ чер- ноземной полосѣ Западной Си- бири. Я. Прейна.	143	Par M. Ly Chao Pee, Mandarin de 5-e classe, secrétaire—interprète de la Mission chinoise d'Instruction en Europe. Переводъ съ франц. Вѣры Алекс. Поповой.
А. Н. Красновъ. Травяные степи сѣверного полушарія. Я. Прейна.	154	Приложение. Отъ ИМПЕРАТОР- СКАГО Общества АККЛИМАТИЗА- ЦІІ ЖИВОТНЫХЪ И РАСТЕНИЙ. О составленіи гербаріевъ Замѣтки о собираніи и сохра- неніи растеній
		171 180
		Объявленія
		185



Печатано по распоряженію Восточно-Сибирскаго Отдѣла ИМПЕРАТОРСКАГО
Русскаго Географическаго Общества.

небольшая коллекция жесткокрылыхъ и прямокрылыхъ (около 2,000 экземпл.), 120 фотографическихъ снимковъ.

Коллекции, собранныя г. Лушниковымъ, по условію остались въ распоряженіи путешественника.

ФЛАМИНГО ВЪ СИБИРИ.

(*Phoenicopterus roseus*, Pall.).

Въ орнитологической литературѣ существуетъ не мало наблюдений относительно «залёта» нѣкоторыхъ видовъ птицъ далеко за черту ихъ распространенія. Этому любопытному явлению орнитологъ Н. А. Зарудный придаетъ немалое значеніе и въ своемъ капитальномъ труде «Орнитологическая фауна Оренбургского края» указываетъ, что зоологическое изслѣдованіе этой страны открыло чрезвычайное богатство въ такихъ формахъ птицъ, присутствіе которыхъ можно обозначить словомъ «залётъ». Характернымъ примѣромъ въ этомъ отношеніи можетъ служить появление саджи (*Syringoptes paradoxus*) въ предѣлахъ Европы — формы чисто азіатской. Натуралистъ Н. А. Сѣверцевъ при изслѣдованіи вертикального и горизонтального распределенія туркестанскихъ животныхъ, отмѣчая периодическія явленія въ жизни птицъ, помѣщаетъ въ фаунистическихъ спискахъ виды, «заблудящіеся при пролёте» (*transvolans erraticus*). Такимъ образомъ, не смотря на то, что для каждого вида существуютъ строго опредѣленные пролётные пути, нѣкоторые формы птицъ проявляютъ стремление къ бродяжничеству. Къ числу такихъ видовъ можно отнести и фламинго, относительно залётовъ котораго имѣется не мало данныхъ, приводимыхъ мною ниже. Но прежде чѣмъ говорить объ этомъ, скажу объ области распространенія этой птицы. Краснокрыль или фламинго гнѣздится въ Европейской Россіи въ бассейнѣ Средиземнаго моря на пологихъ берегахъ сѣверной Африки, а также въ западной части южной Азіи въ Индіи. Въ Россіи же излюбленнымъ мѣстомъ гнѣzdованія краснокрыла служить

восточное и съверное побережья Каспійского моря и соляные озера киргизскихъ степей. Въ Закавказье же и на юго-западномъ побережии Каспія птица эта, какъ говоритъ профессоръ М. А. Мензбиръ, не гнѣздится, прилетая сюда лишь на зимовку, при чмъ въ очень рѣдкихъ случаяхъ краснокрылы залетаютъ на черноморское побережье и, между прочимъ, въ Крымъ. Въ киргизскихъ степяхъ по свѣдѣніямъ В. Е. Яковлева они гнѣздятся на широтѣ Черного яра по 48° с. ш., но весьма возможно, что это не съверный предѣль ихъ гнѣзовья¹⁾). Натуралистъ Эверсманъ указалъ на то, что краснокрылы залетаютъ на Ураль до $52-53^{\circ}$ с. ш., а по Волгѣ до Сызрани. Подъ Оренбургомъ Н. А. Зарудный ихъ видѣлъ въ 1883 году на лугахъ по Сакмарѣ, а во время проѣзда черезъ Троицкъ слышалъ, что одного видѣли на Славныхъ озерахъ²⁾). Относительно залѣтѣ фламинго въ Западную Европу (одинъ разъ до Рейна), у Брэма приведено нѣсколько случаевъ, при этомъ Брэмъ говоритъ, что залетали молодыя особи съ береговъ Средиземнаго моря. На востокъ отъ мѣстъ своихъ гнѣзований краснокрылы залетаютъ еще дальше. Академикъ Плеске въ обзорѣ туркестанскихъ птицъ упоминаетъ о фламинго. Съверцевъ-же, помѣщая эту птицу въ своихъ систематическихъ таблицахъ туркестанской фауны, отмѣчаетъ ее какъ видъ, заблудящійся при пролѣтѣ, при этомъ показываетъ также и вертикальное распространеніе этого вида, отводя ему мѣсто въ поясѣ саксаульниковъ и солонцовъ до $600-1000'$ и въ поясѣ травянистыхъ степей до $3-4000'$. Приимай во вниманіе данные Съверцева относительно вертикального распространенія этого вида, можно предполагать, что значительныя горы или возвышенности для фламинго представляются непреодолимыми преградами, а потому при залѣтахъ его на востокѣ путь краснокрыла долженъ лежать въ съверо-восточномъ направлениі вдоль массивовъ горъ, окаймляющихъ средне-азіатское плоскогоріе. Это предположеніе на-

¹⁾ Мензбиръ. Птицы Россіи.

²⁾ Ibidem.

ходитъ подтверждение въ сообщеніи г. Мельникова¹⁾, что подъ параллелью Омска иногда появляются какъ будто случайно занесенные бурями и непогодою фламинго, розовые скворцы и друг. птицы. Фламинго здѣсь появляются очень рѣдко и всегда не-на-долго, въ 30-лѣтній періодъ на Пртыѣ появился трижды, большою частью въ началѣ іюня послѣ урагановъ. Другихъ свѣдѣній относительно залёта этой птицы въ Западную Сибирь не имѣется.

Что-же касается до появленія краснокрыла въ Восточной Сибири, то Радде упоминаетъ, что въ 50 годахъ былъ убитъ фламинго около истока р. Ангары, скелетъ котораго поступилъ въ Иркутскій музей. Затѣмъ Р. К. Маакъ въ обзорѣ животныхъ Восточной Сибири говоритъ, что 10-го октября 1853 г. на островѣ Ангары около Иркутска былъ убитъ краснокрылъ. Это была, по словамъ Маака, молодая птица, которая, вѣроятно, выбившись изъ силъ, отстала отъ другихъ при перелёте и залетѣла случайно въ страну, где до сихъ поръ ее не замѣчали. Зобъ ея наполненъ былъ мелкими камешками и раковинами (*Planorbis*).

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ нѣкоторые изъ Иркутскихъ охотниковъ разсказывали, что видѣли какую-то большую голенастую птицу, съ изогнутымъ клювомъ, по описанію походящую на фламинго. Разсказы эти оказались не безосновательными и фактическимъ подтвержденіемъ ихъ служатъ появление краснокрыловъ во второй половинѣ октября текущаго года, въ 26 верстахъ отъ Иркутска, около деревни Баушевой и на берегу Байкала между станціями Култукъ и Муравьево-Амурской.

Охотникъ Г. А. Фофоновъ, убившій фламинго²⁾ около деревни Баушевой, разсказываетъ, что онъ послѣ полудня 22-го октября встрѣтилъ краснокрыла въ сообществѣ двухъ другихъ птицъ въ курѣ рѣки Пркута. Въ этомъ мѣстѣ, какъ ему говорилъ одинъ крестьянинъ, птицы эти жили уже около двухъ недѣль.

¹⁾ Охот. газета 1888 г. № 19.

²⁾ Купленъ музеемъ.

На Байкалъ того-же числа въ седьмомъ часу утра, ефрейторъ охотничьей команды Иркутскаго баталіона Мазутовъ убилъ краснокрыла во время сна, когда птица стояла на одной ногѣ, спрятавъ голову подъ крылѣ ¹⁾.

Оба убитые экземпляра, судя по оперенію ихъ и цвету радужины, принадлежать къ молодымъ особямъ, причемъ наиболѣе молодымъ оказался экземпляръ, убитый на берегу Байкала.

Считаю не лишнимъ привести иѣкоторыя данныя, касающіяся систематического ихъ описания, но, къ сожалѣнію, данные эти не полны, такъ какъ дѣло пришлось иметь съ экземплярами уже начучеленными.

Господствующій цветъ оперенія этихъ птицъ (на головѣ, шеѣ, спинѣ, груди, брюхѣ, хвостѣ и на части кроющихъ перьяхъ крыльевъ) грязновато-сероватый, на экземпляре, убитомъ на Байкалѣ, иѣсколько светлѣе и почти безъ розового отлива, который замѣтенъ лишь на внутренней сторонѣ крыльевъ; маховые перья черные, причемъ часть ихъ, около очина, светлая; кроющие перья съ неправильными поперечными полосами; у Фламиingo, убитаго около Баушевой, на крыльяхъ черныхъ пятенъ больше, онъ вообще темнѣе и у него ясно замѣтна розоватость оперенія. Часть кроющихъ перьевъ у обѣихъ птицъ съ черными ободками по краямъ съ черными веретенцами. Клювъ на вершинѣ черный, на изгибѣ желто-грязно-серый, бока нижней челюсти съ легкимъ розоватымъ оттенкомъ, а при основаніи свинцово-грязный, переходящій въ светлый оттенокъ. Радужина свинцово-серая. Ноги черные и такого-же цвета плавательная перепонка между пальцами. Длина экземпляра убитаго около Байкала 196 сантиметр., длина клюва— $13\frac{1}{4}$ сант., хвоста—14 с., плюсны—20 с., средняго пальца съ когтемъ—8 с., крайняго пальца—7 с., крайняго маховаго пера—24 с. Длина фламиingo убитаго около Баушевой—114 сантимет., длина клюва—14 сант., хвоста—

¹⁾ Благодаря любезности баталіоннаго командира этотъ экземпляръ поступилъ въ музей, какъ даръ охотничьей команды Иркутск. резервн. батал.

15 сант., плюсны — $21\frac{1}{2}$ сант., средняго пальца съ когтемъ — 8 с., крайняго пальца — 7 с. и крайняго маховаго пера — 29 с. По вскрытии этого экземпляра охотникомъ, таковой оказался самцомъ; въ его желудкѣ найдена мелкая рыбешка — молька и пискарики.

Относительно появленія краснокрыловъ въ Восточной Сибири другихъ данныхъ не имѣется, кроме сообщенія препаратора иркутскаго музея г. Кирилова, который слышалъ отъ рыбопромышленниковъ о птицахъ, видѣнныхъ ими около Ангарска на островахъ Байкала, по описанію похожихъ на фламинго. Птицы этихъ они видѣли издали, проплывая мимо острововъ, въ то время, когда птицы игралі въ родѣ того, какъ танцуютъ журавли. Несомнѣнно, что это сеѢдѣніе нуждается въ тщательной проверкѣ.

Заканчивая настоящее сообщеніе о рѣдкихъ гостяхъ, долженъ сказать, что многія интересныя явленія изъ жизни животныхъ, вслѣдствіе малочисленности лицъ этимъ интересующихся, исчезаютъ безслѣдно никѣмъ не зарегистрированныя, а между тѣмъ, хотя бы въ жизни пернатыхъ, напримѣръ, явленія залёта и случайного гнѣздуванія могутъ пролить свѣтъ на иѣкоторыя туманныя и неясныя данія въ распространеніи птицъ.

Дмитрій Перчинъ.

Октябрь, 1894 года.

Гор. Иркутскъ.

