

пара, так как она встретила меня в одном и том же месте первый раз в июле 1921 года, второй – в сентябре 1922 года.

Это чрезвычайно осторожная птица, необходимым условиям гнездования которой является полная уединённость и отдалённость от человеческого жилья. Думаю, что встреченная мною пара гнездилась на соседних скалах, прилегающих к речке, так как вспугнутые птицы оба раза направляли свой полёт к определённому месту, где и садились на скалах.

Обращаю внимание любителей-охотников на ещё одну довольно редкую в нашей области птицу. Это – горная индейка, или улар. Всего насчитывается пять видов этих птиц, один из коих – *Tetraogallus himalayensis* – оседло живёт в Зайсанском уезде на голых скалах высоких гор. Охота за ними очень трудна. Величиною они со среднего глухаря *Tetrao urogallus*, в оперении преобладает серая окраска верхней стороны с нежной поперечной струйчатостью. Мне всего два раза пришлось видеть убитых птиц и один раз я вспугнул пару на горе Сары-Тау. Было бы интересно узнать, водится ли этот вид в пределах Усть-Каменогорского уезда.

Л и т е р а т у р а

Смирнов А. (1923) 2020. Чёрный аист *Ciconia nigra* и оляпка *Cinclus cinclus* в окрестностях Усть-Каменогорска // *Рус. орнитол. журн.* **29** (1877): 284-285.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1877: 286-287

К наблюдателям природы: о зимовке грачей *Corvus frugilegus* в Семипалатинске

В.А.Селевин

Второе издание. Первая публикация в 1923*

Благодаря личным наблюдениям, а на также и на основании сообщений разных лиц, мне удалось установить факт зимовок под параллелью города Семипалатинска вполне здоровых особей западносибирских грачей *Corvus frugilegus*, хотя, как известно, в наших широтах грач является птицей только летующей, которая ежегодно отлетает зимовать в более южные страны.

Наблюдение грачей в холодное время года, зимой под Семипалатинском, как и вообще в северо-восточных частях нашей губернии,

* Селевин В. 1923. К наблюдателям природы // *Охотник Алтая* 7: 8.

представляет, конечно, научный интерес, но, к сожалению, почти полное отсутствие в нашем распоряжении необходимых для разрешения этого безусловно интересного вопроса данных из разных мест Семипалатинского края не даёт нам пока даже возможности судить о том, остаются ли у нас описываемые птицы на зиму добровольно, или существуют иные, обуславливающие это явление причины.

Видеть не обычных для зимней авифауны западносибирских грачей – птиц, несомненно, совершенно здоровых и бодрых с виду, приходилось мне и другим наблюдателям в течение ряда лет – в 1920, 1921, 1922 и 1923 годах, когда грачи нередко небольшими партиями, группами, или, наконец, одиночно околачивались совместно в стаях сибирских серых *Corvus cornix sharpii* и чёрных *Corvus corone orientalis* ворон, по отвалам в пригороде, близ жилых мест и на задах окрестных поселений. Большинство личных наблюдений относится к первым зимним месяцам – октябрю, ноябрю и декабрю, – причём позднее начала последней трети декабря (24 декабря 1920) мне уже больше не приходилось замечать грачей, хотя я имею верные сведения от лиц, видевших птиц этого вида и в значительно более позднее время, как, например, 5 февраля 1923.

Имея в виду сбор возможно большего числа характеризующих появление грачей на территории нашего края сведений, я обращаюсь с убедительной просьбой ко всем, любящим родную природу и пернатых, кому случалось замечать описываемое интересное явление в жизни наших птиц, особенно к охотникам на Алтае, – не отказать сообщением мне своих наблюдений, за что заранее этим лицам приношу свою глубокую благодарность.

В сообщениях, между прочим, было бы крайне полезно указать следующее: как часто – регулярно или случайно – приходилось видеть в зимнее время грачей; приблизительное количество зимовавших птиц (единичные экземпляры, небольшие общества), а главным образом, возможно точную дату и место, где случалось видеть грачей, то есть необходимо оговорить название селения, уезда и губернии. При этом, конечно, не следует смешивать с грачом сибирскую чёрную ворону, птицу, по внешности, особенно судя по окрасу перьев, весьма схожую с последним, которая, кроме того, является у нас видом, в большинстве оседлым или – в зимнее время – бродячим и даже кое-где лишь только исключительно появляющимся зимой. Отличить грача легко: у взрослых индивидов грачей лицевые части и основание клюва обычно бывает голым, чего, правда, у молодых птиц не замечается.

