

четырёх гнёздах чомг, осмотренных 21-22 мая, содержалось по 3-4 свежих, совершенно не насиженных яйца. Две самки, добытые 15-20 мая, имели массу тела 900 и 1000 г, а три самца – 900, 1000 и 1400 г.

Серый гусь *Anser anser*. На озерке между озёрами Алаколь и Кошкарколь 14 мая наблюдали семью из 2 взрослых серых гусей и 6 маленьких пуховых птенцов.

Серая утка *Anas strepera*. На остепнённом берегу Алаколя в зарослях чия рядом с деревенскими огородами 15 мая найдено гнездо с 5 яйцами, в котором через день, 17 мая, содержалось 6 яиц.

Лысуха *Fulica atra*. В одном из заливов озера Алаколь 15 мая в тростнике обнаружена кладка из 2 свежих яиц, а 22 мая осмотрено 2 гнезда, содержащих по 4 яйца в каждом.

Чибис *Vanellus vanellus*. На заливном лугу у озера Алаколь 18 мая найдено гнездо с 3 яйцами, из которых одно яйцо было с погибшим зародышем, два другие сильно насиженные. Недалеко от этого гнезда обнаружен мёртвый пуховой птенец в возрасте 2-3 сут.

Ходулочник *Himantopus himantopus*. На небольшом озерке в 2 км от северного берега Алаколя 21 мая в колонии озёрных чаек отмечено до 20 гнёзд ходулочников, устроенных в виде небольших кочек среди мелководья глубиной 20-30 см.

Озёрная чайка *Larus ridibundus*. В этой же колонии 21 мая находилось до 40 гнёзд чаек, в большинстве которых содержались кладки по 4 яйца, а в некоторых по 2-3 яйца.

Л и т е р а т у р а

Шнитников В.Н. 1949. *Птицы Семиречья*. М.; Л.: 1-665.



ISSN 1026-5627

Русский орнитологический журнал 2020, Том 29, Экспресс-выпуск 1916: 1906-1907

К экологии ушастой совы *Asio otus* в Иркутской области

В.Д. Сонин

Второе издание. Первая публикация в 1965*

Материалы собраны в 1956-1958 и 1962-1964 годах в районах бассейна реки Лены (на север от Усть-Кут), в лесостепных районах (Иркутско-Балаганские лесостепи) и в Тулунском районе.

* Сонин В.Д. 1965. К экологии ушастой совы в Иркутской области // *Новости орнитологии: Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф.* Алма-Ата: 355-356.

Найдено и описано 11 гнёзд ушастой совы *Asio otus*. Собраны погадки, подстилки гнёзд и желудки, в которых обнаружены остатки 450 позвоночных животных, в том числе грызунов 406, насекомоядных (род *Sorex*) – 14 и птиц – 30.

Гнездовые биотопы ушастой совы можно объединить в три основные группы: а) заболоченные ельники и ельники по ручьям, граничащие с открытыми участками; б) опушки сосновых лесов; в) пойменные ивовые и ивово-черёмуховые заросли, часто с примесью других кустарниковых и древесных видов.

Для гнездования ушастая сова использует пустующие гнёзда ворон *Corvus corone orientalis* и сорок *Pica pica*. Так, из 11 гнёзд ушастых сов 4 принадлежали воронам и 7 сорокам. При выборе гнезда не имеет большого значения высота его расположения. Максимальная высота отмечена в 10 м, минимальная – 3 м. При этом в качестве гнездового дерева использованы сосна (4 гнезда), ель (2), лиственница (1) и ива (4).

Из 4 полных кладок 3 состояли из 6 и одна из 5 яиц. Максимальная длина яиц равна 42.0 мм, минимальная – 38.6 мм, ширина – соответственно 34.4 и 32.2 мм. Средние размеры яиц (по 15 измерениям) составляли 40.3×33.2 мм.

В питании ушастых сов главную роль играют грызуны – 90.2% от общего числа позвоночных (встречаемость 98.6%). Насекомоядные (землеройки) составляют 3.1% (встречаемость 3.3%), птицы – 6.7% (встречаемость 13.4%).

Среди грызунов значительная доля в рационе сов падает на полёвок рода *Microtus* (58.3% от общего количества грызунов), однако роль разных видов этого рода далеко не равноценна в отдельных районах. В лесостепи *Microtus gregalis* составляет 55.0%, в лесных Приленских районах – лишь 2.4%. а в Тулунском районе – 16.9%; *M. oeconomus* в Приленских и Тулунском районах – соответственно 24.7 и 23.0%, в лесостепи – только 3.1%.

У ушастых сов отсутствует избирательность к кормам, поэтому рацион их в основном зависит от местной фауны грызунов. В качестве добычи, кроме упомянутых выше полёвок, отмечены следующие виды грызунов: *Microtus agrestis* (4.4%), *Clethrionomys rufocanus* (2.9%), *Cl. rutilus* (1.5%), *Myopus schisticolor* (2.2%), *Arvicola terrestris* (1.2%), *Apodemus peninsulae* (1.7%), *A. agrarius* (0.3%), *Micromys minutus* (1.0%), *Rattus norvegicus* (0.3%), *Cricetulus barabensis* (7.9%), *Sicista* sp. (5.9%) и *Ochotona alpina* (0.3%). Из птиц встречены полевой воробей *Passer montanus* и дубровник *Emberiza aureola*.

