

на его усадьбе по Итальянскому переулку был создан Горзеленхоз и он работал в нём главным агрономом. Тут невольно вспоминаются 2000 тутовых деревьев, высаженных в Астрахани его прадедом Иваном Андреевичем Комнино в 1799 году, то есть более чем за век до этого. Как видно – гены... К сожалению, после его смерти в 1940 году коллекция растений и архив были утрачены.

Автор благодарен Василию Геннадьевичу Пчелинцеву (Санкт-Петербург), Андрею Витальевичу Фильчагову (Москва), Алле Августовне Цымбал (Таганрог) и внучке Г.В.Варваца Ирине Алексеевне Чумаковой (Петербург-Таганрог) и внучатому племяннику Г.В.Варваца Алексею Константиновичу Быханову (Таганрог) за помощь в работе над статьёй.

Л и т е р а т у р а

- Белик В.П. 2001. Осенняя миграция хищных птиц через «бутылочное горлышко» в дельте Дона // *Рус. орнитол. журн.* **10** (144): 407-410.
- Варваца Г. 1906. О пролёте птиц // *Охот. вестн.* 17: 265-267.
- Варваца Г.В. 2016. О пролёте птиц в окрестностях Таганрога // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1368): 4541-4544.
- Варваца Г. 1907. Ещё об альбинизме у птиц // *Охотн. вестн.* 3: 45.
- Варваца Г. 2016. Ещё об альбинизме у птиц // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1368): 4544-4545.
- Гаврюшкин О.П. 2003. *По старой Греческой... (Хроника обывательской жизни)*. Таганрог: 1-514.
- Мозгалеvский Л.А. 2016. Об альбинизме у птиц. Несколько слов о белом гусе // *Рус. орнитол. журн.* **25** (1335): 3361-3362.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск **1368**: 4541-4544

О пролёте птиц в окрестностях Таганрога

Г.В.Варваца

*Второе издание. Первая публикация в 1906**

Гетке, прославившийся своими полувековыми орнитологическими наблюдениями на острове Гельголанд, утверждает, что мы ничего не знаем о перелёте птиц, так как последние летят очень высоко, и наши наблюдения над низко летящими птицами относятся будто бы к явлениям ненормального пролёта. Вообще всё, что нам известно о пролётах птиц, гадательно, не доказано и не выяснено. Можно сказать, что сведения о пролётах птиц более чем скудны, ибо он происходит на недосягаемой высоте и недоступен человеческому глазу. Много нужно положить ещё упорного труда, чтобы с точностью выяснить это интересное

* Варваца Г. 1906. О пролёте птиц // *Охот. вестн.* 17: 265-267.

биологическое явление. О многих даже самых обыкновенных птицах мы не знаем, как они появились и как улетели из какого-нибудь определённого места. Сегодня их много, они держатся большими стаями; но раз задул холодный ветер, и на завтра нет ни одной птицы. Так, например, перепел *Coturnix coturnix* на берегу Азовского моря, иногда после дождей и холодов появляется громадными вылетками; в одну охоту можно взять 100-160 штук. Но вот к вечеру становится заметно теплее, а на следующее утро на том же самом месте с трудом можно встретить единичные экземпляры. Птицы улетели ночью, но самого отлёта никто не видел и не знает, как он совершался. Мы часто наблюдаем стаи пролетающих птиц, но момента отлёта их мы не знаем; он для нас кажется загадочным.

Так ли это? Надо внимательно изучить и взглядеться в окружающее, и тогда эта загадка, может быть, и отчасти, но будет разъяснена. Так и с сарычами. В наших местах, у Азовского моря, они появляются внезапно и так же внезапно исчезают.

Прежде чем выяснить пролёт сарычей, я скажу несколько слов о самих птицах. Сарычи *Buteoninae* или, как у нас их называют, коршуны, в большинстве случаев обитатели полосы лесов и тундр; у нас, в окрестностях Таганрога, они появляются только весной и осенью — во время своих перелётов. Однажды только мне пришлось видеть сарыча (вероятно, это был *Buteo ferox* — канюк (сарыч) курганник) парящим над рекой Миусом в первых числах июля 1904 года. Гнездятся ли сарычи в окрестностях Таганрога или нет — я в точности не знаю и буду говорить о тех, которых наблюдал на осенних пролётах.

Во время своих осенних экскурсий я добыл следующие виды этих хищников: канюк, сарыч мохноногий, или зимняк *Archibuteo lagopus*, канюк большой *Buteo vulgaris*; канюк малый, рыжий *Buteo vulpinus* и (однажды) сарыч, по окраске подходящий к виду *Archibuteo pallidus*, — канюк сибирский. Начало осеннего пролёта сарычей в окрестностях Таганрога, насколько я мог заметить, зависит от состояния погоды*. Если весь август сухой и тёплый, пролёт сарычей идёт вяло, — показываются лишь единичные экземпляры.

Прошёл дождь, задул северо-западный ветер и температура воздуха понизилась до +6-3°R, тогда начинается массовый пролёт сарычей.

Направление пролёта с юго-запада на северо-восток. В наших местах идёт берегами Азовского моря и Таганрогского залива, где растут ивы, удобные для отдыха хищников, и мимо Воловой балки (дача М.А. Лакиер), изобилующей роскошной древесной растительностью. Местами стоянок сарычей бывают эти же деревья, а также засады и рощи в береговых балках или вблизи берега моря. Так как сам город Таганрог

* Замечается также массовое появление сарычей и их продолжительное (сравнительно) пребывание в нашей местности в годы массового появления на полях мышей.

раскинулся на высоком мысе, вдающемся в Таганрогский залив, то все его сады и особенно большой городской сад также служат стоянками для пролетающих хищников. Обыкновенно, как я наблюдал в течение нескольких лет, осенний пролёт сарычей начинается при таких условиях. С ночи дует северо-восточный ветер, на утро следующего дня заметно холоднее (+4...-5°R), небо покрывается серыми тучами, а в воздухе чувствуется влага. Начинается пролёт мелких птиц – скворцов *Sturnus vulgaris*, овсянок, трясогузок, пеночек, славок и др. Стайки этих птичек одна за другой летят с юго-запада, но сарычей ещё не видно. Только после полудня, когда всмотришься в небесную высь, можно заметить две-три точки, как бы повисшие и застывшие в воздухе. При помощи бинокля едва-едва различаешь парящих хищников, а спустя некоторое время, когда птица ещё не приблизилась, угадываешь, что это сарычи. Хищники летят, медленно спускаясь по наклонной плоскости от облаков к городу. Вскоре всё видимое глазом пространство покрывается такими точками и, наконец, сарычами. Они медленно и плавно, но неудержимо, стремятся всё вперёд и вперёд и пролетают уже низко над садами города с юго-запада на северо-запад. Наступает вечер, сарычи ещё ближе спустились к земле и, наконец, стали занимать попадающиеся на пути деревья. Уставшие и измученные долгим перелётом, сарычи к вечеру летят очень низко над землёй, а для отдыха садятся на заборы, сараи, на всякую возвышенность, лишь бы отдохнуть от путешествия. Не редкость подойти в это время к сарычу, сидящему на заборе (как это было в нашем саду), почти вплотную. Птица, видя, что ей не делают вреда, спокойно продолжает отдыхать, с интересом разглядывая подходящего.

Становится темнее, и хищники остаются там, где их застаёт окончившийся день. Мне приходилось видеть в городском саду сотни сарычей; на одном дереве их бывает 6-7 штук.

Уже совсем стемнело – сарычи остаются ночевать на занятых деревьях с тем, чтобы отдохнувши за ночь, наутро со свежими силами продолжать свой далёкий путь на места зимних стоянок. Иногда перелёт идёт с перерывами, то сарычи летят в большом количестве, то их совсем нет. Последнее бывает тогда, когда становится значительно теплее.

Ребятишки, безжалостные истребители пернатых, часто устраивают охоты на сарычей с палками, камнями и рогатками. Они выследят ночующих птиц, криком и шумом вспугивают их. Среди хищников поднимается страшная суматоха; они наталкиваются на ветви, на деревья и часто падают в густые кустарники, а это и на руку охотникам-мальчишкам.

Описанные выше пролёты сарычей в окрестностях города Таганрога я наблюдаю осенью из года в год. Для меня долго было загадкой – почему и зачем сарычи останавливаются у нас на ночёвку и потом

быстро исчезают, как и появились? Как много их пролетает по описанным выше путям и как высоко над землёю летят они?

Неоднократные наблюдения убедили меня в том, что сарычи летят весь день и всю ночь непрерывно, а усталые и изголодавшиеся птицы, утомлённые долгим перелётом, спускаются на землю в удобных местах, чтобы отдохнуть, подкрепиться пищей, переночевать и на следующее утро продолжать свой далёкий путь*. Такими удобными местами, как я указал выше, служат побережья Азовского моря.

Быть может, изложенные наблюдения до некоторой степени выяснят загадку пролёта сарычей и причину их внезапного появления и исчезновения их. В заключение могу сказать, что недостаточно прочитывать описание пролёта сарычей. Надо его увидеть, надо его почувствовать, чтобы проникнуться этим интересным явлением.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2016, Том 25, Экспресс-выпуск 1368: 4544-4545

Ещё об альбинизме у птиц

Г.В.Варваца

Второе издание. Первая публикация в 1907†

В дополнение к интересной заметке врача Л.Мозгалевского, напечатанной в № 1 «Охотничьего вестника» (1907), сообщаю свои наблюдения над альбинизмом среди представителей животного и пернатого царства.

В 1894-1895 годах, во время массового нашествия в южные губернии мышей (например, *Mus musculus* – домашняя мышь и *Microtus arvalis* – обыкновенная полёвка), в Таганрогском округе встречались и ловились мыши-альбиносы (Беглицкая коса). Все эти годы вслед за мышиными полчищами замечено было появление несметного количества сарычей Buteoninae, держащихся с первых чисел августа и до конца октября, также сов – болотная сова *Asio accipitrinus*, ушастая сова *Asio otus* и др., истребляющих всюду по округе массу мышей.

В природе болезненное состояние альбинизма наследственно (при смешении альбиносов между собой) и при переходе из рода в род, в целом ряде поколений оно принимает иногда характер разновидности, как это замечается, например, у хорька и у трубастого голубя. Переходной ступенью к этому постоянному отсутствию пигмента можно счи-

* Между сарычами я встретил и их всегдашнего спутника орла-карлика *Aquila minuta*.

† Варваца Г. 1907. Ещё об альбинизме у птиц // *Охот. вестн.* 3: 45.