ISSN 1026-5627
Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск ***2173****: 1323-1324*

Несколько слов о формах домового воробья *Passer domesticus*

Н.А.Зарудный, А.Е.Кудашев

*Второе издание. Первая публикация в 1916**

Обработка обширных коллекций воробьёв из группы домовых *Passer domesticus* принудила нас выделить несколько форм в качестве новых.

1. Семиреченский домовый воробей *Passer domesticus semiretschiensis* subsp. nova. По своей окраске ближе к *P. d. domesticus* (Linnaeus, 1758), чем к южному соседу *P. d. bactrianus* subsp. nova. Самцы *P. d. semiretschiensis* отличаются от типичных более светлым оттенком мелкого оперения; распространение серого цвета на боках головы (щеках и ушных партиях) такое же, но этот цвет здесь более бледный и более чистый, а осенью с меньшим количеством буроватой примеси; менее выраженный и более чистый и бледный серый цвет боков груди и брюха занимает меньше места; ржавые каймы всех маховых и верхних кроющих крыла менее ярки и значительно более бледны. В большинстве случаев более бледны охристые каймы, сопровождающие каштановый цвет внешних опахал спинной партии. Самки отличаются мало: сероватые цвета нижней стороны тела в общем более бледны и с меньшим количеством буроватой примеси. Это оседлая птица Семиречья. Типы из Верного, Джаркента и Пржевальска.

2. Туркестанский домовый воробей *Passer domesticus bactrianus* subsp. nova. Обыкновеннейшая летняя птица Туркестана, заходящая, по-видимому, на гнездовье в Закавказье; в холодное время года громадное большинство особей улетает. Прежние авторы смешивали его с *P. d. indicus* (Jardine et Selby, 1831), от которого он отличается более крупным ростом. От всех остальных здесь упоминаемых форм разнится в окраске самцов наибольшей чистотой белого цвета на боках головы и на нижней стороне туловища (серая примесь боков головы в громадном большинстве случаев отсутствует вовсе), а также наименьшим количеством серого цвета на боках груди и брюха. Общая окраска верхней стороны тела у обоих полов бледнее, чем у воробьёв семиреченского и нижеследующего гирканского.

3. Гирканский домовый воробей *Passer domesticus hyrcanus* subsp. nova. Оседл по южному побережью Каспийского моря (Астерабад, Гилян,Маландеран, проникает в Талыш). Близок к воробьям типичному домовому и семиреченскому. Самцы отличаются меньшим количеством

* Зарудный Н.А., Кудашев А.Е. 1916. Несколько слов о формах домашнего воробья // *Наша охота* **20**: 37-38.

серого цвета на боках головы и туловища; этот цвет светлее, а на щеках сильнее оттеснён к заглазной и подглазной областям; белый цвет груди и брюха более чист и с ничтожным количеством серой примеси. Самки похожи на семиреченских, но посветлее.

4. Персидский домовый воробей *Passer domesticus persicus* subsp. nova. Оседл на Персидском плато, проникая отсюда в Закавказье, Месопотамию, Сеистан и Белючистан. По бледности общего оперения более или менее совпадает с *P. d. indicus* и *P. d. bactrianus*, по размерам крыла в общем превосходит индийскую форму и более или менее совпадает с тукрестанской. Самцы отличаются от этих форм сильным развитием серого цвета на боках головы и передней части груди; этот цвет более чист и бледен, чем у других серощёких форм; по сравнительно чистой белизне середины груди и брюха схож с индийскими и туркестанскими птицами. Типы из долины нижнего течения реки Карун.

ISSN 1026-5627
*Русский орнитологический журнал 2022, Том 31, Экспресс-выпуск **2173**: 1324-1325*

Прилёт клинтуха *Columba oenas* в Красное Село в середине марта

К.Ю.Домбровский

Константин Юзефович Домбровский. Всероссийский Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, Санкт-Петербургский филиал ФГБНУ «ВНИРО» («ГосНИОРХ» им. Л.С.Берга), Набережная Макарова, д. 26, Санкт-Петербург, 199053, Россия. E-mail: k.dombrovsky@yandex.ru

Поступила в редакцию 17 марта 2022

Об обитании клинтуха *Columba oenas* в парке Красного Села на южной окраине Санкт-Петербурга стало известно относительно недавно, в 2011 году (Меньшикова 2011; Домбровский 2019). Эти голуби появляются на нашей широте обычно в течение первой декады апреля, но иногда могут быть встречены уже во второй декаде марта (Мальчевский, Пукинский 1983). В 2020 году пара клинтухов была замечена в Красном Селе уже 17 марта (Домбровский 2020). В тот год зима была аномально тёплой и практически бесснежной. Поэтому при появлении первых голубей снега в Красном Селе почти не было.

В 2022 году пара клинтухов в парке Красного Села появилась ещё раньше – 16 марта. 17 марта были отмечены уже три птицы, перелетавшие друг за другом над вершинами старых деревьев. В отличие от зимы 2019/20 года, зима 2021/22 года оказалась снежной. И на момент наблюдения клинтухов в парке продолжал лежать полуметровый слой смёрз-