

Белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus* на Алакольских озёрах

В.А.Грачёв

Второе издание. Первая публикация в 1968*

Считают, что белокрылая крачка *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) не гнездится в Зайсанской и Балхаш-Алакольской котловинах, а в последнем районе её нет даже на пролёте (Долгушин 1962).

В 1967 году в пределах Алакольской котловины мы нашли две колонии этого вида. Одна из них находилась на западном берегу озера Уялы (урочище Елемес), вторая – в правом, северо-восточном углу дельты реки Тентек, в 7 км южнее озера Сасыкколь. Обе колонии располагались на мелководных участках тростниковых зарослей, недалеко от их края и состояли каждая из 20-30 пар. До первой колонии мы не добрались, но судя по состоянию гонад и наседному пятну добытой 26 мая самки, здесь началась откладка яиц. Во второй колонии 9 июля были птенцы разных возрастов – от пуховичков до поднявшихся на крыло. Родители вместе с летающими молодыми охотились за насекомыми на соседнем лугу. В желудках 5 птиц обнаружены различные насекомые: саранчовые, крупные мухи, жуки и другие. У большинства взрослых особей была в полном разгаре линька в зимний наряд, некоторые молодые наполовину перелиняли, другие ещё не начинали линять. В июле кормящихся белокрылых крачек наблюдали на многих водоёмах в окрестностях гнездовых колоний.

Масса тела добытых птиц: июль, взрослые самцы – 65 и 72 г, молодой самец – 66 г, молодая нелётная самка – 68 г.

Л и т е р а т у р а

Долгушин И.А. 1962. Отряд чайки – Lariformes // *Птицы Казахстана*. Алма-Ата, 2: 246-327.



* Грачёв В.А. 1968. Белокрылая крачка на Алакульских озёрах // *Новости орнитологии Казахстана*. Алма-Ата: 220.