ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск ***1033****: 2439-2445*

К орнитофауне Северо-Западного и Западного Алтая

П.М.Залесский

*Второе издание. Первая публикация в 1929**

Последние четыре года я регулярно посещал Северо-Западный и Западный Алтай, интересуясь состоянием мараловодческого промысла в Бийском округе и Западной Ойротии и попутно производя орнитологические сборы. Несмотря на кратковременность поездок, продолжавшихся от трёх недель до месяца, коллекционный материал, собранный мною, достиг 400 экземпляров птиц, что позволяет на основании документальных данных и записей дневника внести ряд замечаний к «Списку и распределению птиц Русского Алтая» академика П.П.Сушкина (1925). В нижепомещаемой статье я касаюсь только тех форм, распространение которых на Алтае было указано П.П.Сушкиным не точно или вовсе не указано. По соображениям удобства нумерация перечня птиц взята из названной выше работы.

66. *Circus macrourus* (Sykes). 67. *Circus cyaneus cyaneus* (L.). Для Северо-Западного Алтая луни не приводятся, хотя к западу от Ануя они довольно обыкновенны в зоне предгорий и распространены в горах до Большого Бащелака и станицы Чарышской на Чарыше. Выше по Чарышу не встречались. Видимо, степные луни (молодые особи) попадались мне в июле 1929 года на перегоне Чёрный Ануй – Белый Ануй и близ последнего села в долине одноимённой речки.

71. *Aegypius monachus* (L.). В поездку 1925 года я и брат мой, И.М. Залесский, были свидетелями залёта грифов *Aegypius monachus* и белоголовых сипов *Gyps fulvus* в окрестностях деревни Сибирячихи на Ануе (20-21 июля). Свыше десятка огромных птиц кружились над рекой и скалами, возбуждая удивление жителей. Одна птица была убита. Несколькими днями ранее пара грифов наблюдалась нами на безлесных вершинах гор у села Чарышского. После этого я дважды приезжал в Сибирячиху (в 1926 и 1928 годах), но грифов больше не видел.

78. *Tetrao urogallus taczanowskii* (Stejneg.). Гнездование глухаря в Западном Алтае не подлежит никакому сомнению. Копалуху и выводок молодых я видел 20 июля 1926 в разреженной тайге, близко к верхней границе леса, на склоне белка «Татарский шпиль» (деревня Малая Татарка на одноименной речке, впадающей в Чарыш слева). В

* Залесский П.М. 1929. К орнитофауне С.-З. и З. Алтая // *Uragus* 2: 4-12.
Подготовлена к печати Н.Н.Березовиковым.

июле 1927 года мой проводник вспугнул копалуху из редкого кедрового и лиственничного насаждения на «Плешивом белке» близ Сентелека. Жители причарышских деревень считают глухаря нередкой птицей лесов по Талицким и Коргонским белкам.

81. *Tetrastes bonasia septentrionalis* Seeb. Гнездится в таёжных лесах по северному склону Коргонских белков. Прослежен от села Тюдрала (Чарыш) до Сентелека.

109. *Numenius arquatus lineatus* Cuv. Не часто, но встречается в северо-западной степной окраине Алтая и заходит неглубоко в горы. Мною наблюдался 12 июля 1926 между деревнями Камышенка и Усть-Козлуха Бийского округа, вёрстах в 35 от границы степи, в сыром логу среди пологих и невысоких сопок.

133. *Scolopax rusticola* L. Летом 1925 года (19 июля) наблюдался И.М.Залесским в окрестностях деревни Большого Бащелака.

141. *Sterna hirundo* subsp. (?) Обыкновенную крачку в числе нескольких особей я наблюдал на речке Сибирке, левом притоке Ануя, близ деревни Сибирячихи. Это единственное место на Северо-Западном Алтае, откуда о *S. hirundo* имеются вполне достоверные сведения.

149. *Streptopelia orientalis meena* Sykes. Не представляет редкости в районе, лежащем к северу и западу от Бащелакских белков. Дневник отмечает нахождение большой горлицы на Чарыше (станица Чарышска и деревня Усть-Чагырка), по Бащелаку (деревня Большой Бащелак) и на Ануе, ниже села Солонешного.

153. *Columba rupestris turkestanica* But. Идёт к северу до широты села Солонешного на Ануе, где горный характер местности начинает сменяться ландшафтом предгорий. В сборах имеется экземпляр с Ануя (районе села Солонешного), из-под Чарышской и Сентелека. В предгорьях Западного Алтая не встречался.

158. *Alcedo atthis pallasii* Rehb. В Северо-Западном Алтае проникает в горы на юг до деревни Топольной на Ануе и села Малого Бащелака на речке Бащелаке. С запада доходит до станицы Чарышской. Выше последнего пункта нигде на Чарыше не найден.

164. *Caprimulgus europaeus zarudnyi* Hartert. Из Северо-Западного Алтая в моих сборах имеется экземпляр, добытый 25 июля 1927 в долине речки Дрязговитой между селом Солонешным и деревней Топольной. Козодой наблюдался также в районе деревни Большой Бащелак.

175. *Asio flammeus* (Pontopp.). Болотную сову следует включить в список орнитофауны Северо-Западного Алтая ввиду нахождения её под Сибирячихой (31 июля 1926). В горах Западного Алтая не наблюдалась. В предгорьях обыкновенна.

189. *Corvus cornix sharpii* Oates. В последнюю поездку 1928 года мне удалось зарегистрировать присутствие серой вороны в области ре-

ки Ануя до деревни Топольной на юг. Однако здесь она представляет редкое явление и записи в моём дневнике свидетельствуют лишь об одном наблюдении, сделанном 29 июля. В Западном Алтае серая ворона обыкновенна от села Колыванского (на выходе из гор) до деревни Бугришихи на речке Белой (левый приток Чарыша). Далее к востоку значительно реже встречается близ Усть-Чагырки и станицы Чарышской. Этот последний пункт является, видимо, границей распространения серой вороны. В окрестностях Верхнего Сентелека (35 вёрст к юго-востоку от Чарышской) обитает только чёрная ворона *C. corone orientalis*. Заслуживает внимания факт добычи мною в июле 1927 года гибрида чёрной и серой ворон под селом Тюдралой.

197. *Nucifraga caryocatactes* (? *altaica* But.). При восхождении на белок «Татарский шпиль» (деревня Малая Татарка) 21 июля 1926 я встретил кедровок в смешанном лесу из лиственницы, пихты и кедра. Экземпляров нет, и подвид не выяснен.

207. *Carduelis caniceps poliakovi* Sushk. Экземпляр самца, добытый 28 июня 1927 в окрестностях села Чёрный Ануй по окраске оперения вполне подходит под описание формы *poliakovi*, сделанное П.П.Сушкиным (1925) в «Списке и распределении птиц Русского Алтая». Заслуживает внимания, что экземпляр самца от 16 июля 1925 из станицы Чарышской, лежащей у границы Северо-Западного и Западного Алтая, по тону кроющих уха и боков головы представляет, скорее всего, *Carduelis caniceps subulata* Gloger, 1833. Согласно «Списка …», в Северо-Западном Алтае должен встречаться *C. c. subulata*, а в Западном – *C. c. poliakovi*. В предгорьях Алтая седоголовый щегол прослежен мною до озера Белого (близ села Колыванского) на запад. По Аную он распространён почти до границы степи.

213. *Uragus sibiricus sibiricus* (Pall.). В сборах за 1925 год имеется экземпляр самца, добытый И.М.Залесским 13 июля в окрестностях деревни Маральи Рожки в долине речки Маралихи среди тальниковых крепей. Названная деревня расположена на водоразделе рек Ануя и Чарыша и может быть причислена к Северо-Западному Алтаю, как этот термин понимается П.П.Сушкиным (1925).

223. *Loxia curvirostra minussensis* Sushk. В списке птиц Западного Алтая не приведён. Мною добыт летом 1927 года (3 экз.) близ деревни Коргонской при впадении в Чарыш речки Коргона. Видимо, не редок в лиственничном лесу названной речки. Экземпляры коллекции относятся к подвиду *L. c. minussensis*.

226. *Leucosticte arctoa* Pall. Стайки этих птичек я наблюдал 26 июля 1926 на белке «Татарский шпиль», что западнее деревни Коргонской. Вьюрки держались на снежном поле выше пояса лесной растительности. Добыт самец (21 июля 1926).

241. *Emberiza cioides cioides* Brandt. В коллекции один экземпляр

от 10 июля 1927 из окрестностей деревни Коргонской. В других пунктах пройдённого маршрута не наблюдалась.

243. *Emberiza godlewskii godlewskii* Tacz. Распространение овсянки Годлевского представляется, по моим данным, в следующем виде: по Ануй она обыкновенна в районе села Солонешного (речка Дрозговитая) и деревни Топольной и доходит к северу до границы гор. Так, *E. godlewskii* найдена мною у перевала к деревне Таловке и далее на юг, близ деревни Вятчихи. В Западном Алтае многочисленна на гнездовье в окрестностях деревни Усть-Чагырки, в окрестностях станицы Чарышской и в окрестностях деревни Коргонской. Речка Чагырка является, по-видимому, крайним западным пределом распространения *E. godlewskii* в Западном Алтае.

249. *Emberiza schoeniclus pallidor* (Hart.). Болотная овсянка не редка на озёрах близ выселка Марковского, к юго-западу от села Уч-Пристани. Здесь мной добыт 8 июля 1925 экземпляр самца. Озёра лежат в границах так называемой северо-западной степной окраины Алтая.

253. *Otocorys brandti montana* Bianchi. П.П.Сушкин приводит рогатого жаворонка как гнездящуюся птицу только для зоны гор Западного Алтая, отмечая отсутствие его в предгорьях и в Северо-Западном Алтае. Поэтому небезынтересным является нахождение молодого экземпляра *O. b. montana* на границу степи и первых холмистых возвышений Алтая близ села Камышенки (несколько восточнее Ануя), сделанное мною 20 июня 1927. В Западном Алтае рогатый жаворонок наблюдался мною между селениями Усть-Кон и Тюдрала, в долине реки Чарыш, на высоте 950-1000 метров. Птички держались на сухих засолонённых участках, напоминающих по характеру травяного покрова Канскую степь.

255. *Pterocorys sibirica* (Gm.). Исключая одну запись в дневнике, относящуюся к июлю 1925 года, когда мне и И.М.Залесскому посчастливилось наблюдать белокрылого жаворонка близ села Огни, в предгорьях Северо-Западного Алтая, – никаких других сведений об этом виде в моём распоряжении нет.

259. *Alauda arvensis cinerascens* Ehmke. Обыкновенный жаворонок проникает в Алтай с севера и северо-запада до линии первых более или менее значительных гор. Так, по Ануй он не идёт южнее левых его притоков – Таловки и Вятчихи, пересекающих безлесные предгорья, а по Чарышу – восточнее деревни Усть-Чагырки, Туатинки и форпоста Тулаты. Глубина распространения его в этом направлении – около 70 вёрст, считая от границы степи.

262. *Agrodroma richardi* (Vieill.). Широко распространённый в северо-западной степной окраине Алтая, *A. richardi* лишь спорадически встречается в Алтайской горной стране. В предгорьях, у выхода на равнину реки Ануя, он нередок на широких степных площадках, обра-

зуемых волнистой грядой холмов, но далее к югу, по мере изменения рельефа местности, приобретающей более выраженный гористый характер, исчезает. Между Сибирячихой и Бащелаком, где появляются значительные, покрытые лесом горы, степного конька нет. Отсутствует он и юго-восточнее Сибирячихи в направлении на Солонешное и Чёрный Ануй. Снова степной конёк появляется между селом Малым Бащелаком и станицей Чарышской. Округлённые низкие холмы, разбежавшиеся мягкими складками от окружающих эту котловину гор, дают приют многочисленной колонии *A. richardi*. Нахождение здесь степного конька изолировано: к югу, западу и северу его нет. По Чарышу степной конёк найден мною в верховьях реки между Тюдралой и Усть-Каном, в той же станции, что и *Otocorys brandti montana*. Много *A. richardi* в Канской степи. Затем, он изредка встречается на пути из Келея к Муте и Чёрному Аную и чаще в долине Белого Ануя по дороге в одноимённое село. Мягкий рельеф и резко выраженный степной колорит долины Белого Ануя сближают её с вышеописанной котловиной под Бащелаком. На север от Чёрного Ануя распространение степного конька простирается до деревни Сибирячихи.

272. *Budytes citreola* Pall. Обыкновенный и многочисленный житель прибрежной полосы Большого Каннского озера (Каннская нагорная степь). В других районах Западного и Северо-Западного Алтая не наблюдалась.

273. *Calobates boarula melanope* (Pall.) [*Motacilla cinerea melanope* Pallas, 1776]. Представляет обычное явление на Ануе и в системе речек, сбегающих с северного склона Талицких и Бащелакских белков. К северу доходит до границы степи.

280. *Periparus ater ater* (L.). В моём дневнике отмечена как обыкновенная птица смешанных лесов в окрестностях деревни Большой Бащелак. Найдена также у подножья белков близ деревни Верхний Сентелек и восточнее, в тайге, по склону белка «Татарский Шпиль».

283. *Penthestes palustris brevirostris* (Tacz.). Этот вид добыт мною в окрестностях села Тюдрала (верхнее течение Чарыша) и восточнее этого селения, на перевале из Канской степи к Келею. Здесь короткоклювая гаичка встречается совместно с *P. b. baicalensis*. Под Бащелаком и станицей Чарышской, то есть к югу и западу от названного района обитает только *P. b. baicalensis*. Можно думать, что граница распространения *P. p. brevirostris* пролегает по Талицким белкам и реке Коргону.

319. *Locustella naevia* (? *mongolica* Sushk.). По-видимому, к этой форме относится наблюдение, сделанное мною 14 июля 1928 близ деревни Сентелек. Поднимаясь на дорогу «Тёплую» я слышал по сыроватым склонам последней характерное трещание сверчка, нарушавшее тишину летнего вечера.

323. *Hippolais scita* (Eversm.). Бормотушка, несомненно, гнездится

в Северо-Западном Алтае, по крайней мере, в той части его, которая представлена бассейном Ануя. Мною наблюдалась в предгорьях близ деревни Берёзовки и выше по Аную, близ Сибирячихи.

323. *Sylvia nisoria* (Bechst.). В горах не зарегистрирована. Несколько ястребиных славок встречено мной и И.М.Залесским в июле 1925 года близ выселка Марковского, к юго-западу от села Уч-Пристани.

326. *Sylvia communis icterops* Men. Идёт высоко в горы, о чём свидетельствует нахождение этой птички в субальпийской зоне на перевале между речками Большой Татаркой и Коргоном. Вверх по Чарышу наблюдалась до селения Тюдралы.

340. *Oenanthe isabellina* Cretzschm. Западнее Ануя, а по Чарышу ниже села Тюдралы – не найден. Обыкновенен между Тюдралой и Усть-Каном. Поражает обилие плясунов в высокой Канской степи. Северней её плясуны нечасто попадаются между Келеем – Чёрным Ануем и многочисленны на перегоне Чёрный Ануй – Белый Ануй.

341. *Saxicola rubetra rubetra* (L.). Луговой чекан широко распространён в Северо-Западном и Западном Алтае до Топольной (Ануй), Бащелка, Чарышской и Сентелека на юге. Этот последний пункт является в то же время и наиболее восточным по Чарышу. Далее вверх по реке чеканчик не встречен. Нет его и в верховьях Ануя.

350. *Luscinia luscinia* (L.). Обыкновенный соловей гнездится по Аную по параллели села Солонешного. В моей коллекции один экземпляр самки с речки Дрязговитой, правого притока Ануя. В горах Западного Алтая не наблюдался.

356. *Luscinia svecica altaica* Sushk. В сборах один экземпляр самца с Ерголинского белка под Тюдралой (Чарыш). Здесь же в зарослях карликовой берёзки найдено гнездо с неоперившимися птенчиками (3 июля 1927).

362. *Prunella atrogularis* (Brandt). В поездку 1926 года черногорлая завирушка наблюдалась 14 июля близ станицы Чарышской на склонах левого берега речки Сосновки. Вторая встреча с ней отмечена в моём дневнике 3 июля 1927 на склоне Ерголинского белка (деревня Тюдрала) в смешанном лесу. Экземпляр добыт.

364. *Cinclus cinclus bianchii* Sushk. Внешность оляпки описывалась с такой подробностью жителями деревень Верхнего Сентелека и Малой Татарки (область Чарыша), что у меня не остаётся никаких сомнений в обитании этой птички на горных речках, впадающих в Чарыш выше станицы Чарышской. Бащелакский лесничий гр. Стуканов передавал мне, что оляпка встречается на речке Белой, правом притоке Чарыша, несущей свои воды с Бащелакского белка. По рассказам крестьян деревень Коргонской и Чесулихи живёт на Чарыше; зимой попадается часто, летом реже.

Литература

Сушкин П.П. 1925. *Список и распределение птиц Русского Алтая и ближайших частей Северо-Западной Монголии с описанием новых и малоизвестных форм*. Л.: 1-79.

ISSN 0869-4362
Русский орнитологический журнал 2014, Том 23, Экспресс-выпуск ***1033****: 2445-2453*

Материалы по экологии тупика *Fratercula arctica*

Т.Д.Герасимова

*Второе издание. Первая публикация в 1951**

Работа проводилась в основном в заповеднике «Семь островов» с мая по август 1947 года. Много интересного дала поездка на Айновы острова (Хейня-Саари), которые до сих пор не изучались советскими зоологами. Заповедник «Семь островов» расположен в Баренцевом море на расстоянии 233 км от Мурманска. В литературе уже имеется подробное описание геоморфологии, флоры и фауны всех островов заповедника (Успенский 1941), поэтому нет необходимости вновь останавливаться на этом.

Общее для всех островов – круто уходящие в воду гранитные основания, малое количество отмелей. Куполы, береговые уступы островов и террасы покрыты более или менее толстым слоем торфа. Самый большой из островов – остров Харлов, где расположена база заповедника. Здесь и велись основные наблюдения над тупиком *Fratercula arctica*. К сожалению, из-за недостатка транспорта систематические наблюдения на других островах были недоступны.

Численность тупика в заповеднике

На Новой земле (участок западного побережья Южного острова между Безымянной и Грибовой губой), по подсчётам Л.О.Белопольского, гнездует около 100 тупиков.

На «Семи островах» колонии тупика имеют следующую численность: остров Харлов – около 100 птиц, остров Большой Зеленец – 600-700, остров Малый Зеленец – 800-1000, остров Кувшин – 500-600, остров Малый Лицкий – 200 птиц. Огромные колонии тупика находятся на Айновых островах: на острове Большой Айнов – 8000, на острове Малый Айнов – 14500-15000 птиц.

---

* Герасимова Т.Д. Материалы по экологии тупика – *Fratercula arctica* L. // *Учён. зап. Моск. гор. под. ин-та им. В.П.Потёмкина* **18**: 115-124.