

изменилась, и для её прояснения нужна хорошая серия экземпляров, собранных в гнездовое время.

Л и т е р а т у р а

Корелов М.Н. 1956. Материалы к авифауне хребта Кетмень // *Тр. Ин-та зоол. АН КазССР* 6: 109-157.



ISSN 0869-4362

Русский орнитологический журнал 2015, Том 24, Экспресс-выпуск 1104: 459

Залёт касатки *Anas falcata* в Рубцовский округ

М.Д.Зверев

*Второе издание. Первая публикация в 1930**

Сотрудником Рубцовского[†] охоттоварищества Шинаевым 5 мая 1930 на реке Алей в 5 км от Рубцовки подстрелен селезень, удививший его своим оперением, необычайным для уток этой местности. Сделанное Шинаевым описание вполне подходит к селезню в брачном наряде епанчевой утки – касатки *Eunetta falcata* Georgi, 1775. Утка эта населяет Приамурье, Сахалин и Камчатку. До сего времени известны только несколько случаев добычи её под Красноярском, Томском и Омском. Наиболее характерные признаки селезня этой породы уток следующие: темя коричневого цвета, с хохолком, шея белая с зеленовато-чёрным ошейником, хвост прямой, длинный, кроющие хвоста очень длинные, совершенно скрывающие хвост, свисающие.



* Зверев М.Д. 1930. Залёт епанчевой утки в Рубцовский округ // *Охотник и рыбак Сибири* 8/9: 26.

[†] Рубцовский округ – административно-территориальная единица Сибирского края, существовавшая в 1925-1930 годах. Образован из Рубцовского уезда бывшей Алтайской губернии (ред.).